



زرعي هدايتون

Agricultural Field Guide



زرعي توسيع، زراعت کاتو حکومت سندھ

Agriculture, Supply and Prices Department,
Directorate General Agriculture Extension Sindh
SAGP ICT Agricultural Extension Services Centre Sindh Hyderabad



زرعي هدايتون

Agricultural Field Guide

سرپرست

محمد اسماعيل راهو
وزير زراعت، سنڌ

نگران

هدايت الله چچڙو
ڊائريڪٽر جنرل،
زرعي توسيع سنڌ

نگران اعليٰ

عبدالرحيم سومرو
سيڪريٽري زراعت،
سنڌ

تحرير، ترتيب ۽ توسيع

مصطفيٰ نانگراج
انچارج، آءِ سي ٽي
زرعي توسيع مرڪز

زرعي توسيع، زراعت کاتو حڪومت سنڌ

Agriculture, Supply and Prices Department,
Directorate General Agriculture Extension Sindh
SAGP ICT Agricultural Extension Services Centre,
Sindh Hyderabad

نظر ثاني

پروفيسر ڊاڪٽر اعجاز احمد سومرو
سنت زرعي يونيورسٽي ٽنڊو ڄام

پانهن پيلي

فهم قريشي، کاشف علي پڙو،
رياض حسين چانڊيو، خليل الله پنهور ۽ غلام نبي ڏاهري
آءِ سي ٽي زرعي توسيعي مرڪز، زرعي توسيع سنت حيدرآباد

ڊزائين

بلاول عباسي

ڪمپوزنگ

علي انور لغاري

Contact us:



+92 311 1646111 / +92 22 9201958



ictagriextensionsindh@gmail.com



www.ictagrisindh.gov.pk



ictagriculturalextensionservicessindh



www.youtube.com/channel/UCqTcNu8o9s2y7vjSiafo8kQ

فهرست

نمبر	فصل	صفحو
1	ڪڻڪ - Wheat	1
2	ساريون - Rice	6
3	وونٽن - Cotton	13
4	ڪمند - Sugarcane	22
5	سورج مُڪي - Sunflower	30
6	خريف جون پاڇيون Kharif Vegetables	36
7	ربيع جون پاڇيون Rabi Vegetables	47
8	مڪئي - Maize	68
9	جوئر - Sorghum	70
10	ٻاجهري - Millet	73
11	برسيم - Egyption Clover	75
12	لوسڻ - Alfalfa	77
13	جنتر يا ڍانچو - Sesbania	79
14	گوار - Cluster bean	80
15	انڊ - Mango	81
16	ڪيلو - Banana	91
17	زيتون - Guava	94
18	ليمون - Lemon	101
19	پيپٽو - Papaya	110
20	مڱ - Green Gram	114
21	ماش يا مانهن - Black Gram	116
22	ڪڙوا جي پيداواري حڪمت عملي Quinoa Cultivation Technology	118
23	موسمياتي تبديليون ۽ اسان جي زراعت Climate Change & Agriculture	120
24	پاڻي جو بهتر استعمال Efficient use of water	123
25	زرعي مارڪيٽنگ Agriculture Marketing	125



ڪڻڪ Wheat

زمين جي چونڊ ۽ تياري:

ڪڻڪ لاءِ اهڙي زمين چونڊ ڪجي جيڪا زرخيز ۽ نامياتي مادي سان ڀرپور هجي. پر جيڪڏهن زمين ڪمزور هجي ته ان زمين کي ڪڻڪ پوکڻ کان هڪ مهينو پهرين ڳريل سڙيل وڻاڻ جي پاڻ جون 3 ترڪون ڏئي هر سان ملائي ريڇ ڪجي. ٿي سگهي ته ٻٽو ريڇ ڪجي ته جيئن پاڻ زمين ۾ چڱي ريت ڳري ملي وڃي. جنهن بعد زمين کي نوس ڪلٽيوپٽر جا ٻه هر ڏئي پوکيءَ لاءِ تيار ڪجي. ناڙي پوک لاءِ ڪلٽيوپٽر پويان ڳاڙهي ٻڌجي ته جيئن زمين ۾ سيڪ موجود رهي. جيڪڏهن زمين هموار نه هجي ته پوءِ زمين کي ليزر مشين ذريعي سنوت ۾ اٿجي ته جيئن فصل کي هڪجيئرو پاڻي ۽ پاڻ ملي سگهي.

جنسون ۽ پوکيءَ جي مُند:

سفارش ڪيل جنسو	علائقو	پوکيءَ جو وقت
بنيظير-13، حمل-13 مومل-89، ابادگار-93، سرسبز، خرمن، سسئي ۽ ڪرن-95	ڏکڻ سنڌ	پهرين نومبر کان 20 نومبر
	اتر سنڌ	7 نومبر کان 30 نومبر
ٽي جي-83، انمول-91، سرسبز ۽ ڪرن-93	ڏکڻ سنڌ	21 نومبر کان 15 ڊسمبر
	اتر سنڌ	پهرين ڊسمبر کان 21 ڊسمبر
ٽي ڊي-1، سڪرنڊ-1، ڀٽائي ۽ مارئي-2000	سڄي سنڌ	پهرين نومبر کان 25 ڊسمبر

پوکڻ جا طريقا:

ڪڻڪ جي پوکي جا ٽي طريقا آهن
 1. چٽ ڪيڙ 2. ڪُر يا گهڙبي 3. ناڙي پوک.
 چٽ ڪيڙ سارين کان پوءِ واندِي ٿيل زمين لاءِ مناسب طريقو آهي. جڏهن ته سارين جي واندِي ٿيل زمين ۾ زير وڻاڻ لاءِ ذريعي پڻ پوکي ڪري سگهجي ٿي. پڪين، سم ۽ ڪلر وارين زمينن ۾ ڪُر يا گهڙبي پوک ڪجي. پر ڪُر يا گهڙبيءَ واري پوک لاءِ هڪ ته جڏهن زمين پاڻي گڻي وڃي ته پوءِ ٻج گپ ۾ ڇڻجي ۽ ٻج کي چٽن کان پهرين پاڻيءَ ۾ 8 کان 10 ڪلاڪ پسانڻ گهرجي. ٻج کي پاڻيءَ ۾ پسانڻ سان ٻج جو ڦوٽهڙو وڌيڪ ڀلو ٿيندو. اهڙي طرح پلين زمينن ۾ ڪڻڪ جي پوکي ناڙيءَ رستي ڪجي. ناڙي پوک ۾ گندگاهه جي ضابطي ۾ آساني ٿئي ٿي. پاڻ صحيح طريقي ٽجي ٿو. ٻج گهٽ استعمال ٿئي ٿو ۽ ڦوٽهڙو ڀلو ٿيڻ سان گڏ ناڙي پوک ٻين جي مقابلي ۾ وڌيڪ پيداوار ڏئي ٿي.

بج (ڪلوگرام في ايڪڙ):

جنسون	ناڙيءَ ذريعي	چٽ ڪپڙ ذريعي	ڪُريا گهڙبيءَ ذريعي	ڪرين تي پوک
اڳاٽي پوک	50	55	60	60
پاڇاڻي پوک	60	65	70	70

پاڻن جي گهرج:

عام طور تي سنڌ جون زمينون نائٽروجن، فاسفورس ۽ پوٽاش ۾ ڪمزور آهن. جڏهن ته عام آبادگار نائٽروجن ۽ فاسفورس وارا پاڻ ڪڻڪ کي ڏئي ٿو پر پوٽاش نٿو ڏئي. نائٽروجن ۽ فاسفورس ۾ به فاسفورس گهٽ ۽ نائٽروجن وڌيڪ ڏني وڃي ٿي جنهن جي ڪري گهريل پيداوار نٿي ملي. ان ڪري آبادگارن کي صلاح ٿي ٿئي ته زمين جي مٽي ڪنهن ويجهي مٽيءَ ۽ پاڻيءَ جي چڪاس واري ليبارٽريءَ مان ضرور چڪاس ڪرائن ۽ ليبارٽريءَ جي ماهرن جي سفارشن مطابق پاڻ جو استعمال ڪن. پر جيڪڏهن ڪنهن اٽلڙ سبب جي ڪري مٽي چڪاس نه ٿي سگهي ته پوءِ سٺي زمين ۾ هيٺين ريت ڪڻڪ جي فصل کي پاڻ ڏيڻ گهرجي:

1. $1\frac{1}{2}$ ٻوري ڊي اي پي، اڌ ٻوري يوريا ۽ هڪ ٻوري ايس او پي في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي.
2. ڪڻڪ جي ٽي ڊي-1 جنس کي 2 ٻوريون ڊي اي پي ۽ 3 کان 4 ٻوريون يوريا في ايڪڙ ڏجن.

ڪڻڪ لاءِ مرحليوار پاڻيءَ جي ورهاست

ڪل پاڻي	پهريون پاڻي ٽن هفتن يا 21 ڏينهن کان پوءِ	ٻيون پاڻي ڇهن هفتن يا 42 ڏينهن کان پوءِ	ٽيون پاڻي نئون هفتن يا 63 ڏينهن کانپوءِ	چوٿون پاڻي ٻارهن هفتن يا 84 ڏينهن کانپوءِ	پنجون پاڻي پندرهن هفتن يا 105 ڏينهن کانپوءِ	ڇهون پاڻي ارڙهن هفتن يا 126 ڏينهن کان پوءِ
6	پن پاڙ نڪرڻ وقت	ٻوڙي ٻڌڻ وقت	سنگ نڪرڻ وقت	بور اڇڻ وقت	داڻي ۾ ڪير ٿيڻ وقت	داڻي ٻڄڻ وقت
5	پن پاڙ نڪرڻ وقت	ٻوڙي ٻڌڻ وقت	سنگ نڪرڻ وقت	-	داڻي ۾ ڪير ٿيڻ وقت	داڻي ٻڄڻ وقت
4	پن پاڙ نڪرڻ وقت	ٻوڙي ٻڌڻ وقت	سنگ نڪرڻ وقت	-	داڻي ۾ ڪير ٿيڻ وقت	-
3	پن پاڙ نڪرڻ وقت	-	سنگ نڪرڻ وقت	-	داڻي ۾ ڪير ٿيڻ وقت	-
2	پن پاڙ نڪرڻ وقت	ٻوڙي ٻڌڻ وقت	-	-	-	-
1	پن پاڙ نڪرڻ وقت	ٻوڙي ٻڌڻ وقت	-	-	-	-

گندگاھه:

سوڙهن ٻنن وارن گاھن لاءِ ٽاپڪ 120 گرام في ايڪڙ ۽ ويڪرن ٻنن وارن گندگاھه لاءِ بڪٽرل سپر 300 کان 400 ملي لٽر في ايڪڙ ۽ سوڙهن ۽ ويڪرن گنديل گندگاھن لاءِ ايتلائنس 120 کان 160 ايفينٽي 600 کان 800 گرام في ايڪڙ ڦوهارو ڪجي. سمورن زهرن کي 120 لٽر پاڻي ۾

ملائي ڦوهارو ڪرڻ گهرجي. ڦوهاري لاءِ مشين ۾ گندگاهه وارو نوزل استعمال ڪجي.

جيت ۽ بيماريون:

جيتن ۽ بيمارين جو گهڻو ڪري سنڌ جي ايجاد ٿيل ڪڻڪ ۽ سفارش ڪيل جنسن تي حملو نٿو ٿئي پر جيڪڏهن موسمي حالتن جي ڪري ڪڻڪي حملو نظر اچي ته جلد حد جي زرعي ماهر سان رابطو ڪجي.

ڪڻڪ جون بيماريون:


ڪڻڪ جي فصل کي ڪيتريون ئي بيماريون لڳن ٿيون. جيڪي پيداوار تي اثر انداز ٿين ٿيون. انهن کي روڪڻ لاءِ ضروري آهي ته:

- مدي خارج جنسون نه پوکيون وڃن.
 - بيمارين کان پاڪ ۽ سفارش ڪيل جنسون پوکجن.
 - پوکي کان پهريان ذڪر ڪيل دوائون جهڙوڪ؛ وائٽوڪس، ٽاپس ايم يا بينليٽ وغيره بچ سان ملائي پوءِ پوکڻ گهرجن.
 - فصلن جي وار ڦير سان پوکي ڪرڻ گهرجي.
 - ڪاڻي (Smut) لڳل ٻوٽو يا سنگ پٽي ساڙي ڇڏڻ گهرجي.
- سنڌ ۾ لڳندڙ بيمارين جون علامتون ۽ بچاءُ جا اپاءَ هيٺ ڏجن ٿا.



پيلي يا پٽا پٽي رتي (Strip or Yellow Rust)

هي بيماري گهٽ سڀڙ پوڻ ڪري ڪڏهن ڪڏهن ڪڻڪي ڪڍي لڳي ٿي. گرمي جي درجي وٽن سان خود بخود ختم ٿي وڃي ٿي. هن بيماري ۾ پنن تي پيلي رنگ جي ليڪا ٿيندا آهن. آخر ۾ داڻا سڪي ختم ٿي ويندا آهن. هن بيماري کان بچاءُ لاءِ بيماري کان پاڪ جنسو پوکيون وڃن. جيڪڏهن فصل ۾ بيماري لڳي وڃي ته ان جي ضابطي لاءِ ٽلٽ 200 ملي لٽر يا اڻسٽار 250 ملي لٽر يا اسڪور 150 ملي لٽر في ايڪڙ ڦوهارو ڪريو.



پن واري رتي (Leaf Rust)

هن بيماري جو سنڌ ۾ شديد حملو ٿئي ٿو. تدارڪ نه ڪرڻ سان ڪافي نقصان ٿئي ٿو. هن بيماري ۾ پنن تي نارنگي يا بادامي رنگ جا ڦلڪا ٿين ٿا ۽ انهن مان ناسي رنگ جا گول ذرڙا هر وقت خارج ٿين ٿا جيڪي هوا جي ذريعي اڏامي ملين ۾ پڪڙجي وڃن ٿا.

هن بيماري کان بچڻ لاءِ به ضروري آهي ته بيماري کان پاڪ ۽ سفارش ڪيل جنسون پوکڻ گهرجن. جيڪڏهن فصل ۾ بيماري لڳي وڃي ته ان جي ضابطي لاءِ ٽلٽ 200 ملي لٽر يا اڻسٽار 250 ملي لٽر يا اسڪور 150 ملي لٽر في ايڪڙ ڦوهارو ڪريو.

ڪاري يا تيلي جي رتي (Stem Rust)

هن بيماري جو حملو پنن، تيلن ۽ سڱن تي ٿئي ٿو. شروعات ۾ الڳ الڳ ڳاڙها يا ناسي داغ ٿيندا آهن. جيڪي سخت حملي جي صورت ۾ ڪارو رنگ اختيار ڪري ملي ويندا آهن. هن بيماري جا جراثيم هوا وسيلي پري پري تائين پکڙجي ويندا آهن. 12 کان 18 ڏينهن تائين ڦيرو پورو ڪري ٻئي فصل ۾ جراثيم پکڙيندا آهن. هي بيماري خاص ڪري فيبروري ۾ لڳندي آهي. بچڻ لاءِ ضروري آهي ته بيماري کان پاڪ ۽ سفارش ڪيل جنسون پوکڻ گهرجن. جيڪڏهن فصل ۾ بيماري لڳي



وڃي ته ان جي ضابطي لاءِ ٽلٽ 200 ملي لٽر يا اڻسٽار 250 ملي لٽر يا اسڪور 150 ملي لٽر في ايڪڙ ڦوهارو ڪريو.

ڪاٺي (Smut)



سنڌ ۾ هن بيماري جو صرف هڪ قسم کليل ڪاٺي (Loose Smut) لڳندي آهي. هن بيماري جو حملو صرف سنگ تي ٿيندو آهي. جيڪو ڪاري بوري ۾ تبديل ٿي ويندو آهي. هوا ۾ اڏامي ٻئي فصل تي جراثيم پکيڙيندو آهي. متاثر ٿيل ٻوٽا ٻين ٻوٽن کان اڳ سڙڻ ۽ سڪڻ شروع ڪن ٿا. هن بيماري کان بچڻ لاءِ اهڙو بچ استعمال ڪجي جيڪو صحتمند ۽ گندگاه کان پاڪ هجي. پوکي لاءِ پاڪ ۽ سفارش ڪيل جنسون پوکڻ گهرجن.

پوکي کان اڳ وائٽوڪس 220 يا بينليٽ 50 ڊبليو جي دوا جا 2 گرام في ڪلو گرام بچ سان چڱي طرح ملائي پوءِ بچ پوکڻ گهرجي. جون جولاءِ مهينن ۾ گرمي جو درجو 38 ڊگري سينٽي گريڊ کان مٿي هجي ته متاثر بچ عام پاڻي ۾ 4 ڪلاڪ پسائي، سنهي تهه سان پکيڙي چڱي طرح سڪائي، بچ ۾ موجود جراثيم ختم ڪري سگهجن ٿا. جيڪڏهن فصل ۾ بيماري لڳي وڃي ته ان جي ضابطي لاءِ ٽلٽ 200 ملي لٽر يا اين اسٽار 250 ملي لٽر يا اسڪور 150 ملي لٽر في ايڪڙ ڦوهارو ڪريو.

ڪڻڪ جو لاٻارو ۽ ڳاهه

ڪڻڪ مان في ايڪڙ بهتر پيداوار حاصل ڪرڻ لاءِ لاٻارو ۽ ڳاهه صحيح وقت تي ڪرڻ گهرجي. يعني ته اڃا ڪڻڪ ٿوري ڪڇي هجي ته لاٻارو نه ڪجي ۽ پڇي وڃڻ کان پوءِ لاٻاري ۾ دير نه ڪجي جيڪڏهن ڪڇي ڪڻڪ جو لاٻارو ڪيو ويو ته داڻا مارجي ويندا. ۽ وري پڇي وڃڻ کان پوءِ لاٻاري ۾ گهڻي دير ڪئي وئي ته ڪڻڪ جا سنگ ٽٽي پوندا ۽ سنگ ۾ موجود داڻا ڇڻي ويندا. جنهن ڪري پيداوار گهٽجي ويندي.

جڏهن مارچ ۽ اپريل مهينن ۾ جيئن ئي گرمي وڌندي آهي ته ڪڻڪ جو فصل به پڇي راس ٿيندو آهي. جڏهن ڪڻڪ جو رنگ سائي مان ڦري پيلو يا سونهري ٿي وڃي تڏهن ۽ سنگ سڪي وڃن ۽ مڙڻ لڳن ۽ جڏهن 95 کان 98 سيڪڙو سنگ پڇي وڃن ته لاٻاري ۾ دير نه ڪجي. لاٻاري ۾ 10 کان 15 ڏينهن دير ڪرڻ سان ڪڻڪ 5 کان 10 سيڪڙو ڇاڻو ڪري زبان ٿي وڃي ٿي. ان ڪري ايڏي وڏي نقصان کان بچڻ لاءِ وقت تي لاٻارو ڪرڻ تمام ضروري آهي.

لاٻارو هميشه صبح جو سوير يعني فجر جو شروع ڪجي ۽ منجهند کان اڳ ختم ڪجي. ڇو ته گرميءَ جو درجو وڌڻ ڪري سنگ ٽٽڻ ۽ داڻن ڇڻڻ جو انديشو هوندو آهي. لاٻارو زمين سان لائي ڪرڻ گهرجي ته جيئن ٻُهو وڌيڪ حاصل ٿئي لاٻاري ڪرڻ وقت تڪڙ بلڪل نه ڪجي ۽ سٿريون هڪ مهاڙيون ٺاهجن ۽ ڪوشش ڪري گڏ ڪري ٻين ۽ سرن مان ٺهيل نوڙين يا ننڍن پراڻي واڻ سان ننڍا ننڍا گڏا ٻڏي ڇڏجن. ڇو ته هن وقت تيز هوا، برسات ۽ ڳڙي وغيره جو خطرو هوندو آهي. پوءِ جيڪڏهن گڏا ٻڌل نه هوندا ته ول ٽڙي پکڙي زبان ٿي ويندي. گڏن کي ٻن ٽن ڏينهن لاءِ ٻني ۾ رهڻ ڏجي ته جيئن ول چڱيءَ طرح سڪي وڃي ۽ ان ڳاهه جي مشين مان آساني سان صاف ٿي نڪري سگهي ۽ داڻا پڇي ٿي زبان نه ٿين.

ذخيرو:

ڪڻڪ کي ذخيرو وارن جيتن کان بچاءُ لاءِ اُن ڏيري مان صاف بورين ۾ پرڇي ۽ گندين کي صاف ڪجي. گهرن ۾ ننڍي سطح تي ڪڻڪ ذخيرو ڪرڻ لاءِ ڪڻڪ کي چڱيءَ طرح اُس ۾ سڪائي صاف گندي ۽ وجهي نم جا پن وجهي فاسٽاڪسن جون گوريون وجهي هوا بند ڪري ڪنهن کليل هوادر ۽ جانوري واري جاءِ تي رکڻ گهرجي. پر جي ڪڻڪ وڏي پئماني تي ذخيرو ڪرڻي هجي ته 2 ڪلو ڇُن 2 ڪلو ٽوٽيو الڳ الڳ پلاسٽڪ جي ٿاڻو ۾ 24 ڪلاڪ ڳاري ڪپڙي ۾ ڇاڻي ڪري 50 لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي گدام جي پٽين، ڇت ۽ فرش تي پوڇي ڪرڻ گهرجي. اهو عمل ڪڻڪ ذخيرو ڪرڻ کان هڪ مهينو اڳ ڪرڻ گهرجي ۽ بعد ۾ فاسٽاڪسن جون گوريون وجهي گدام کي هوا بند ڪجي.



ساريون - Rice

زمين:

سارين جي فصل لاءِ اهڙي چيڪي يا لٽياسي زمين جي چونڊ ڪجي، جيڪا زرخيز هجي ۽ نامياتي مادو چڱي مقدار ۾ رکندي هجي.

سارين جون جنسون:

ديسي جنسن ۾ اري - 6، اري - 8، ڊي آر - 92، ڊي آر - 82، ڊي آر - 83، سدا حيات، ڪنول - 95، لطيفي، خوشبو - 95، شاداب، شعاع - 92، سرشار، مهڪ، شاندار ۽ ڪي ايس-282 پوکڻ لاءِ موجود آهن. جڏهن ته هائبرڊ جنسون جهڙوڪ، گارڊ، شهنشاهه، انمول ۽ ڊائمنڊ وغيره پوکجن ٿيون.

سارين جي جنسن جو علائقي ۽ مند آهر بيجارو پوکڻ ۽ رونبو ڪرڻ لاءِ وقت

بيجارو پوکڻ جو وقت		جنسون
اٽر سنڌ	ڏکڻ سنڌ	
(لاڙڪاڻو، شڪارپور، جيڪب آباد، سکر، دادو ضلعي جا ميهڙ ۽ خيرپور ناٿن شاهه تعلقا)	(نٿو، بدين ۽ حيدرآباد ضلع جو ٽنڊو محمد خان تعلقو)	
مئي جي ٻئي هفتي کان جون جي ٻئي هفتي تائين	اپريل جي ٽئين هفتي کان مئي جي ٻئي هفتي تائين	اري - 6، اري - 8 سدا حيات
مئي جي آخري هفتي کان جون جي آخري هفتي تائين	مئي جي ٻئي هفتي کان جون جي ٽئين هفتي تائين	ڊي آر - 82، ڊر آر - 92
جون جي ٽئين هفتي کان جولاءِ جي ٻئي هفتي تائين	جون جي پهرين هفتي کان جولاءِ جي پهرين هفتي تائين	ڊر آر - 83
اپريل جي ٻئي هفتي کان مئي جي ٻئي هفتي تائين	اپريل جي پهرين هفتي کان مئي جي پهرين هفتي تائين	ڪنول - 95
جون جي ٻئي هفتي کان جولاءِ جي پهرين هفتي تائين	مئي جي ٽئين هفتي کان جون جي آخري هفتي تائين	لطيفي
مئي جي ٻئي هفتي کان جون جي آخري هفتي تائين	اپريل جي ٽئين هفتي کان مئي جي آخري هفتي تائين	خوشبو - 95، شاداب، شعاع، سرشار، مهڪ ۽ شاندار
رونبي جو وقت		جنسون
اٽر سنڌ	ڏکڻ سنڌ	
(لاڙڪاڻو، شڪارپور، جيڪب آباد، سکر، دادو ضلعي جا ميهڙ ۽ خيرپور ناٿن شاهه تعلقا)	(نٿو، بدين ۽ حيدرآباد ضلع جو ٽنڊو محمد خان تعلقو)	
جون جي ٻئي هفتي کان جولاءِ جي ٻئي هفتي تائين	مئي جي ٽئين هفتي کان جون جي ٻئي هفتي تائين	اري - 6، اري - 8 سدا حيات
جون جي آخري هفتي کان جولاءِ جي آخري هفتي تائين	جون جي ٻئي هفتي کان جولاءِ جي ٽئين هفتي تائين	ڊي آر - 82، ڊر آر - 92
جولاءِ جي ٽئين هفتي کان	جولاءِ جي پهرين هفتي کان	ڊر آر - 83

اگسٽ جي پھرين ھفتي تائين	اگسٽ جي ٻئي ھفتي تائين	
جولاءِ جي پھرين ھفتي کان	جولاءِ جي ٽئين ھفتي کان	ڪنول - 95
اگسٽ جي پھرين ھفتي تائين	اگسٽ جي ٻئي ھفتي تائين	
جون جي ٽئين ھفتي کان	جولاءِ جي ٻئي ھفتي کان	لطيفي
جولاءِ جي پھرين ھفتي تائين	اگسٽ جي پھرين ھفتي تائين	
مئي جي ٽئين ھفتي کان	جون جي ٻئي ھفتي کان	خوشبو - 95، شاداب،
جون جي آخري ھفتي تائين	جولاءِ جي ٽئين ھفتي تائين	شعاع، سرشار، مھڪ ۽ شاندار

بج جو مقدار

ٻيجارو ڀوڪڻ لاءِ تيار ڪيل اڌ ويسِي جون ٻه ٻاريون هڪ ايڪڙ جي روني لاءِ سفارش ڪجن ٿيون ۽ هڪ ٻاريءَ ۾ ٻج جو مقدار جنس وار هيٺ ڏجي ٿو.

جنس	اڌ ويسِي جي ٻاريءَ ۾ ٻج جو مقدار
اري - 6، اري - 8، سدا حيات، ڊي آر - 92، ڊي.آر - 82، ڊي.آر - 83، ڪنول - 95	6 کان 7 ڪلو گرام
خوشبو - 95، شاداب، شعاع - 92، سرشار، مھڪ ۽ شاندار	$3\frac{1}{2}$ کان 4 ڪلو گرام

زمين جي تياري ۽ ڀوڪي

جيڪڏهن زمين ڊيگن ذريعي تيار ڪرڻي هجي ته 3 کان 4 خشڪيءَ جا هر ٽيڻ گهرجن. پر جيڪڏهن ٽريڪٽر استعمال ڪرڻو هجي ته پوءِ راجا هر ذريعي اونها هر ٽنجن. هر ٽيڻ بعد زمين کي 3 هفتا کليل ڇڏجي. ان کانپوءِ 2 هر ڪلٽوريٽر جا يا هڪ هر پٽر ڇڏڻ واري هر يعني روتاوٽر جو ٽئي زمين کي ڀوڪيءَ لاءِ تيار ڪجي.

پوکيءَ جا طريقا: رونيي رستي پوک:

سارين جي پوکي قطارن ۾ ڪجي. قطارن واري فصل ۾ ٻوٽن جو گهريل تعداد يعني 80000 کان 100000 ملي ٿو. جنهن جي ڪري پيداوار سٺي لهي ٿي. قطارن جي وچ ۾ 8 انچن جو مفاصلو رکجي. رونيي لاءِ هاڻ نڀيون وڏيون هر قسم جون مشينون پڻ ايجاد ٿي ويون آهن. پر جي لس واري طريقي سان رونيو ڪرڻو هجي ته پوءِ هڪ چورس ميٽر جي ڪاٺ جي چوڪائي (فريم) اندر 25 سلا هڻجن ته گهريل ٻوٽن جو تعداد ملي ويندو.

چٽ رستي پوک

هن طريقي سان ڏاکڻي سنڌ (لاڙ) جي ڪجهه علائقن ۾ ساريون پوکيون وڃن ٿيون. جنهن لاءِ تيار زمين ۾ پائي ٽئي بچ ڇڏيو ويندو آهي.

ناڙيءَ رستي پوک

هن طريقي ۾ تيار زمين کي ريج ڪرڻ کان پوءِ وٽ اچڻ تي زمين کي ڪلٽيوئيز جا ٻه هر پويان ڳاڙهي ٻڌي ڏجن. جنهن بعد ڪٽڪ وانگر ناڙي ڪجي. ليڪن پوکيءَ لاءِ ڏهه ٻارنهن ڪلاڪ پهرين بچ کي پُسلڻ رکجي. ان کان پوءِ ٿوري وقت لاءِ ڪنهن صاف جاءِ تي پکيڙجي ته جيئن اهو خشڪ ٿئي ۽ بعد ۾ پوکي ڪجي ته ڦوٽهڙو سٺو ٿيندو.

سُڪي زمين ۾ سارين جي پوک:

سارين جي هن ٽيڪنالاجيءَ ۾ زمين کي سڪيءَ جا چڱيءَ ريت هر ٽئي زمين تيار ڪري ناڙيءَ رستي پوک ڪجي. پوکيءَ لاءِ قطار کان قطار جي وچ ۾ مفاصلو 8 انچ بيهارڻ گهرجي. ناڙي ڪرڻ کانپوءِ پاڻي ڏئي ڇڏجي. جڏهن زمين ڌار ڏئي وڃي جنهن ۾ گهڻو ڪري هڪ هفتو لڳي وڃي ٿو. ان بعد پهرئين پاڻي طور هڪ ٻوري ڊي اي پي، اڌ ٻوري يوريا ۽ 12 ڪلوگرام پوٽاش في ايڪڙ ڇڏي پهريون پاڻي ڏيڻ گهرجي. اهڙي طرح ٻيو پاڻي 20 ڏينهن بعد مٺي ٻوري يوريا في ايڪڙ ڏجي. جڏهن ته آخري پاڻي فصل جڏهن ٻڌي تي پهچي ته مٺي ٻوري يوريا في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي. هن پوکيءَ جي طريقي ۾ هن وقت DR-92 ۽ شاهڪار جنسون ڪامياب وڃي رهيون آهن.

جنسوار ڪيميائي پاڻن جون سفارشون	
سفرش ڪيل مقدار في ايڪڙ	پاڻ ڏيڻ جو وقت
اري - 6، اري - 8، ڊي.آر - 92، ڊي.آر - 82، ڪنول - 95 ٻه ٻوريون يوريا ۽ سوا ٻوري ڊي اي پي يا اڍائي ٻوريون يوريا ۽ پوٽاشون ٽي ٻوريون ايس-ايس-پي.	رونيي کان هڪ يا ٻه ڏينهن اڳ ۾ سمورو ڊي اي پي ۽ اڌ ٻوري يوريا يا هڪ ٻوري يوريا ۽ پوٽاشون ٽي ٻوريون ايس-ايس-پي زمين ۾ ڇڏي مٿان ريج ڏجي جڏهن ته باقي رهيل يوريا مان مٺي ٻوري رونيي کان 20 ڏينهن بعد ۽ مٺي ٻوري رونيي کان 40 کان 50 ڏينهن بعد
ڊي.آر - 83 سوا ٻوري يوريا ۽ مٺي ٻوري ڊي-اي-پي يا ٽيڊ ٻوري يوريا ۽ پوٽاشون ٻه ٻوريون ايس-ايس-پي	رونيي کان هڪ يا ٻه ڏينهن اڳ ۾ سمورو ڊي-اي-پي ۽ مٺي ٻوري يوريا يا اڌ ٻوري يوريا ۽ پوٽاشون ٽي ٻوريون ايس-ايس-پي ڏجي. جڏهن ته باقي يوريا جي رهيل وزن مان اڌ رونيي کان 15 کان 20 ڏينهن بعد ۽ ٻيو رونيي کان 35 کان 40 ڏينهن بعد
لطيفي سوا ٻوري يوريا ۽ سوا ٻوي ڊي-اي-پي	رونيي کان هڪ يا ٻه ڏينهن اڳ ۾ سمورو ڊي-اي-پي ۽ يوريا جي پوريءَ جو چوٿون حصو ڏجي. جڏهن ته باقي يوريا جي رهيل وزن جو اڌ رونيي کان 15 کان 20 ڏينهن بعد ۽ ٻيو اڌ رونيي کان 35 کان 40 ڏينهن بعد
سدا حيات	رونيي کان هڪ يا ٻه ڏينهن اڳ ۾ سمورو ڊي-اي-پي

پي ۽ آڌ ٻوري يوريا يا هڪ ٻوري يوريا ۽ پوٿيون ٿي ٻوريون ايس-ايس-بي ڏجي جڏهن ته پوٿيون ٿي ٻوريون ايس-ايس-بي ڏجي رهيل يوريا جو هڪ حصو روٽي کان 20 ڏينهن بعد ۽ ٻيو حصو 50 کان 55 ڏينهن بعد ڏجي.	ٻه ٻوريون يوريا ۽ سوا ٻوري ڊي-اي-بي يا اڍائي ٻوريون يوريا ۽ پوٿيون ٿي ٻوريون ايس-ايس-بي
مني ٻوري يوريا ۽ هڪ ٻوري ڊي-اي-بي پوکيءَ کان پهريائين بنيادي وزن طور ۽ باقي رهيل مني ٻوري يوريا ڏيو نسرڻ وقت ڏجي.	خوشبو - 95 ڏيڍ ٻوري يوريا ۽ هڪ ٻوري ڊي-اي-بي
يوريا پاڻ جو آڌ وزن ۽ ڊي-اي-بي جو سمورو مقدار پوکيءَ کان پهرين بنيادي وزن طور ۽ نانٽروجن پاڻ جو آڌ وزن ڏيو نسرڻ وقت ڏجي.	شاداب، شعاع - 92، سرشار مهڪ ۽ شاندار اڍائي ٻوريون يوريا ۽ سوا ٻوري ڊي-اي-بي يا اڍائي ٻوريون يوريا ۽ ٽي ٻوريون ايس-ايس-بي
روٽي کان هڪ يا ٻه ڏينهن اڳ ۾ سمورو ڊي-اي-بي ۽ آڌ ٻوري يوريا يا هڪ ٻه ٻوريون زرخيز يا ٻه ٻوريون امونيم فاسفيٽ ۽ هڪ ٻوري سلفيٽ آف پوٽاش ڏجي. جڏهن ته رهيل يوريا جو هڪ حصو روٽي کان 20 ڏينهن بعد ۽ ٻيو حصو 50 کان 55 ڏينهن بعد ڏجي.	هائبرڊ ٽي ٻوريون يوريا ۽ ڏيڍ ٻوري ڊي-اي-بي يا ٻه ٻوريون موني امونيم فاسفيٽ ۽ هڪ ٻوري سلفيٽ آف پوٽاش يا اڍائي ٻوريون يوريا ۽ ٻه ٻوريون زرخيز

پاڻي:

ٻججارو هٿڻ کان 4 کان 6 ڏينهن پهرين ايترو ريڇ ڪجي، جيئن روٽي وقت زمين ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ انچ پاڻي بيٺل هٿڻ گهرجي جنهن ۾ روٽو ڪجي. ان بعد آهستي آهستي فصل ۾ 3 کان 4 انچ تائين پاڻي وڌائڻ گهرجي. فصل مان بيٺل پاڻي نيڪال به ڪيو رهي. اهڙي طرح لڌاري کان 10 يا 15 ڏينهن پهرين پاڻي بند ڪرڻ گهرجي. جڏهن ته ناڙي واري پوک ۾ فصل ۾ ڦوٽهڙي بعد ٻهريون پاڻي ڏجي ۽ باقي پاڻي مٿئين طريقي موجب ڏجن. اهڙي طرح ڇٽ ۾ وري شروعات ۾ ئي تڪڙا پاڻي ڏبا ڇڏجن ته جيئن ڦوٽهڙو جلد ۽ سٺو ٿئي.

زنڪ جو استعمال:

ڪرائي هيٺاهين، سخت زمينن ۾ جتي لڳاتار پاڻي بيهي ٿو. اُتي زنڪ جي کوٽ ٿئي ٿي. ان لاءِ زنڪ سلفيٽ (20 سيڪڙو) 16 ڪلوگرام في ايڪڙ يا آسٽريليا يا چائنا جو ٺهيل زنڪ سلفيٽ (36 سيڪڙو) 9 ڪلوگرام في ايڪڙ جي حساب سان اوتري ئي سڪل مٽي يا يوريا پاڻ سان ملائي فصل ۾ روٽي کان 12 کان 15 ڏينهن بعد ڇڻڻ گهرجي.

گندگاهه:

مارڪيٽ ۾ ڪيترن ئي قسمن جو سارين جي فصل مان گندگاهه کي ختم ڪرڻ لاءِ گاهه مار زهر موجود آهن. جيڪي روٽي جي چار ڏينهن اندر بيٺل پاڻيءَ ۾ استعمال ڪرڻ سان گندگاهه تي ضابطو آڻي سگهجي ٿو.

گوٺ پرڻ:

ضرورت موجب جتي فصل ۾ گوٺ نظر اچي ته ان کي فوري طور تي پرڻ گهرجي.

جيت:

روٽي ٿيل فصل ۾ ڪيٽن يا گٽر کان بچاءُ لاءِ هيٺ ڄاڻايل داڻيدار دوائن مان ڪابه هڪ پهريون ڀيرو روٽي بعد 35 کان 40 ڏينهن دوران ۽ ٻيو ڀيرو 55 کان 60 ڏينهن دوران استعمال ڪرڻ گهرجي. ان لاءِ؛ پاڊان 4 سيڪڙو 9 ڪلوگرام في ايڪڙ يا ورٽاڪو 6 سيڪڙو 4 ڪلوگرام في

ايڪڙ يا فيور اڍان 3 سيڪڙو 9 ڪلوگرام في ايڪڙ يا روٽاپ 4 سيڪڙو 10 ڪلوگرام في ايڪڙ. نوٽ: دائيدار دوا جي استعمال کان اڳ ٻنن جي ڌارن ۽ ٻرن وغيره کي آلي مٽيءَ سان لپيو ڏجي ته جيئن دوا لڳل ٻارن جو پاڻي ٻين ٻارن ڏانهن وهي نه وڃي ۽ فصل ۾ پاڻيءَ جي سطح 4 کان 6 انچ بيهارڻ گهرجي.

اڇي پنيءَ وارو مهلو:



اڇي پنيءَ وارو مهلو يا سارين جي آلي هن فصل کي گهڻو نقصان پهچائي ٿي. هي جيت ننڍڙو ٿئي ٿو. جيڪو فصل ۾ بيٺل پاڻيءَ جي مٿان نظر ايندو آهي ۽ فصل جي ٻوٽن تي هيٺيان کان حملو ڪندو آهي. جنهن ۾ ٻوٽن جي رس چوسي انهن کي سڪائي ڪارو ڪري ڇڏيندو آهي. جيڪي سڙي ختم ٿي ويندا آهن. هن جيت جي نقصان کان بچڻ لاءِ پاڇائي پوک نه ڪرڻ گهرجي. ٻارن جا ٻنا هميشه ننڍا ٺاهڻ گهرجن. هن جيت لاءِ قوت مدافعت رکندڙ جنسون جهڙوڪ: سدا حيات پوکڻ گهرجن ساڳئي وقت فصل کي گهاٽو ٿيڻ نه ڏجي. فصل اندر هوا ۽ آس جي صحيح گذر لاءِ جڏهن قطارون پاڻ ۾ ملي وڃن ته هٿن سان هر پنجن قطارن کان پوءِ ٻها ٺاهجن. آليءَ کان بچاءُ فصل پوکڻ کان اڳ ۾ پنيءَ ۾ بيٺل وڻن جي ڇانگ ڪرڻ گهرجي ته جيئن فصل ۾ ڇانورو نه ٿئي. سارين جي روئي کان 55 ڏينهن بعد نانٽروجن وارو پاڻ نه ڏجي، ٻي صورت آليءَ جو مسئلو شدت اختيار ڪري ويندو. وڌيڪ حملي جي صورت ۾ اميدا گروپ جي ڪونفيڊور يا اسپتامپرڊ گروپ جي موسيلا استعمال ڪري سگهجي ٿي.



سارين جو پن ويڙهو:

هن جيت جي موجودگيءَ جي جانچ روئي بعد 40 کان 45 ڏينهن کان پوءِ شروع ڪجي. هن جيت جو به حملو ڇانوري واري هنڌ، گهاٽي فصل ۽ گهڻي ڏنل نانٽروجن واري فصل ۾ وڌيڪ ٿئي ٿو. جنهن جو خيال رکڻ گهرجي. هي جيت فصل جا پن ٽڪي ٿو ۽ انهن کي ويڙهي ڇڏي ٿو. ٻه کان ٽي پن ويڙهيل نظر اچن ته زهر جو استعمال ڪرڻ گهرجي. ان لاءِ سارين جي پن ويڙهي کان فصل کي بچائڻ لاءِ پيرائٽرائيڊ گروپ جون دوائون يعني لمڊا سپهايلوٿرين 400 ملي لٽر في ايڪڙ استعمال ڪجي ۽ ان سان ملندڙ دوائون استعمال ڪجن.

سارين جي جونءَ:

بعد 20 کان 25 تي ڪسين جي طرح هن جيت زمين ۾ پاڻيءَ جي حملو ٿئي ٿو. هي تمام ننڍڙا ۽ ٻوٽن کي ڇهڻيل نظر



هي جيت سارين ۾ روئي ڏينهن کان وٺي خاص طور پاسن تي نظر اچن ٿا. اهڙي جي شروعات ۾ غير هموار سطح کان مٿي بيٺل ٻوٽن ۾ جيت عام طور تي جسامت ۾ جي ٻاهرين پنن اندر ڏانڊين

ايندا آهن. جيڪي ٻوٽن جو رس چوسي وٺندا آهن ۽ نتيجي ۾ متاثره ٻوٽن جي واڌ ويجهه رڪجي وڃي ٿي. ٻوٽا پيلا ٿي سڪي وڃن ٿا ۽ سنگ ننڍا خالي يا ان جا داڻا گهٽ تعداد ۾ ٿين ٿا. جيڪڏهن فصل ۾ جونءَ جو حملو نظر اچي ته پوءِ روئي جي 35 کان 40 ڏينهن تي ڊانفيٿيورن گروپ جو زهر يا ڪنهن به مائيٽي سائڊ يا ان سان ملندڙ زهر جو استعمال ڪجي.

بیماریون:

1. رتيء جي بیماری: بیماریء کان پاڪ صاف ۽ صحتمند بچ استعمال ڪجي. حملي جي صورت ۾ اسڪور 150 ملي لٽر في ايڪڙ يا ڊائيڊينوڪونازول 150 ملي لٽر في ايڪڙ تي اسپري ڪجي.
 2. ڪاٽيءَ جي بیماری: بیماریء کان پاڪ صاف ۽ صحتمند بچ استعمال ڪجي. حملي جي صورت ۾ اسڪور 150 ملي لٽر في ايڪڙ يا ڊائيڊينوڪونازول 150 ملي لٽر في ايڪڙ تي اسپري ڪجي.
- بچ کي ڀوڪڻ کان اڳ بیمارین جي بچاءَ وارو زهر لڳائي پوءِ ڀوکجي ۽ بچ صحتمند ڀوڪڻ گهرجي. سارين واري زمين ۾ پوئاش وارو پاڻ ڏيڻ گهرجي. ڀوک ڀاڄائي نه ڪجي ۽ پاڻ جو سفارش ڪيل مقدار ڏجي فصل مان گندگاهه صاف ڪبو رهجي.

ڪوئن کان بچاءَ:



ڪوئن کان فصل کي بچائڻ لاءِ راکومن يا ڪلورو فېسپيٽان بېٽ استعمال ڪرڻ گهرجي يا ڌرڙن ۾ ساڻي ماڳ پائوڊر واس ڪرڻ گهرجي، يا وري فاسٽاڪسن جي هڪ ٽڪي هڪ ڌرڙ ۾ استعمال ڪجي ۽ ان کان پوءِ ڌرڙ کي مٽي سان بند ڪرڻ گهرجي.

لابارو

جڏهن ساريون 95 سيڪڙو ڀڄي وڃن ۽ سنگ ۾ پلال جهڙو رنگ ڏيکارين ته لابرارو شروع ڪجي. لابراري ڪرڻ وقت سارين جون سٿريون ترتيبوار ۽ هڪ ڪريون ڪري ٻڌجن ۽ اتي ئي زمين ۾ 2 کان 4 ڏينهن سڪڻ لاءِ ڇڏجن. لابراري لاءِ هاڻ ننڍيون هٿ سان هلندڙ موٽر واريون مشينون اچي ويون آهن اهي به استعمال ڪري وقت ۽ محنت بچائي سگهجي ٿي. گهڻي ايراضيءَ جي صورت ۾ ڪمبائن هارويسٽر جي استعمال سان وقت ۽ مزدوريءَ جي بچت سان گڏ لابراري ۽ لابراري کان پوءِ وارا نقصان گهٽائي سگهجن ٿا.

اسٽوريج

سارين کي اسٽور ڪرڻ کان پهرين چڱي طرح اُس ۾ سڪائڻ تمام گهڻو ضروري آهي. ٻي صورت ۾ سارين ۾ موجود نمي يا گهم جي ڪري گرمي جو درجه حرارت تمام گهڻو وڌي ويندو آهي. ان کان علاوه سارين ۾ فڦونڊي (Fungus) لڳي ٿي جنهن جي ڪري چانور جو معيار ۽ ڏانقو تمام گهڻو متاثر ٿئي ٿو. ان لاءِ سارين کي سج جي روشني ۾ هڪ ٻه ڏينهن سڪائڻ ضروري آهي ته جيئن گهريل معيار کي برقرار رکي سگهجي.

وونئنن - Cotton



پوکيءَ جو وقت:

پوکيءَ جو وقت	علائقو
15 مارچ کان 31 مارچ تائين	ضلعو ٺٽو ۽ بدين
پهرئين اپريل کان 30 اپريل تائين	ٺر، ميرپورخاص ۽ عمرڪوٽ
15 اپريل کان 15 مئي تائين	حيدرآباد، ٺٽو محمد خان، ٺٽو الهيار، مٽياري ۽ ڄامشورو
15 اپريل کان 20 مئي تائين	سانگهڙ
پهرئين مئي کان 31 مئي تائين	دادو، بينظيرآباد ۽ نوشهروفيروز
15 مئي کان 15 جون تائين	خيرپور، سکر، ڪشمور، گهوٽڪي، لاڙڪاڻو، قمبر شهدادڪوٽ، شڪارپور ۽ جيڪب آباد

زمين جي تياري:

وونئنن جي فصل جي سٺي پيداوار لاءِ اهڙي زرخيز زمين چونڊڻ گهرجي. جيڪا پاڻي جذب ڪرڻ جي صلاحيت رکڻ سان گڏ دير تائين وڻ کي قائم رکي سگهي. خاص ڪري نرم لٿياسِي يا چيڪي لٿياسِي زمين جي چونڊ ڪجي. چونڊيل زمين ۾ سڪيءَ جا اونهه هڻجن. ان کانپوءِ ٻارا ٺاهي اهڙيءَ طرح ناليون ٺاهجن جو هر ٻاري کي ڌار ڌار پاڻي ملي. ياد رکڻ گهرجي ته وونئنن جي فصل لاءِ هر هميشه اونهو استعمال ڪجي جيڪو ڪافي هيٺ تائين زمين ۾ لهي وڃي ۽ زمين کي اهڙيءَ طرح سڌائي ۾ اٿجي جو ڪٽي به پاڻي نه بيهي ۽ فصل کي هڪ جهڙو پاڻي ۽ پاڻ ملي سگهي.

وونئنن جي فصل جي پوکيءَ جا طريقا:

سنڌ ۾ وونئنن جي پوک عام طور تي ته ناڙيءَ ذريعي ڪئي وڃي ٿي پر ڪرين ۽ ويڪرن ڪرين بئن تي به هيءَ فصل پوکيو وڃي ٿو. وونئنن جي ناڙيءَ رستي پوک لاءِ قطارن جي وچ ۾ اڍائي فوٽن جو مفاصلو ۽ ڇڏائيءَ کانپوءِ بوٽن جي وچ ۾ 9 انچ مفاصلو رکيو وڃي. ڪرين تي هوا جي رخ کي نظر ۾ رکندي 9 انچن جي فاصلي تي 2 کان 3 ڏاڏا چنگيءَ جي صورت ۾ لڳائڻ گهرجن. ڪرين يا بئن جي وچ ۾ نالي مٺي فوٽ کان وڌيڪ ويڪري نه هجي. ويڪرن ڪرين بئن تي ٻنهي پاسن کان چنگيون لڳائڻ گهرجن.

بج جو مقدار:

بج هميشه اعتماد وارن ادارن، ڪمپنين يا زميندارن کان حاصل ڪرڻ گهرجي. خاص ڪري سنڌ ۾ بي ٽي جنسن جي پوک ڪرڻ وقت اهڙي بج جي چونڊ ڪجي جيڪو موسم توڙي وونئنن جي جيتن ۽ بيمارين خلاف مدافعت جي سگهه رکندڙ هجي.

پوکيءَ جو طريقو	بج واري بج جو مقدار في ايڪڙ	بج لٽل بج جو مقدار في ايڪڙ
ناڙي پوک	8 کان 10 ڪلو گرام	5 کان 6 ڪلو گرام
ڪرين ۽ بئن واري پوک	3 کان چار ڪلو گرام	2 کان 3 ڪلو گرام

سفارش ڪيل جنسون:

وونئنن جون هي جنسون پوکي سگهجن ٿيون ؛ ايف ايڇ 900، ايف ايڇ 901، ايف ايڇ 1000، CIM 602، 886 MNT، ايف ايڇ 142، بي ايڇ 118، سي آئي ايم 473، نيلم 121، ڪرس 9، ريشمي، هاري دوست، شهباز، ڪرس 134، ڪرس 342، چاندي، سهڻي، ناياب، نيا آف وغيره.

بج تان بُج لاهڻ لاءِ تجويزون:

10 ڪلو بچ تان بچ لاهڻ لاءِ هڪ لٽر گندڪ جو تيزاب ڪافي آهي. بچ کي ڪنهن به پلاسٽڪ جي ٽب ۾ وجهو مٿان آهستي آهستي تيزاب هاريو ان کانپوءِ ڪنهن ڪاٺي يا بيلچي سان بچ کي هيٺ مٿي ڇڳي طرح هلايو ته ڪڪڙن تان ڪجهه جا بچ آهستي آهستي ختم ٿيڻ شروع ٿيندا. پر هاڻ ڪڪڙن تان بچ صاف ڪرڻ لاءِ جديد مشينون به مارڪيٽ ۾ آهن انهن مان به فائدو حاصل ڪري سگهجي ٿو. جڏهن بچ تيزاب ۾ صاف ٿي وڃي ته پوءِ ان کي ڪنهن ڇاڻي يا ڳوڻ مٿان رکو ۽ بچ تي پاڻي هاريو. ۽ گهٽ ۾ گهٽ 4-3 ڀيرا ڇڳي طرح پاڻي هاريو پوءِ هڪ بچ کڻي زبان تي رکي جيڪڏهن ڪاٺ هجي ته وري پاڻي ۾ ٽوٽو جيڪڏهن ڪاٺ نه هجي ته ڪنهن چٽو واري جاءِ تي سڪايو.

پوکيءَ کان اڳ بچ کي دوا لڳائڻ:

پوکيءَ کان اڳ زرعي ماهر جي صلاح سان بچ کي ڪا ڦنگي ۽ جيت مار دوا لڳائي پوءِ پوکيو وڃي ته ائين ڪرڻ سان هڪ مهيني تائين ڦٽندڙ فصل رس چوسڻ وارين بيمارين جي حملي کان محفوظ رهندو. ان کانسواءِ بچ ۾ ڦوٽڙو به بهتر انداز ۾ ٿيندو آهي.

في ايڪڙ ٻوٽن جو تعداد ۽ ڇڏائي:

جيئن ته ماهرن جو چوڻ آهي ته وونٽن مان بهتر پيداوار لاءِ في ايڪڙ ۾ ٻوٽن جو تعداد 22 کان 25 هزار تائين هئڻ گهرجي. ان لاءِ جڏهن ٻوٽا 5 کان 6 انچ جا ٿين ته ٻوٽن ۾ ڇڏائي جو عمل ڪرڻ گهرجي. جنهن ۾ هڪ ٻوٽي جو ٻئي ٻوٽي کان مفاصلو گهٽ ۾ گهٽ 9 انچ رکجي. ته جيئن هر هڪ ٻوٽي کي پاڻي، پاڻ توڙي اس ۽ هوا گهريل انداز ۾ ملي سگهي.

رهيل خال پرڻ:

جيئن ته ڪرين وارين فصل جو جائزو وٺڻ کانپوءِ ڏسجي ته جتي جتي اڳ ۾ پوکيل بچ نه ڦٽو آهي ته اتي ٻيهر بچ جون ڇنڀون لڳائي خال پري ڇڻڻ گهرجن.

گڏ:

وونٽن جي ٻوٽن جي بهتر واڌ ويجهه لاءِ فصل کي گندگاهه کان صاف رکڻ گهرجي ۽ ان جو بهترين ذريعو گڏ آهي. ناڙي پوک ۾ پهرئين گڏ پنجهونءَ تي، ٻي گڏ پهريون پاڻيءَ ڏيڻ وقت نئين گڏ ٻيو پاڻي ڏيڻ کانپوءِ زمين جي وٽ ۾ اچڻ وقت ڪرڻ گهرجي. جڏهن ته ڪرين واري فصل کي پهرئين گڏ ٻئي پاڻي کان پوءِ زمين جي وٽ ۾ اچڻ کانپوءِ ڪرڻ گهرجي. فصل ۾ گڏ ڪرڻ کانپوءِ نائٽروجن ڀاڱو استعمال ڪرڻ گهرجي ته جيئن پوکيل فصل جي ٻوٽن کي وقت سر خوراڪ ملي سگهي.

فصل مان گندگاهه جو خاتمو:

حقيقت سان ڏسجي ته وونٽن جي فصل تي اڪثر جيتن ۽ وائرس جو حملو گهڻي گندگاهه سبب ٿئي ٿو. ان کانسواءِ گندگاهه جي ڪري فصل جي پيداوار ۾ گهٽتائي اچي ٿي. گندگاهه فصل جي روشني، پاڻي، هوا ۽ پاڻ ۾ به حصيدار بنجي ٿو. جنهن ڪري زرعي ماهر جي صلاح سان جڙي ٻوٽيون ختم ڪندڙ دوائن جو استعمال ڪرڻ گهرجي. جنهن ۾ اسٽامپ 1000 کان 1250 سي سي في ايڪڙ يا ٽرانسول 600 گرام في ايڪڙ يا بوال گولڊ 800 ملي ليٽر في ايڪڙ يا پينڊي ميٽالين 1000 ملي ليٽر في ايڪڙ يا تيز 20 گرام في ايڪڙ جي حساب سان ڦهاريو ڪريو.

پاڻ جو استعمال:

پاڻ جي ذريعي ٻوٽن کي نائٽروجن، فاسفورس، پوٽاش ۽ زنڪ جو گهريل مقدار ملي ٿو. جيڪڏهن ٻوٽن ۾ نائٽروجن جي کوٽ ايندي ته ٻوٽن جي پنن جو رنگ هلڪو سائو ٿي ويندو آهي ۽ آهستي آهستي ڀليلي رنگ ۾ تبديل ٿي ويندو آهي ۽ ٻوٽن جي واڌ ويجهه بيهجي وڃي ٿي. اهڙيءَ طرح وري فاسفورس جي کوٽ سبب ٻوٽن جو قد ننڍو ٿئي ٿو، گوگرد اڀر سان ٺهندا آهن. گوگرد جي سائيز به ننڍي ٿي ويندي آهي. ۽ ٻوٽن جي ٿڙ جو رنگ زمين جي سطح وٽ ڀليلو نظر ايندو آهي. پر جيڪڏهن فصل ۾ پوٽاش جي کوٽ هوندي ته پنن جا ڪنارا ڀيلا ۽ زردي مائل ٿي ويندا آهن. پنن جي رڳن جو رنگ ڳاڙهاڻ مائل ٿي پوندو آهي ۽ پنن جا ڪنارا خشڪ ٿي ويندا آهن. جڏهن ته زنڪ جي کوٽ جي ڪري پنن جي سائيز ننڍي ٿي ويندي آهي ۽ اندروني طور تي پنن

جون رڳون ڪاريون يا ٽنڌليون نظر اينديون آهن. جنهن ڪري وونڻن جي فصل ۾ ڪيميائي پاڻ جو استعمال مٿين ڪوٽ ڪي نظر ۾ رکي ڪرڻ گهرجي. جڏهن ته زمين ۾ پوکيءَ وقت وڻاڻ جو پاڻ پڻ استعمال ڪرڻ گهرجي.

بي تي جنسن لاءِ پاڻ جي سفارش

زمين جو قسم	في ايڪڙ ڪيميائي پاڻ جو استعمال
لٽياسي زرخيز زمين	اڍائي پوريون نائٽروفاس ۽ اڌ پوري ايس-اوپي، پوکيءَ مهل، اڌ پوري يوريا ۽ اڌ پوري ايس-اوپي پنجهوءَ مهل ۽ مٺي پوري يوريا گل ٻاڻي مهل ڏيڻ گهرجي. يا سا هڪ پوري ڊي-اي-بي، اڌ پوري ايس-اوپي ۽ اڌ پوري يوريا، پوکيءَ مهل اڌ پوري يوريا ۽ اڌ پوري ايس-اوپي پنجهوءَ مهل ۽ هڪ پوري يوريا گل ٻاڻي مهل ڏيڻ گهرجي.
وچولي زرخيز زمين	پوڻيون ٽي پوريون نائٽروفاس، اڌ پوري ايس-اوپي، پوکيءَ مهل اڌ پوري يوريا ۽ اڌ پوري ايس-اوپي پنجهوءَ مهل ۽ مٺي پوري يوريا گل ٻاڻي مهل. يا ڏيڍ پوري ٽي-ايس-بي، مٺي پوري يوريا ۽ اڌ پوري ايس-اوپي پوکيءَ مهل ڏيڻ گهرجي مٺي پوري يوريا ۽ اڌ پوري ايس او پي پنجهوءَ مهل جڏهن ته هڪ پوري يوريا گل ٻاڻيءَ تي ڏيڻ گهرجي.
هڪي وارياسي زمين	هڪ پوري ڊي-اي-بي، اڌ پوري ايس-اوپي ۽ مٺي پوري يوريا پوکيءَ مهل ڏيڻ گهرجي. هڪ پوري يوريا ۽ اڌ پوري ايس-اوپي، پنجهوءَ مهل ۽ جڏهن ته هڪ پوري يوريا گل ٻاڻيءَ وقت ڏيڻ گهرجي. يا هڪ پوري ٽي-ايس-بي، اڌ پوري ايس-اوپي ۽ هڪ پوري يوريا پوکيءَ مهل. هڪ پوري يوريا ۽ اڌ پوري ايس-اوپي پنجهوءَ مهل ۽ جڏهن ته هڪ پوري يوريا گل ٻاڻي مهل ڏيڻ گهرجي.
ڪمزور يا ڪلراني زمين	ٻه پوريون نائٽروفاس پوکيءَ مهل، 2 پوريون امونيم نائٽريٽ پنجهوءَ مهل ۽ 2 پوريون گل ٻاڻيءَ مهل ڏيڻ گهرجي. يا هڪ پوري يوريا پوکيءَ مهل، 3 پوريون SSP ۽ هڪ پوري امونيم نائٽريٽ 2 پوريون امونيم نائٽريٽ پنجهوءَ مهل ۽ گل ٻاڻي وقت ڏيڻ گهرجي.
ڪلرائين، سخت زمين يا ڪرين تي پوکيل وونڻن جي صورت ۾	ٻه پوريون نائٽروفاس يا سا ٻه پوريون ايس-اوپي، ۽ هڪ پوري امونيم نائٽريٽ يا هڪ پوري زور آور ۽ هڪ پوري يا سا پوري ٽي-ايس-بي ڏيڻ گهرجي. نوٽ: فصل ڪي پهريون پاڻ پوکي جي 15 کان 30 ڏينهن اندر ڏيڻ گهرجي. ڪرين تي ڏينهن جي اندر ڏيڻ گهرجي.




وونڻن جون بيماريون ۽ تدارڪ

ٻوٽن جي پنن جو سڙڻ ۽ سڪڻ:

هن بيماريءَ جي ڪري وونڻن جي ٻوٽن جي پنن تي شروع ۾ پورا چهنبدار داغ ٿبا ٿين ٿا. گهڻي حملي جي صورت ۾ ٿارين تي به اهي داغ نظر اچن ٿا. تڙ ٿي هن بيماريءَ جي حملي سبب ڪاري رنگ جو دائرو ٺهي ويندو آهي. اهڙيءَ طرح هن بيماريءَ جي لڳڻ سان ٻوٽي جا گوگڙا ڳرڻ، سڙڻ شروع ٿي ويندا آهن. اها بيماري هڪ قسم جو وائرس آهي جيڪو آهستي آهستي سموري فصل ۾ ڦهلائي ويندو آهي. ان ڪري بيمار ٻوٽا فوري طور ڪڍي فصل کان پري ساڙڻ گهرجن. ان کانسواءِ بچ ڪي آئنده ڪا ڦڦوندي مار (Fungicide) زهريلي نوا لڳائي پوءِ پوکڻ گهرجي.

گوگڙن جو سڙڻ (Boll Root):

هن بيماريءَ ۾ شروع ۾ گوگڙن جي اندر پورا يا ڪاري رنگ جا ٿبا ظاهر ٿيندا آهن. ٻاهران گوگڙا ٺيڪ حالت ۾ هوندا آهن پر اندران ڪجهه ڳري سڙي ويندي آهي يا وري گوگڙا ٽڙندا ٿي ناهن. ڪجهه گوگڙا ٽڙندا آهن ته انهن جي ڪجهه جو رنگ اچي بدران هڪو ڀيلو نظر ايندو آهي.



هن کان بچاءَ جي تدبير:

جيئن ته هيءَ بيماري گهميل موسم يا ڪيڙي جي حملي جي ڪري ٿيندي آهي. جنهن جي ضابطي لاءِ ريپومل گولڊ يا ميٽاليڪس+ مينڪوزيب 250 گرام في ايڪڙ جي حساب سان ڦوهارو ڪرڻ گهرجي. ۽ ڪيئن ته پڻ ضابطو اٿڻ گهرجي.

بوٽن جي پاڙن جو سڙڻ (Root Rot):



هيءَ بيماري بوٽن ۾ مختلف بيڪٽيرياز جي ڪري ٿيندي آهي. بوٽا اوچتو مرجھائجي ويندا آهن ۽ چڪ ڏيڻ سان پاڙان سولائي سان نڪري ايندا آهن. بوٽن جون پاڙون گريل سڙيل نظر اينديون آهن ۽ پاڙن کي زور ڏيڻ سان پيلي رنگ جو ليسوڙي جهڙو بڊبودار پاڻي نڪرندو. هن بيماريءَ کان بچاءَ لاءِ بوٽي جو بوٽي کان فاصلو مناسب رکڻ گهرجي. ۽ بچ کي ڪنهن به ڦڦوندي مار زرعي زهر سان ملائي پوءِ استعمال ڪجي جهڙوڪ؛ ٽاپسن ايم 5 يا ٽايوفينائيٽ ميٽائيل 5 گرام في ڪلو لڳائي پوءِ پوکڻ گهرجي.

وونئڻ جا جيت ۽ انهن جو تدارڪ

سائو مهلو (Jassid):



سائي مهلي جا بچا ۽ بالغ پنن جي هيٺان رس چوسي پنن ۾ زهريلو مادو داخل ڪن ٿا. حملي آور پنن جا ڪنارا هيٺئين پاسي مڙي ويندا آهن، پنن جون نسون سڪي ويندا آهن. جنهن ڪري پن ڪمزور ٿي ويندا آهن. شديد حملي جي صورت ۾ پن ڦڪا ۽ ڳاڙها ٿي چئي پوندا آهن. هن جيت جو شديد حملو جولاءِ ۽ آگسٽ مهيني ۾ ٿيندو آهي، جهڙالي موسم هن جيت جي واڌ ويجهه لاءِ وڌيڪ موزون هوندي آهي.

احاطياتي تدبيرون:

وونئڻ جي پوکي سفارش ڪيل وقت تي ڪرڻ گهرجي. گهڻي پاڻ ڏيڻ کان پاسو ڪجي. گندگاهه کي ختم ڪرڻ گهرجي. قوت مدافعت رکندڙ جنسون پوکڻ گهرجن.

ضابطو:

جيسپر 200 ملي لٽر (نائن ڀاڱي) يا انسٽنٽ يا ويلاسٽي 200 ملي لٽر في ايڪڙ يا اميڊاڪلوپرڊ گروپ جي ڪابه دوا 250 ملي لٽر في ايڪڙ يا ايدوانٽيج 500 ملي لٽر في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي.



ٿرڙو (Thrips):

هن جيت جي حملي سان پن هيٺئين پاسي اڇا ڇاندي نما سلسر جهڙي شڪل جا ٿي مڙي ويندا آهن ۽ بوٽي جي واڌ ويجهه پڻ متاثر ٿي رڪجي ويندي آهي. هن جيت جو حملو وونئڻ جي فصل تي شروع کان وٺي آخري چونڊ تائين هوندو آهي.

احاطياتي تدبيرون:

وونئڻ جي ڀرسان ڪجهه سان مشابهت رکڻ وارا بوٽا يا فصل نه پوکجن. گندگاهه جو خاتمو ڪجي. گهڻي پريشر واري مشين ذريعي صاف پاڻي يا ڪپڙن توڻ واري صابن جي محلول جو ڦوهارو ڪرڻ سان به ٿرڙي جو حملو گهٽائي سگهجي ٿو.

ضابطو:

پائريٽ 80 کان 100 ملي لٽر في ايڪڙ يا ريڊيئٽ 60 کان 80 ملي لٽر في ايڪڙ يا ڊائميٽوئيٽ 300 يا ڊيڊام 300 ملي لٽر في ايڪڙ يا ليسٽا 100 گرام يا (ڪلوروفيناپائير) يا سوشل يا پروفائيل يا اسٽالڪر 200 ملي لٽر في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي .



اچي مک (White fly):

هن جيت جا بچا ۽ بالغ پنن مان رس چوسي لپڻس دار مادو ماکي جهڙو خارج ڪن ٿا. جنهن ڪري سينور واري بيماري ٿي پوندي آهي ۽ ڪجهه جي پيدوار ۽ معيار کي نقصان پهچي ٿو. اچي مک جو حملو خشڪ موسم ۾ گهڻو ٿئي ٿو. شديد حملي جي ڪري وونٽن تي پن مروڙ (CLCV) بيماري اچي ٿي. هن جيت جو حملو آگسٽ ۽ سيپٽمبر مهيني ۾ وڌيڪ ڏٺو ويو آهي.

احطياتي تدبيرون:

وونٽن جي فصل ۾ يا ڀرسان ميزبان ٻوٽا جهڙوڪ پينڊي، وانڱڻ وغيره نه پوکڻ گهرجن. ميزبان ٻوٽن ۽ گندگاهه کي ختم ڪجي. پاڻ سفارش ڪيل وزن کان وڌيڪ نه ڏجي.

ضابطو:

اولا 60 سي سي في ايڪڙ يا ڊاء فينٿيوران 250 سي سي في ايڪڙ يا ڊولو يا راکو 250 سي سي في ايڪڙ يا پولو يا موسيلان 125 گرام في ايڪڙ يا ايسيلان يا اسيٽامانيپرڊ 125 گرام في ايڪڙ يا گليبيو 150 گرام يا پائريروڪسيفن 400 کان 500 ملي لٽر يا اميڊاڪلوپرڊ 250 ملي لٽر في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي .



ملي بگ (Mealy bug):

ملي بگ ٻوٽي جي پنن مڪڙين مان رس چوسيندو آهي ۽ زهريلو مادو کاڌي دوران ٻوٽي ۾ داخل ڪندو آهي جنهن ڪري پن مڪڙيون ۽ گل چڻي پوندا آهن ۽ ٻوٽي جي واڌ ويجهه رڪجي وڃي ٿي ۽ حملي آور ٻوٽي جا گونچ، گل، گرگڙا چڻي پوندا آهن. هي جيت لڻي دار مادو خارج ڪري ٿو جيڪو ڪاري سينور واري بيماريءَ جو ذريعو بڻجي ٿو. شديد حملي جي صورت ۾ ٻوٽو سڪي ختم ٿي ويندو آهي.

احطياتي تدبيرون:

فصل جو هر روز معائنو ڪرڻ گهرجي. شروعاتي مرحلي ۾ ملي بگ ٿوري تعداد ۾ نظر اچي ته ان کي هٿ تي پلاسٽڪ جي ٿيلهي لڳائي ماري ختم ڪجي. ميزبان ٻوٽن ۽ گندگاهه جو خاتمو ڪرڻ گهرجي.

ضابطو:

ڪيوراکران 500-800 ملي لٽر يا پروفیکس 500 کان 800 ملي لٽر يا لارسيبن يا ڪلورپائريفاس يا فورٽ 500 کان 1000 ملي لٽر يا پروفينوفاکس 500-800 ملي لٽر في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي .

جون (Mites):



وونٽن جي فصل ۾ لڳاتار موسم خشڪ رهڻ سان جون جو حملو ظاهر ٿئي ٿو جون ٻوٽي جي پنن مان رس چوسي چارو ٺاهي ٿي جيڪو ٻوٽي جي کاڌ خوراڪ ٺاهڻ وارو عمل ڀڄ مٽائڻ ٿئي ٿو. جڏهن جون جو شديد حملو ٿئي ٿو ته پن، مڪڙيون ۽ گل چڻي پوندا آهن. جولاءِ ۽ آگسٽ مهيني ۾ هن جو شديد حملو ٿئي ٿو.

احطياتي تدبيرون:

پيرائڻيڊ گروپ جونءَ دوائون شروعاتي مرحلي ۾ استعمال نه ڪجن. جون جو حملو خشڪيءَ تي وڌيڪ ٿئي ٿو. ان ڪري فصل کي صاف پاڻي سان ڦهاريو ڪرڻ سان جونءَ جو خاتمو ڪري سگهجي ٿو.

ضابطو:

اوپيرون 100 ملي لٽر في ايڪڙ يا ٽالسٽار يا ريشم يا سلڪ يا باءِ فينٽرين 250 ملي لٽر في ايڪڙ يا پولو يا بولو 250 ملي لٽر في ايڪڙ ٽيڻ گهرجي .



چٽڪرو ڪينئون (Spotted boll worm):

چٽڪرو ڪينئون فصل جي شروعات ۾ چوٽين کي نقصان ڏيندو آهي. جڏهن گل ٻاڻي نڪرڻ شروع ٿيندي آهي ته گهڻو نقصان گلن، مڪڙين ۽ گوگڙن ۾ اندر داخل ٿي ڪندو آهي جنهن ڪري پيداوار گهٽ ملندي آهي. هن جو شديد حملو آگسٽ ۽ سيپٽمبر مهيني ۾ ٿئي ٿو.

احطياتي تدبيرون:

وونئنن جي فصل ۾ يا پاسن کان ميزبان پوئن جو خاتمو ڪجي. آخري چونڊي کانپوءِ جلدي زمين مان ٻانيون ڪڍي اونها هر ڏئي زمين کيڙي ڇڏجي. پينڊين جي باقيات کي وونئنن جي پوکي کان اڳ ۾ ختم ڪرڻ گهرجي.

ضابطو:

ٿريسرس 80 کان 100 ملي لٽر يا ڪرائي يا جيسپر يا ڊمانڊ يا ليمڊا 250 کان 300 ملي لٽر في ايڪڙ يا ٽالسٽار يا سلڪ يا ريشم يا باءِ فينٽرين 250 ملي لٽر في ايڪڙ ڦوهارو ڪرڻ گهرجي.



آمريڪي ڪينئون (American Boll worm):

هن جيت جا ٻچا/ ڪينئن ڦڻ سان فصل جي نرم گونچن کي کائڻ شروع ڪندا آهن ۽ پوءِ پوئي جي ٻين حصن جهڙوڪ مڪڙيون، گل ۽ گوگڙن تي ڪينئن حملو آور ٿين ٿا جنهن ڪري فصل کي شديد نقصان ٿئي ٿو. گل ٻائي ٺهڻ وقت هن جيت جو حملو شروع ٿئي ٿو پر شديد حملو جون کان اڳست مهيني ۾ نٿو ويو آهي.

احطياتي تدبيرون:

اونها هر هلائي زمين ۾ رهيل ڪينئن کي اُس جي ٽپش رستي ناس ڪجي. گندگاهه جو خاتمو ڪجي. جاچ پڙتال جاري رکجي.

ضابطو:

ٿريسرس 80 کان 100 ملي لٽر في ايڪڙ يا لارسبين 700 کان 1000 ملي لٽر يا پروڪايم 200 ملي لٽر في ايڪڙ يا ايماميڪئن 200 ملي لٽر يا ٽائيمر - پارڪو - بروڪا - ٽائي ڪون يا ٽالسٽار 200 ملي لٽر في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي .

گلابي ڪينئون (Pink boll worm):



هن جيت جا اُنن مان نڪتل ڪينئا جلدي گل ٻائيءَ ۾ داخل ٿين ٿا جڏهن گل تي حملو ڪري ٿو ته گل جون مڪڙيون ملائي روزيت (Rosette) يا ماندائي جهڙي شڪل ۽ اندر ئي اندر گل جا نر صفا کائي ڇڏيندو آهي. ۽ ٻني پيري نسل شڪل ۾ آڻيندو آهي گوگڙي تي حملي ڪرڻ وقت سوراخ ڪري اندر داخل ٿي وڃي ٿو، هي ڪجهه جي ٻچ جو ٻچ کائي ناس ڪري ٿو.

احطياتي تدبيرون:

هن جيت کي ناس ڪرڻ لاءِ پيلاڙي کانپوءِ مال جو چارو ڪرائڻ گهرجي ان کانپوءِ وونئنانيون ڪٽي ساڙي ڇڏجن.

ضابطو:

بولٽن 500 ملي لٽر يا ڊريم يا يونٽ پلس يا ڪيپيٽل پلس ايڊر پلس، ايگري فاس يا ڪائونٽر پلس، ڊيلٽا ڪنگ يا ڊيلٽا+ٽراءِ زوفاس 500 کان 600 ملي لٽر في ايڪڙ يا پروايڪسس 100 ملي لٽر في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي .



لشڪري (Armyworm): مڇ يا ليچ يا ليوفيوران يا انڊيڪس 200 ملي لٽر في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي .



ڪمند - Sugarcane

زمين جي چونڊ:

بهرتر پيداوار لاءِ ڪمند واري زمين لڻيائي هنڌ سان گڏوگڏ اُن ۾ پاڻي جذب ڪرڻ جي قوت به هجي ۽ ان ۾ هوا داخل ٿيڻ جي به صلاحيت هجي ۽ اها زمين هجي جنهن ۾ ڪافي نامياتي مادو ۽ خوراڪي جزا موجود هجن. ڪمند لاءِ زمين سم ۽ ڪلر واري نه هجي. پر ڪمند جون ڪي جنسون جهڙوڪ: بي ايل-19 (BL-19) هلڪي ڪلرائي زمين ۾ پوکي سگهجي ٿو.

زمين جي تيارِي:

ڪمند واري زمين ۾ راجا هر يا ٿالھين وارا (3 يا 4) هر ٽيڻ گهرجن. ساڳئي وقت جيڪڏهن زمين ۾ چيزل هر ڏئي ٽي سال ٿي ويا هجن ته پوءِ چيزل هر به ضرور هلائڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته هي هر 3 ڪلن 4 فوٽ زمين ۾ اونهو وڃي ٿو. جيڪو زمين جي سخت تهه کي ٽوڙي ڇڏيندو آهي. انهيءَ سان ڪمند جون پاڙون اونهيون ۽ زمين ۾ پاڻي هيٺ تائين ويندو ۽ زمين ۾ آلاڻ، پوسل يا گهم گهڻو عرصو رهندي آهي. جنهن بعد زمين کي سنوت ۾ آڻي تيار ڪجي.

پوکي جو وقت:

ڪمند جي پوکي بهار ۽ سرءُ جي موسم ۾ ڪئي ويندي آهي. بهار واري پوکي 15 فيبروري کان مارچ جي آخر تائين ٿي سگهي ٿي ۽ سرءُ واري پوکي 15 آگسٽ کان سيپٽمبر جي پڇاڙي تائين ڪري سگهجي ٿي. سرءُ جي مند ۾ پوکيل ڪمند بهار جي مند ۾ پوکيل ڪمند کان 30 کان 40 سيڪڙو وڌيڪ پيداوار ڏئي ٿو.

پوکيءَ جا طريقا:

سنڌ ۾ عام طرح سان پوکيءَ جا هيٺيان ٻه طريقا استعمال ڪيا وڃن ٿا. جيڪي آبهوا جي لحاظ کان نهايت موزون آهن.

1. ريچ وارو طريقو: اڳواٽ تيار ڪيل زمين کي ريچ کان پوءِ زمين جي وٺ اچڻ تي اُن ۾ گوبل هر هلائي 90 سينٽي ميٽرن تي ڪريا تيار ڪري ان ۾ گهريل پاڻ ڇڏي ذڪر ڪيل بچ جي جنس جون دوا لڳل گريون اهڙي طريقي سان پوکڻ گهرجن جو انهن جون پڇڙيون پاڻ ۾ مليل هجن ۽ انهن مٿان سهاڳو گهمائي ڪرين کي ڍڪي ڇڏجي ۽ پاڻي ايستائين نه ڏجي جيستائين ڪمند ڦٽي نه اچي.
2. خشڪ طريقو: هن طريقي ۾ زمين جي تيارِيءَ ۾ 3 يا 4 سُڪي جا هرن کان پوءِ مٿان راجا هر ڏيئي پٿر ڀڄي زمين کي تيار ڪجي ۽ پوءِ سنوت ڪري اوڙون ڪڍڻ گهرجن جن جو فاصلو 90 سينٽي ميٽر هئڻ گهرجي ۽ اوڙن جي گهرائي 18 کان 20 سينٽي ميٽر هئڻ گهرجي جنهن ۾ ٻن (2) اکين واريون گريون ملائي پوکي ڪرڻ گهرجي ۽ مٿان وري مٽيءَ جو هلڪو تهه ڇاڙهڻ گهرجي تنهن کان پوءِ جلدي پاڻي ڏيڻ گهرجي. پوکيءَ کان پوءِ 2 يا 3 پاڻي هفتي جي وقفي سان ڏيڻ گهرجن.

پوکيءَ لاءِ بچ:

بچ صحتمند فصل مان وٺجي جيڪو فصل 6 کان 8 مهينن جو هجي. انهيءَ مقصد لاءِ بهار ۾ پوکيل نرسري ڪمند نهايت ئي اهم آهي. منڍي واري فصل جو بچ استعمال نه ڪجي ۽ بچ هر قسم جي بيماريءَ کان پاڪ هجي. ڪمند جي لٽ (لڙهيءَ) جا مٿيان ٻه حصا بچ لاءِ استعمال ڪرڻ گهرجن ۽ مٿين حصي ۾ گلوڪوز وٽيڪ هوندو آهي. ڪمند جو هيٺيون حصو گهٽ پوکڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته هيٺئين حصي جون اکيون (Buds) تمام گهٽ ڦٽن ٿيون ۽ بچ لاءِ ڪمند جي لٽ هٿن سان صاف ڪجي. جيئن اکيون (Buds) زخمي نه ٿين. ان کان پوءِ لڙهيءَ مان اهي ڳريون ڪڍجن جن مان هر هڪ ڳريءَ ۾ ٻه يا ٽي (2 يا 3) اکيون هجن.

بچ جو مقدار:

بچ جو مقدار 80 کان 100 مٺ يا 30 کان 40 هزار ڳريون في ايڪڙ جي حساب سان پوکجن. ٿلهي قسم جي جنسن جهڙوڪ: ٿرائٽن، بي ايل-4، گلابي-95، پي آر-1000، جو بچ وٽيڪ استعمال ڪرڻ گهرجي.

بچ کي دوا لڳائڻ:

بيمارين کان بچاءَ لاءِ ٽاپسن ايم 70 ببلو پي يا ٽايوفنٽ ميٽائل 200 گرام 100 لٽر پاڻي ۾ يا دوا جي ڳار ۾ بچ کي پنج منٽ کن پوڙي پوءِ پوکڻ گهرجي.

جنسون:

ڪمند جون جنسون، پوکيءَ جي وقت ۽ علانقي کي ٽن حصن ۾ ورهايو ويو آهي.

علانقا	سفارش ڪيل جنسون
اتر سنڌ	
خيرپور، سکر، جيڪب آباد، لاڙڪاڻو، قمبر شهدادڪوٽ، شڪارپور	گلابي-95 (BF-129)، ايل-113، ايل-116، بي ايل-4 لاڙڪاڻو-1
وچين سنڌ	
نوشهروفيروز، شهيد بينظير آباد، دادو، ڄامشورو، سانگهڙ	گلابي-95 (BF-129)، ايل-113، بي ايل-19، ايل-116، بي ايل-4
ڏکڻ سنڌ	
ٿرپارڪر، عمرڪوٽ، ميرپورخاص، مٽياري، ٽنڊوالهيار، ٽنڊو محمد خان، حيدرآباد، بدين، ٺٽو	گلابي-95 (BF-129)، بي ايل-19، ٿرائٽن، بي ايل-4، نٽه-10 ۽ نيا-98، نيا-2004، نيا-2010، نيا-2011، نيا-2012

گڏيل پوک:

ڪمند جي فصل ۾ شروعاتي مرحلي ۾ گڏيل پوک پڻ ڪري سگهجي ٿي. انهيءَ ۾ ڪمند ۽ بصرن جي گڏيل پوک ڪمند ۽ سورج مکيءَ جي گڏيل پوک مان سٺا نتيجا حاصل ٿيا آهن. سرءُ واري ڪمند جي وچ وارين قطارن ۾ ڪڻڪ جو فصل پڻ پوکي سگهجي ٿو.

وٽاڻ جو پاڻ:

زمين ۾ لاڳيتو فصل پوکڻ سان خوراڪي جزن جي کوٽ ٿئي ٿي. وٽاڻ جي پاڻ کي استعمال ڪرڻ سان نه رڳو خوراڪ جو پورا ٿئي ٿو. پر اهو پاڻ زمين جي طبعي حالت کي به سڌاري ٿو. زمين ۾ پوسل برقرار رکڻ جي صلاحيت وڌي ٿي ۽ زمين نرم ٿئي ٿي. ڪمند پوکڻ کان هڪ مهينو پهرين سڪي جا هر ڏئي به ٽرڪون وٽاڻ جي پاڻ جون في ايڪڙ زمين ۾ وجهي پائي ڏجي. وٽ اچڻ تي ڪلٽيوينٽر هلائي وري زمين کي پائي ڏجي، جڏهن زمين وٽ ۾ اچي ته پوءِ زمين کي پوکي لاءِ تيار ڪجي.

سائو پاڻ:

ڪمند وارين زمينن کي هر ٻن يا ٽن سالن کان پوءِ سائو پاڻ ڏيڻ گهرجي. ان لاءِ ڍانچو (جنٽر)، سئيءَ وارو گاهه، برسيم يا گوار وغيره پوکي گل ورڻ مهل هر ٽئي زمين ۾ ملائي مٿان پائي ڏئي ڇڏڻ گهرجي. ته جيئن سائي پاڻ وارو نامياتي مادو سڙي ڳري زمين ۾ ملي وڃي.

پاڻ جو استعمال:

ڪمند جو فصل 12 کان 14 مهينا زمين تي بيٺل هوندو آهي ان ڪري هن فصل کي گهڻي ڪاڌ خوراڪ جي ضرورت رهي ٿي. اها ڪاڌ خوراڪ مختلف جزن يعني نائٽروجن، فاسفورس ۽ پوٽاش جي صورت ۾ هوندي آهي. تنهنڪري زمين جي مطابقت سان سنڌ ۾ ڪمند کي علائقيوار پاڻ ڏيڻ گهرجي. علائقيوار ڪمند جي فصل ۾ پاڻ ڏيڻ جو وقت ۽ ان جو في ايڪڙ وزن

پاڻ جو نالو	پاڻ ڏيڻ جو وقت	اثر سنڌ	وچولي سنڌ	ڏکڻ سنڌ
يورپا	1. پوکي وقت 2. پهرين مٽي ڇاڙهڻ وقت 3. ٻئي مٽي ڇاڙهڻ وقت	هڪ ٻوري ٻئي ٻوري ٻئي ٻوري	هڪ ٻوري هڪ ٻوري هڪ ٻوري	هڪ ٻوري ٽيڊ ٻوري ٽيڊ ٻوري
ڊي-اي-ڊي	1. پوکي وقت	سوا ٻوري	ٽيڊ ٻوري	ٻه ٻوريون
سلفيٽ آف پوٽاش	1. پوکي وقت	سوا ٻه ٻوريون	اڍائي ٻوريون	ٽي ٻوريون

نوٽ: منڍي واري فصل ۾ مٿي ذڪر ڪيل پاڻ جي وزن کان 25 سيڪڙو وڌيڪ پاڻ ساڳئي طريقي سان ڏيڻ گهرجي.

گندگاهه جو خاتمو:

ڪمند جي فصل ۾ گندگاهه جا ٻوٽا تقريبن 25 سيڪڙو فصل جي پيداوار ۾ گهٽتائي آڻين ٿا. گندگاهه جا ٻوٽا زمين ۾ پائي، خوراڪي جزن ۽ روشني ۾ ڀاڱي ڀاڱي پاڻيوار ٿين ٿا. جنهن سان فصل جي واڌ ويجهه ۽ معيار متاثر ٿئي ٿو. فصل جي پوکيءَ کان پوءِ پهريان ئي مهينا تمام گهڻي اهميت رکن ٿا. انهي مرحلي ۾ گندگاهن جو وقت سر خاتمو تمام ضروري آهي. جنهن لاءِ وقت سر گڏ ڪرڻ يا ڪيميائي گاهه مار دوائن جو استعمال ڪري سگهجي ٿو.

گاهه جو نالو	نوا جو نالو	وزن في ايڪڙ	استعمال جو وقت
ويڪرن ۽ سنهن پنن وارا گاهه جهڙوڪ؛ واهو، پرڻ، لار، ماڌڻو، ساوڙي، لوڻڪ، ڪل ۽ ڪجهه	ڪرمسٽ 75 ببلو جي ڊيونل گولڊ 960 اي سي سن اسٽار 15 ببلو جي	400 گرام 1000 سي سي 100 گرام	پهرئين پائي ڪاٺپوءِ جڏهن زمين آلي هجي. پوکيءَ کانپوءِ 24 ڪلاڪن اندر ڪرين تي ٻني پائي ڪاٺپوءِ زمين وٽ تي هجي. بهتر نتيجو حاصل ڪرڻ لاءِ قوهاري کانپوءِ 7 ڏينهن بعد پائي ٿجي.

گڈ ڪرڻ:

ڪمند کي سڄي سال ۾ چار گڏون ڪرڻ لازمي آهن. پهرين گڏ ڪمند جي ڦٽڻ کان پوءِ ڏيڍ مهيني بعد ڪرڻ گهرجي. جڏهن ته باقي ٻيون گڏون هر ڏيڍ مهيني کان پوءِ ڪرڻ گهرجن. ڪمند جي گڏ چنچور، ڪوٽر يا ديسي هر سان ڪرڻ گهرجي.

مٽي چاڙهڻ:

ڪمند جو فصل تيز هوائن يا گهڻي پاڻيءَ جي ڪري زمين تي ڪري پوندو آهي. جنهنڪري فصل جي پيداوار تي اثر پوندو آهي. ان ڪري مٽي ضرور چاڙهجي ۽ اها پهريون دفعو ننڍهن چاڙهجي جڏهن ڪمند جو ٻوٽو اٽڪل چئن مهينن جو ٿئي ۽ قد اندازن ٽيڊ کان ٻه فوٽ ٿئي. انهيءَ وقت تي نانٽروجن پاڻ جو پهريون وزن ڏجي. ٻيو دفعو ڏيڍ مهيني کان پوءِ اوڙڻ تي مٽي چاڙهجي ۽ باقي رهيل نانٽروجن پاڻ جو آخري وزن ٽيڊي پاڻي ڏيڻ گهرجي.

پاڻيءَ جو استعمال:

ڪمند جي ٻوٽي کي ڦوٽهڙي ۽ شاخون ڪيڻ مهل پاڻيءَ جي وٽيڪ ضرورت هوندي آهي. انهيءَ لاءِ ڪمند ۾ وقتائتو ۽ موسم اهر پاڻي ٽيڻ تمام ضروري آهي. ۽ هيٺ ڄاڻايل پروگرام تحت پاڻي ڏيڻ گهرجي. تجربن مان معلوم ٿيو آهي ته ملچ ڪرڻ سان پوسل هنن ڪري پاڻي جو وقفو وڌي ٿو ۽ پاڻي جي بچت ٿئي ٿي.

ڪمند پوکڻ بعد	ڪمند جي ڦوٽهڙي بعد	مٽي، جون، جولاءِ مهينن ۾	برسات جي مند ۾
2 يا 3 پاڻي 7 کان 8 ڏينهن جي وقفي سان	10 کان 12 ڏينهن جي وقفي سان	8 کان 10 ڏينهن جي وقفي سان	زمين ي الڻ جي مطابق پاڻي ڏيڻ جو وقفو وڌائڻ گهرجي

نوٽ: اهڙي طرح ڪمند جي پوک کي پوکيءَ کان وٺي وڌ تائين 22 کان 25 پاڻي ڏيڻ تمام ضروري آهن.

جيت ۽ انهن جو تدارڪ (Insect pests and their Control):

ڪمند جي فصل کي جيڪي جيت نقصان رسائين ٿا انهن ۾ چوٽيءَ وارو ڪينئون، لٺ وارو ڪينئون، پاڙ وارو ڪينئون ۽ جوئر جي لٺ جو ڪينئون، ميلي بگ، ڪارو بگ، اڇي مک، ٿرڙو، جونءَ، اٺوهي ۽ گهوڙا مک شامل آهن. هتي مکيه جيتن جو مختصر احوال هيٺ ڏجي ٿو.

1. چوٽيءَ وارو ڪينئون (Sugarcane Top borer):



هن ڪينئين جو حملو مارچ مهيني کان ٿيندو آهي ۽ آڪٽوبر تائين 5 کان 7 سيڪڙو فصل کي نقصان رسائيندو آهي. جيت جي مادي پنن تي انا لاهيندي آهي. انهن سان ڪينئون نڪرڻ کان پوءِ اهي 10 کان 15 ڪلاڪن تائين پنن تي موجود هوندا آهن ۽ انهن کان پوءِ ڪمند جي اندر داخل ٿي ان کي نقصان رسائڻ شروع ڪندا آهن جنهنڪري چوٽي واري شاخ سڪي ويندي آهي ۽ مٿي سوراخ نظر ايندا آهن.


2. چڙيءَ وارو ڪينئون (Sugarcane Stem borer):



جيئن ته هي چڙيءَ وارو ڪينئون اهي جڏهن ڪمند ۾ چڙي (لٺ) ٺهڻ شروع ٿئي ته هن جيت جو حملو شروع ٿي ويندو آهي. هي جيت اڀريل جي مهيني کان شروع ٿي ويندو آهي ۽ آڪٽوبر مهيني تائين هلندو آهي. هن جيت جي نشانيءَ طور چڙي جي سڪل چوٽيءَ تي ننڍڙا سوراخ نظر ايندا آهن.

هن جيت جي منڍيءَ تي پنج سنهه ليڪا هوندا آهن.

3. پاڙ وارو ڪينئون (Sugarcane root borer):



مٿي ڄاڻايل جيت جي مقابلي ۾ هن جو حملو گهٽ هوندو آهي. پر شهيد بينظير آباد (نوابشاهه) جي علائقي ۾ اهو جيت گهڻو نظر ايندو آهي. مٿي سڪل چوٽيءَ سان گڏ پهريون ڀن به سڪل هوندو آهي. ۽ پاڙ سان گڏوگڏ پاڙ کان مٿي به ڀن کان ٿن ڳرين تائين موجود هوندو آهي. هي جيت به آڪٽوبر تائين پنهنجا پنج نسل پورا ڪندو آهي.

4. جوئر جي ڪاني وارو ڪينئون (Jowar Stem borer):



هي جوئر جي ڪاني جو ڪينئون آهي. پر جيئن ته جوئر ڪمند جي ويجهي پوکي وڃي ٿي ان ڪري جوئر جي فصل تيار ٿيڻ کان پوءِ هي جيت ڪمند تي حملو ڪري ٿو هن جيت جي سڃاڻپ ۽ زندگي وارو مرحلو به ساڳيو آهي جيڪي مٿئين ڪاني واري ڪينئين ۾ ڄاڻايل آهي.

5. گهوڙا مک (Pyrilla / Leaf Hopper):



5. گهوڙا مک (Pyrilla / Leaf Hopper):

هي جيت ڪمند جي سڀني گهڻو ڪري اهي جنسون انهن ۾ رس وڌيڪ هنڌ جيت جي حملي جي صورت ڪمند ۾ ڪنڊ جو مقدار

جنسن کي نقصان رسائي ٿو. پر جن جا پن ويڪرا ۽ ٿلها ٿين ٿا. ڪري وڌيڪ نقصان ڏئي ٿو. هن ۾ ڪمند جي واڌ رڪيو وڃي ۽ گهٽجي وڃي ٿو.

هن جا ٻچا ۽ وڏا (پوپٽ) ٻئي نقصان رسائين ٿا. هي جيت پنن ۾ رس چوسي ماکيءَ جهڙي پاڻياٺ خارج ڪري ٿو. جيڪا پنن کي ڪارو ڪري ڇڏي ٿي جنهن جي ڪري پنن ۾ خوراڪ نهڻ جو عمل رڪجي وڃي ٿو ۽ آخرڪار ٻوٽي جا پن سڪيو وڃن. هي جيت جنوري کان مارچ تائين ٻچي (Nymph) جي صورت ۾ رهي ٿو. اپريل ۾ ٻچا وڏا ٿي ڪمند تي حملو ڪن ٿا. هن جا سال ۾ 6 کان 8 نسل ٿين ٿا ۽ جولاءِ کان سيپٽمبر تائين هن جي واڌ گهڻي ٿيندي آهي.

جيتن کان بچاءُ لاءِ اپاءُ (Control Measures):

1. هر ڦار رستي جيتن کان بچاءُ (Cultural Control):
1. هميشه صاف ۽ صحتمند ٻج استعمال ڪجي.
2. سفارش ڪيل پاڻ صحيح مقدار ۾ وقتائون استعمال ڪرڻ گهرجي.
3. ڪمند مان گندگاهه ۽ گڏ جو خاص خيال ڪرڻ گهرجي.
4. ڪمند جي وڌ کان پوءِ ٽپين کي گڏ ڪري ساڙڻ گهرجي.
5. هڪ کان وڌيڪ منڍي وارو فصل وٺڻ نه گهرجي.
6. هميشه سڪل ۽ پراڻو وٽل جو پاڻ استعمال ڪرڻ گهرجي.

2. حياتياتي طريقو (Biological Control):

حياتياتي جيتن جي نسل کي بچائڻ لاءِ جيستائين ٿي سگهي زهريلين دوائن جو استعمال گهٽ ڪرڻ گهرجي. نقصانڪار جيتن جا انا جيئن پن تي نظر اچن ته هنن کي گڏ ڪري ناس ڪري ڇڏجن. گذر جي حملي جي صورت ۾ فائديمند جيت ڇڏڻ گهرجن. انهن ۾ ٽرائڪو گراما وڏي اهميت رکن ٿا. هن فائديمند

جيت مان تمام بهتر نتيجا مليا آهن. هي جيت تحقيقي ادارن ۽ مختلف شگرملن مان حاصل ڪري سگهجن ٿا.

3. ڦندي وارو طريقو (Light Traps):

هن طريقي ۾ جيتن کي ڦاسائڻ لاءِ رات جو فصل ۾ بتي (لالئين) رکيا وڃن ٿا جنهن جي روشني تي مختلف ڪيٽن جا پتنگ ۽ پوپٽ گڏ ٿين ٿا ۽ لالئين جي هيٺيان گاسليٽ مليل پاڻي ۾ ڦاسي مرن ٿا. انهيءَ کان علاوه جيتن جي نرن کي ڦاسائڻ لاءِ فيرامون جو استعمال عام آهي.

4. ڪيميائي طريقو (Chemical Control):

موثر ۽ ترٽ ختمي لاءِ دوائن جو استعمال ڪرڻ گهرجي ۽ هيٺ ڏنل دوائن مان ڪابه هڪ دوا جو استعمال ڪرڻ سان گڏرن جو تدارڪ ٿي سگهي ٿو. بشرطيڪه ڪمند جو فصل ننڍو هجي.

1. ريجنٽ 5 سيڪڙو ايس پي 480 سي سي في ايڪڙ.
2. ورٽاڪو (0.6 جي آر) 4 ڪلوگرام في ايڪڙ يا
3. ريڪٽر سپر (0.35%G) 8 کان 10 ڪلوگرام في ايڪڙ يا
4. ٽائيمپٽ (5G) 10 ڪلوگرام في ايڪڙ يا
5. فيورادان (10 G) 8 کان 10 ڪلوگرام في ايڪڙ يا
6. ريفري (3G) 8 کان 10 ڪلوگرام في ايڪڙ.

بيماريون ۽ انهن کان بچاءُ (Diseases & their remedies):

دنيا ۾ ڪمند جي فصل تي اٽڪل 80 بيماريون (Record) ٿي چڪيون آهن. پر اسان جي صوبي اندر هن فصل ۾ چند مکيه بيماريون ڏٺيون ويون آهن جن جي سڃاڻپ ۽ انهن تي ضابطو آڻڻ واري جامع حڪمت عملي هيٺ ٿئي ٿي.




1. چهڪ واري ڪاڻي (Whip Smut of Sugarcane):

ڪمند جي بيٺل فصل ۾ ٿسبو ته بيمار ٻوٽي جون نئون ڦٽندڙ چوٽيون ڊگهي ڪاري چهڪ وانگر نظر اينديون ۽ ان ۾ ڪاري رنگ جو پورو ڀريل هوندو جنهن جي مٿان چانديءَ جهڙو سنهون ڀردو چڙهيل هوندو آهي ۽ اهو جلدي ڦاٽي پوندو آهي ۽ بيماريءَ جا تخم هڪ فصل کان ٻئي فصل تائين هوا ذريعي اوڏامي وڃي تندرست فصل جي اکين تي داخل ٿيندا آهن.

بچاءُ لاءِ اپاءُ:

هن بيماري ۾ ورتل ٻوٽن کي پاڙان ڪري ساڙيو وڃي. بچ پوکڻ کان پهريائين ڳرين کي ٽاپس ايم 70 بلبو پي 200 گرام 100 لٽر پاڻيءَ ۾ 5 منٽن لاءِ ٻوڙي پوکڻ گهرجي.

2. رتي (Leaf Rust of Sugarcane):



هن بيماريءَ جي ڪري پنن جي مٿان ڳاڙهي ناسي رنگ جهڙو ڀورو لڳل نظر ايندو آهي ۽ بيماري جي شدت جيڪري پنن ۾ ساواڻ وارو عمل متاثر ٿيندو آهي ۽ پيداوار گهٽ لهندي آهي.

بچاءُ لاءِ اپاءُ:

جيڪڏهن هي بيماري فصل ۾ نظر اچي ته زرعي زهر ٽاپس ايم 20 بلبو پي 200 گرام 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي 10 کان 15 ڏينهن جي وقفي سان ٻه دفعا ڦوهارو ڪجي.

3. پن تي ڳاڙهيون لڪيرون (Red Stripes of Sugarcane):



هن بيماري جي ڪري پن ۽ ڳريون ٻئي متاثر ٿينديون آهن پنن جي مٿان ڳاڙهي رنگ جون سڌيون لڪيرون نظر اينديون آهن ۽ ڳريون به اندران

ڳاڙهيون ٿي وينديون آهن پنن ۾ ساواڻ وارو عمل پڻ رڪجي ويندو آهي جنهن جي ڪري فصل سڪڻ لڳندو آهي.

بچاءُ لاءِ اپاءُ:

هي بيماري فصل ۾ نظر اچي ته انهي پوٽي کي سڄو پاڙان ڪڍي ساڙڻ گهرجي. فصل پوکڻ کان اڳ ۾ ڳرين کي ٽاپسن ايم 70 ببلو پي/ ٽايوفينينٽ ميٽائل 200 گرام يا ڪاربنڊزم 50% 150-200 WP گرام في 100 لٽر پاڻيءَ جو ڳار ٺاهي اٽڪل 5 منٽن تائين پوڙي پوءِ پوکڻ گهرجي.

4. ڪمند جي چٽڪري وائرس (Sugarcane Mosaic Virus):



هي بيماري ڪمند جي جنسن ۾ عام طور تي ٿيندي آهي. هن بيماريءَ جي ڪري پن پيلاڻ مائل ٿي ويندا آهن جيڪي ڌارين يا ليڪن جي صورت اختيار ڪندا آهن. پوٽي اندر سائي مادي ٺهڻ وارو عمل پڻ رڪجي ويندو آهي جنهنڪري پوٽي جي واڌ ويجهه متاثر ٿيندي آهي.

بچاءُ لاءِ اپاءُ:

هن بيماريءَ کان بچاءُ لاءِ ڪو خاص اپاءُ دريافت نه ٿيو آهي جنهن جي ڪري اهڙيون جنسون پوکڻ گهرجن جن ۾ بيماري خلاف قوت مدافعت هجي.

5. اچي پنن واري بيماري (Grassy shoot/White leaf Disease):



هن بيماريءَ ۾ ڪمند جا پن اڇا ٿي ويندا آهن. فصل جي واڌ ويجهه رڪجي ويندي آهي. ڪمند جي ڪجهه جنسن تي هي بيماري شديد حملو ڪري ٿي. جنهن ڪري سمورو فصل تباهه ٿي ويندو آهي. هن بيماري کان بچاءُ لاءِ احتياطي اپاءُ وٺجن. ان لاءِ سفارش ڪيل جنسن جي پوکي ڪجي. فصل جي وار ڦير ڪجي. اهڙي جنس جو منڍو هرگز نه پوکجي.

منڍي ڪمند:

ڪمند جي وڍ کان پوءِ صرف هڪ منڍي فصل وٺجي. آبادگارن کي گهرجي ته منڍي فصل پوکڻ کان اڳ وڍ ڪيل ڪمند جي حالت سان گڏ فائڊن ۽ نقصانن کي ذهن ۾ رکن.

فائدا:

- بچ بچي ٿو.
- زمين جي تياري جو خرچ بچي ٿو.

نقصان:

- 25 سيڪڙو پاڻ وٽيڪ ڏجي ٿو.
- بچ لاءِ استعمال نه ڪجي.
- جيتن ۽ بيمارين جو حملو وٽيڪ ٿئي ٿو.
- ڦوٽهڙي جو سيڪڙو گهٽ ٿئي ٿو.



سورج مُڪي Sunflower

پوکيءَ جو وقت (Sowing Time):

سورج مُڪيءَ جي فصل مان به بهتر پيداوار حاصل ڪرڻ لاءِ اُن جي سفارش ڪيل وقت تي پوکي ڪرڻ تمام ضروري آهي. ته جيئن وقتاڻتي پوکي ڪرڻ سان فصل جي صحيح نشوونما ٿئي ۽ ايندڙ فصل لاءِ وقت سر زمين به خالي ٿي سگهي.

پوکيءَ جي مندَن جو گوشوارو

فصل		پوکيءَ جو وقت
		اُتر سنڌ
بهار وارو فصل (Spring Crop)	پهرين جنوري کان 15 جنوري	فيبروريءَ جو سڄو مهينو
	پهرين آگسٽ کان 15 آگسٽ	آگسٽ جو سڄو مهينو
سرءُ وارو فصل (Autumn Crop)		

سفارش ڪيل جنسون ۽ بچ جو مقدار

(Recommended Varieties & Seed Rate)

سورج مُڪيءَ جون ٻن قسمن جون جنسون ٿين ٿيون. هڪڙيون ديسي جنسون جهڙوڪ: ايڇ او-1 (HO-1) ۽ ٻيون ٻه سريون جنسون يعني هائبرڊ (Hybrid) بچ جو مقدار هيٺينءَ ريت سفارش ڪجي ٿو:

جنس	ناڙي پوک	ڪريا چٽ ڪيڙ پوک
1. ديسي جنس (HO-1)	3 ڪلوگرام في ايڪڙ	ساڍا ٽي ڪلوگرام في ايڪڙ
2. ٻه سري جنس (Hybrid)	ٽيڏي ڪلوگرام في ايڪڙ	2 ڪلوگرام في ايڪڙ

سورج مُڪيءَ جي ديسي جنس پوکڻ جي صورت ۾ هيٺين خاص ڳالهين تي چڱيءَ ريت عمل ڪجي. ديسي جنس هڪ جاءِ تي 10 ايڪڙن کان وڌيڪ هرڪڙ پوکڻ نه گهرجي. ڇاڪاڻ ته ديسي جنس ۾ لڳ جو عمل جيتن ۽ مڪين وغيره جي معرفت ٿئي ٿو جيڪي ساڳي ايراضيءَ ۾ گهٽ هوندا آهن. ديسي جنس واري فصل ۾ هٿرادو ماڪيءَ جون ڪالونيون رکڻ سان پيداوار تي تمام گهڻا مثبت اثر پون ٿا. ڇاڪاڻ ته ماڪيءَ جون مڪيون هڪ گل کان ٻئي گل ڏي رس چوسڻ لاءِ اڏامنديون رهن ٿيون جنهن جي ڪري جنسي ميلاپ ٿيندو آهي ۽ نتيجي ۾ گلن ۾ بچ نهڻ شروع ٿي ويندو آهي. هڪ اندازي موجب فصل ۾ ماڪيءَ جون ڪالونيون رکڻ سان ٽيڻ تي پيداوار وڌيڪ حاصل ڪري سگهجي ٿي. ان لاءِ شعبه ريشم سازي و ماڪيءَ جي پالنا ٻيلو کائو، حڪومت سنڌ اُتو پان، يونٽ نمبر 3، لطيف آباد، حيدرآباد سان رابطي ۾ اچڻ گهرجي. سورج مُڪيءَ جي ديسي جنس جو تصديق ٿيل بچ ٽيلي بچن جي تحقيقي مرڪز، ٽنڊوڄام مان مناسب اگهه تي آبادگار آفيس جي ڪم ڪار وارن ڏينهن مان ڪنهن به ڏينهن تي خريد ڪري سگهن ٿا. جڏهن ته هائبرڊ بچن جي پوکيءَ لاءِ ڀروسِي وارو بچ پوکجي.

زمين جي چونڊ (Land Selection):

سوج مڪيءَ جي پوکيءَ سم وارين، گهڻين ڪلرائين ۽ وارياسين زمينن کان سواءِ ٻين سمورين زمينن ۾ ڪري سگهجي ٿي. پر وچولين لٿياسين زمينن، جن ۾ وڻاڻ جو پاڻ يا سائو پاڻ پيل هجي تن ۾ سورج مڪي پوکڻ سان وڌيڪ پيداوار حاصل ٿيندي. ڇاڪاڻ ته زمين کي ساڄي نه ڏيڻ، فصل مٿان فصل پوکڻ، فصلن جي واري نه ڪرڻ ۽ فصلن کي گهڻي ڪيميائي پاڻ ڏيڻ جي ڪري زمين جي زرخيزي تمام گهڻي گهٽجي وئي آهي.

زمين ۾ نامياتي مادي کي وڌائڻ جا ٻه ذريعا آهن. هڪ سائو پاڻ ۽ ٻيو وڻاڻ جو پاڻ جيڪو زمين ۾ هر ٽئين سال استعمال ڪرڻ تمام ضروري آهي.

سائو پاڻ (Green Manure):

سائي پاڻ لاءِ سٺي، گوار، جنٽر، برسيم ۽ لوسٽ وغيره سفارش ڪيا وڃن ٿا جن منجهان سٺيءَ کي سائي پاڻ لاءِ مٺي مهيني ۾، گوار کي اپريل کان جولاءِ تائين ۽ جنٽر کي مارچ کان جولاءِ تائين پوکجي ۽ اُهي جڏهن اٽڪل سٺ ڏينهن کن جا ٿين ته بيٺل فصل ۾ مٿان سانهر گهمائجي ته جيئن فصل زمين تي سمهي پوي. بعد ۾ ٽريڪٽر ذريعي روتاوئير ڏيئي، ان کي زمين ۾ ملائي، مٿان ريچ جو پاڻي ٽجي. ريچ کان پوءِ جيئن ئي زمين وٽ ۾ اچي ته هر ڏئي وري ٻيو ريچ جو پاڻي ٽجي. ان ٻئي ريچ کان پوءِ زمين وٽ ۾ اچڻ تي سورج مڪيءَ جي سرءُ واري فصل جي پوکيءَ لاءِ زمين تيار ڪجي.

ساڳيءَ ريت وري سورج مڪيءَ جي بهار واري فصل جي پوکيءَ لاءِ زمين ۾ سائي پاڻ لاءِ لوسٽ يا برسيم پوکڻ گهرجي. لوسٽ ۽ برسيم سيپٽمبر جي وچ کان نومبر جي وچ تائين پوکڻ گهرجي. جن جو هڪ ٻه لوب لڻڻ کان پوءِ مٿئين طريقي موجب بيٺل فصل کي زمين ۾ ملائي زمين پوکيءَ لاءِ تيار ڪجي.

وڻاڻ جو پاڻ (Farm Yard Manure):

وڻاڻ جي پاڻ ۾ زمين جي بهتريءَ واري خاصيت ۽ بوٽن لاءِ گهربل خوراڪي جزا جهڙوڪ: نائٽروجن، فاسفورس، پوٽاشيم، سلفر، ڪئلشيم، منگنيشيم، فيرس، زنڪ، ڪاپر، مينگنيوز، مولبڊينم ۽ بوران ٿين ٿا. ليڪن وڻاڻ جي پاڻ مان پرڀور فائدو حاصل ڪرڻ لاءِ ان جو صحيح طرح سان استعمال تمام ضروري آهي. جنهن جي بنيادي ڳالهه پاڻ جو ڳريل سڙيل هجڻ آهي. جڏهن ته عام طرح اهو ڏٺو ويو آهي ته آبادگار تازو پاڻ زمين ۾ وجهي پوکي ڪن ٿا، جنهن جي ڪري فصل ۾ گندگاهه جو تمام گهڻو مسئلو ٿئي ٿو ۽ ان سان گڏ تازو وڻاڻ جو پاڻ فصل لاءِ مؤثر ثابت نه ٿو ٿئي.

ڳريل سڙيل پاڻ جو سورج مڪيءَ جي فصل لاءِ ان ريت استعمال ڪجي ته سورج مڪيءَ جي پوکيءَ لاءِ چونڊيل زمين کي جيڪڏهن اڳ ۾ سائو يا وڻاڻ جو پاڻ ٺاهي ڏنل ته پوءِ 150 کان 200 مٺ في ايڪڙ جي حساب سان وجهي فوري طور هر ڏئي زمين سان ملائي ريچ ڪجي. ريچ کان پوءِ جيئن زمين وٽ ۾ اچي ته هر ڏئي وري ٻيو ريچ ڪجي. ٻئي ريچ کان بعد زمين وٽ ۾ اچڻ تي پوکيءَ لاءِ زمين تيار ڪجي.

زمين جي تياري (Land Preparation):

سورج مڪيءَ جي پوکيءَ لاءِ زمين کي چڱيءَ طرح به اونهه هر ڏئي مٿان سانهر گهمائي پٽر پڇجن. جي زمين هلڪي ڪلرائي هجي ته ان ۾ سب سوائلر سان زمين کي هر ڏئي مٿان پٽر پڇڻ لاءِ سانهر ڏجي. جنهن کان پوءِ زمين ۾ ٻارايندي ڪجي. ٻاراينديءَ لاءِ زمين کي ڏهن ڏهن ويسن ۾ ورهائجي. ۽ ٻارايندي ڪرڻ دوران پاڻي ڏيڻ لاءِ ناليون اهڙيءَ طرح ٺاهجن جيئن هر ٻاري کي پاڻي جدا جدا ۽ آسانيءَ سان هڪجهڙو اچي سگهجي.

ٻارايندي ڪرڻ کان پوءِ زمين کي سنوٽ ۾ آڻڻ لاءِ ڪيڻ گهمائجي يا ليزر ليولر سان زمين کي هموار ڪجي.

سڪيءَ زمين کي تيار ڪرڻ کان پوءِ چڱيءَ طرح ريچ ڪجي ۽ اُها ريچ واري زمين جڏهن وٽ ۾ اچي ته ٻيهر ڪيڻ هڻي ڌڙي ڌڪي سڌي ڪري بعد ۾ سائيءَ جا ٻه هر ڏئي مٿان سهاڳو گهمائجي، پر جي وڻاڻ جو پاڻ وٺل هجي ته ان کي وري ٻيو ريچ ڪري زمين تيار ڪجي.

پوکيءَ جا طريقا (Sowing Methods):

پوکيءَ جا جيئن ته مروج ٿي طريقا آهن. هڪڙو چٽ کيڙ، ٻيو ڪُر يعني گپ ۾ بچ چٽڻ ۽ ٽيون طريقو آهي، ناڙيءَ رستي پوکي ڪرڻ. جيڪي مختلف حالتن ۾ ماحول ۽ ضرورت مطابق عمل ۾ آندا وڃن ٿا. هنن ٽنهي طريقن مان ناڙي ڪامياب پوک آهي. ناڙي پوک ۾ قطارن جي وچ ۾ مفاصلو سوا ٻه کان اڍائي فوٽ رکڻ گهرجي ۽ ٻوٽن جي وچ ۾ مفاصلو 9 انچ بيهارجي. ناڙي ڪوشش ڪري ٿريڪٽر ذريعي ڪجي. ناڙي رستي پوکي ڪرڻ جي ڪري بچ جو ڦوٽهڙو سٺو ٿئي ٿو. ناڙيءَ واري پوک سان اوڙيون سڌيون ۽ کليل ٿين ٿيون جن مان هوا ۽ سج جي روشني آسانيءَ سان گذر ڪري ٿي. ۽ انهن جي موجودگيءَ ۾ ٻوٽا پنهنجو کاڌ خوراڪ پنن رستي بهتر نموني تيار ڪن ٿا. جنهن ڪري ٻوٽن جي واڌ ويجهه سٺي ٿئي ٿي. ناڙيءَ واري پوک ۾ گڏ، ڪيميائي پاڻ ۽ جيت مار دوائون آسانيءَ سان، ٿوري وقت ۾ ۽ بهتر نموني ڏني سگهجن ٿيون.

سارين ۾ پوکي:

سارين جي عام مندانتي فصل ۾ به آخري پاڻي ڏيڻ کان پوءِ گپ ۾ سورج مڪيءَ جو بچ چٽي سگهجي ٿو. پر ان ريت پوکي ڪرڻ لاءِ بچ کي ڇهه (6) ڪلاڪ پاڻيءَ ۾ پٽائي پوءِ چٽجي ته ڦوٽهڙو وڌيڪ سٺو ٿيندو. گپ ۾ پوکيل سورج مڪيءَ جيستائين سارين جو لاپارو ٿيندو تيستائين ڦوٽهڙو ڪري ويندو. ۽ لاپاري کان پوءِ پنهنجي بهتر نشوونما ڪري سگهندو. ان پوک تي خرچ تمام گهٽ اچي ٿو ۽ وقت جي بچت به ٿئي ٿي، پر ان فصل مان ايتري پيداوار نه لهندي.

زيرو ٽيليج ناڙي رستي پوک:

پاڻي ۽ خرچ بچائڻ لاءِ سورج مڪيءَ جي دوبري فصل طور سارين جي فصل مان وائي ٿيل زمين ۾ فوري طور تي زيرو ٽيليج ناڙيءَ رستي پوکي سگهجي ٿو. زيرو ٽيليج ناڙيءَ ذريعي پوکي ڪرڻ سان زمين کي هر ڏني ٺاهڻ جي ضرورت نٿي پوي. هيءَ ناڙي زراعت کاتي سنڌ جي زرعي انجنيئرنگ واري شعبي جي ڪنهن ويجهي آفيس سان مشورو ڪري وٺڻ گهرجي يا ڪنهن پاڙي واري زميندار وٽ هجي ته اها استعمال ڪجي. زيرو ٽيليج ناڙيءَ رستي پوکي ڪرڻ لاءِ اوڙن جي وچ ۾ اڍائي فوٽن جو مفاصلو رکجي.

ٻئي پوک:

سورج مڪي ڪمند جي فصل ۾ ٻئي پوک طور به پوکيو وڃي ٿو. جنهن لاءِ سرءُ ۽ بهار جي مندن ۾ ڪمند پوکي ڪري جيڪو پاڻي ٽجي، انهيءَ پاڻيءَ کان پوءِ جيئن ئي زمين وٽ ۾ اچي ته سورج مڪيءَ جي ناڙيءَ رستي ڪمند جي اوڙن جي وچ ۾ سورج مڪيءَ جي پوکي ڪري وڃجي. ڪمند ۾ سورج مڪي پوکڻ سان سورج مڪي ڪمند جي ئي پاڻيءَ ۽ پاڻ تي راس ٿئي ٿو ۽ ڪمند ۾ پوکيل سورج مڪيءَ مان ايتري آمدني ٿي وڃي ٿي. جنهن مان ڪمند جو خرچ آسانيءَ سان لهي وڃي ٿو.

ڪيميائي پاڻ جي گهرج (Requirement of Chemical Fertilizer):

ڪيميائي پاڻ استعمال ڪرڻ لاءِ پنهنجي فصل واري زمين جي مٽيءَ جي چڪاس ڪرائي پوءِ پاڻ ڏيڻ گهرجي ته وڌيڪ بهتر آهي، پر مجبوريءَ واري حالت ۾ سورج مڪيءَ لاءِ سفارش ڪيل زمينن ۾ هيٺينءَ ريت پاڻ ڏيڻ گهرجي:

ڪيميائي پاڻ جون سفارشون

فصل	پاڻ جو قسم	پاڻ جو مقدار في ايڪڙ	پاڻ ڏيڻ جو وقت
موڪي فصل	نائٽروفاس	2 پوريون	پوکيءَ وقت

پهرئين پاڻيءَ تي	هڪ ٻوري	يورپا	دوباري فصل
پوکيءَ وقت	2 ٻوريون	نائٽروفاس	
پوکيءَ وقت	اڌ ٻوري	يورپا	

ڪيميائي پاڻ ڏيڻ وقت ان ڳالهه جو خيال رکڻ گهرجي ته جيڪڏهن ڪنهن سبب جي ڪري سورج مڪيءَ ڪرائي زمين ۾ پوکڻو هجي ته ان زمين ۾ فصل کي ڪيميائي پاڻ نه ڏجي. جڏهن ته عام زمين ۾ سورج مڪي پوکڻ جي صورت ۾ سفارش ڪيل فاسفورس واري پاڻ کي گريل سڙيل وڻاڻ جي پاڻ سان گڏائي ڏيڻ گهرجي ته فاسفورس ٻوٽن کي وڌيڪ موثر نموني مهيا ٿي ملندو ۽ فاسفورس واري پاڻ جي هڪ ٻوريءَ کي ٻن وڻاڻ جي پاڻ جي ٻورين جي نسبت سان پاڻ ۾ ملائي پوءِ ڇڻجي.

ٻوٽن جو تعداد (Plant Population):

سورج مڪيءَ جي فصل مان بهتر پيداوار وٺڻ ڪاڻ ٻوٽن جو تعداد 20 کان 25 هزار في ايڪڙ هجڻ ضروري آهي.

گڏ ۽ مٽي چاڙهڻ (Interculturing & Earthing up):

سورج مڪيءَ جي فصل ۾ به ٻين فصلن جيان گندگاهه ڦٽي ان سان ڪاڌ خوراڪ ۾ پاڻي پائيواري ٿيڻ ٿا ۽ فصل ۾ جيئن جو حملو به وڌي ٿو. جنهن جي ڪري فصل جي صحيح نشونما نٿي ٿئي. ان ڪري هن فصل ۾ ئي گڏون ڏيڻ جي ضرورت پوي ٿي. انهن گڏن مان پهرين گڏ پهرين پاڻي ڏيڻ کان اڳ ۾ ڏيڻ گهرجي ۽ باقي ٻه گڏون ٻئي ۽ ٽئي پاڻيءَ کان پوءِ جيئن ئي زمين وٽ ۾ اچي ته ڏيڻ گهرجن. فصل ۾ گڏون ڏيڻ سان زمين کلي ٿي ۽ پاڙون صحتمند ٿي ٻوٽي تائين گهربل مقدار ۾ خوراڪ پهچائين ٿيون ۽ ساڳئي وقت جيئن جو حملو گهٽ ٿئي ٿو.

سورج مڪيءَ جي ٻوٽن جي چوڌاري مٽي چاڙهڻ سان پيداوار ۾ بهتريءَ جا نتيجا سامهون آيا آهن. تنهن ڪري جڏهن ٻوٽا هڪ فوٽ جيترا ٿين ته انهن جي چوڌاري شام جي وقت مٽي چاڙهجي.

پاڻي ڏيڻ (Water Schedule):

فصل جي پاڻيءَ جي گهرج جو دارومدار آب هوا، زمين جي قسم ۽ زمين جي سيڪ رکڻ واري صلاحيت تي آهي. پنهنجي فصل جي حالت کي ڏسي ۽ پاڻيءَ جي موجودگيءَ کي ذهن ۾ رکي فصل کي پاڻيءَ ڏيڻ گهرجي. سورج مڪيءَ کي پهريون پاڻي ۽ جڏهن فصل کيري ڏنڌر تي هجي ته اهي ٻئي پاڻي هر حال ۾ مقرر وقت تي ڏيڻ گهرجي.

هن فصل کي هيٺينءَ ريت عام طور تي پاڻي ڏيڻ جي ضرورت ٿئي ٿي.

سورج مڪيءَ کي پاڻي جي گهرج

پاڻين جو تعداد	بهار ۽ سرءُ جا فصل
پهريون پاڻي	پوکيءَ جي 21 ڏينهن کان پوءِ
ٻيو پاڻي	پهرئين پاڻيءَ جي 15 ڏينهن کان پوءِ
ٽيون پاڻي	فصل ۾ جڏهن گل اچڻ شروع ٿين
چوٿون پاڻي	جڏهن فصل کيري ڏنڌر تي هجي



نقصانڪار حيت (Insect Pests):

سورج مڪيءَ جي فصل تي اچي مک، سائي مهلي، بوجاري ڪينئين ۽ لشڪري ڪينئين جو حملو ٿئي ٿو. ليڪن انهن جي ضابطي جو دارومدار پيسٽ اسڪائونٽنگ يعني جيئن جي ڇاڇ پڙتال تي آهي. جنهن ذريعي جڏهن به ڪو هڪڙو يا هڪ کان وڌيڪ حيت نقصان واري حد تي پهتل هوندا. تڏهن انهن جي خاتمي لاءِ ڪنهن موثر ڪيميائي دوا جو ڦوهارو ڪجي.

جهار هڪڻ:

سورج مڪيءَ جي فصل ۾ چهار جو مسئلو عام آهي، هن فصل ۾ جيئن گل ٺڙڻ لڳن ٿا ته مختلف پڪي

خاص طور ڇٽون (طوطا) وغيره اڇي ڪڙڪن ٿا. جن جي حملي سبب پهچندڙ نقصان کان بچڻ لاءِ لابياري ۽ ول کي ڳاهي وائري اناج کڻڻ تائين چڱيءَ طرح جهاز هڪلڻ گهرجي.

لابارو، ڳاهه ۽ ذخيره (Harvesting, Threshing & Storage):

جڏهن سورج مڪيءَ جي گلن جو هيٺيون پاسو سائي رنگ مان ڦري پيلو ٿي وڃي ته لابياري ڪرڻ گهرجي. لابياري کان پوءِ گلن کي ڏيري ۾ اهڙي طرح پڪيڙي رکجي. جيئن اُهي هڪ ٻئي کان الڳ هجن، ٻي صورت ۾ اُهي چڱيءَ طرح نه سُڪي سگهندا ۽ انهن ۾ سينوراجڻ جو خطرو رهندو. سڪائڻ لاءِ پڪيڙيل گلن کي وقت بوقت صفا سڪڻ تائين اُٿلائبو رهجي. صفا سڪل گلن کي سورج مڪيءَ واري ٿريشر ذريعي يا وري جيڪڏهن ول ٿوري هجي ته ڏنبن سان سئي ان ڌار ڪري وڪرو ڪجي.

پيداوار (Yield):

سورج مڪيءَ جي موجود جنسن ۾ 25 کان 30 مڻ في ايڪڙ پيداوار ٿيڻ جي صلاحيت آهي. ان لاءِ جيڪڏهن مٿين ڏسيل ڳالهين تي عمل ڪيو ويندو ته يقينن اها پيداوار حاصل ڪري سگهجي.



خريف جون پاڇيون Kharif Vegetables

ڪيميائي پاڻن لاءِ مشورو:

جيئن ته زمينون مختلف قسمن جون ٿين ٿيون، جهڙوڪ؛ وارياسيون، لٽياسيون، پڪيون، ڪلر وغيره واريون. ان ڪري هر قسم جي زمين لاءِ پاڻ مختلف قسم جو مختلف وزن ۾ ڏيڻو هوندو آهي. جنهن لاءِ زمين جي مٽي ليبارٽريءَ مان چڪاس ڪرائڻي هوندي آهي. ته جيئن پتو پوي ته زمين ڪهڙي قسم جي آهي. ۽ ان کي ڪهڙو پاڻ ۽ ڪيترو ڏيڻ گهرجي. ليبارٽريون زراعت کاتي حڪومت سنڌ پاران گهڻو ڪري هر ضلعي اندر قائم ٿيل آهن. جيڪي معمولي في وصول ڪرڻ سان مٽي چڪاس ڪري ڏين ٿيون. ڪافي جاين تي اهو ڏٺو ويو آهي ته ڪارائين ۽ پڪين زمينن ۾ به آبادگار ڊي-اي-پي پاڻ ڏين ٿا. جڏهن ته اهڙين زمينن ۾ ڊي-اي-پي پاڻ منع ٿيل آهي جنهن جي جاءِ تي ايس-ايس-پي يا ٽي-ايس-پي وغيره ڏيڻو آهي. ان ڪري جتي پاڇيون پوکڻيون هجن اتي جي پهريان ليبارٽريءَ مان مٽي چڪاس ڪرائجي. ڪيميائي پاڻ ڏيڻ جي لاءِ ان ڳالهه جو به خاص خيال رکجي ته پاڻ ڇڏي ڇڏي نه ڏجي پر پاڻي ڏئي پوءِ پاڻ ڏجي جڏهن زمين ۾ اڃان گپ هجي. ڪيميائي پاڻ ڪوشش ڪري ٻوٽن جي پاڙن وٽ ڏيڻ گهرجي. سڄي زمين ۾ ڇڏڻ سان هڪ ته پاڇيءَ وارن ٻوٽن کي پاڻ گهٽ ملي ٿو ۽ خالي زمين ۾ وڃي ڪري ٿو. جنهن جي ڪري پاڻ زيان به ٿئي ٿو ۽ زمين جي خالي جاين تي پاڻ ٻوٽن سان گندگاهه گهڻو زور وٺي وڃي ٿو.

زمين جي چونڊ ۽ تياريءَ لاءِ مشورو:

پاڇين جي پوکيءَ لاءِ ڪوشش ڪري نرم لٽياسي زمين جي چونڊ ڪجي ته جيئن پاڇيون پليون ٿين. تياريءَ ۾ خاص طور تي زمين جي سنوٽ ۽ اونهن هرن ڏيڻ تي خاص ڌيان ڏيڻ گهرجي. زمين جي سنوٽ لاءِ جيڪڏهن سهولت موجود هجي ته ليزر ليولنگ مشين استعمال ڪجي.

بج سيڪ تي هٽڻ جو مشورو:

بج جون چنگيون با بيجاري جو روٽو ڪرين کي پهريان پاڻي ڏئي جتي سيڪ هجي اتي هٽڻ گهرجي. سيڪ تي پوکيل پاڇي جلد ڦٽي ٿي ۽ تيار به ٿڪڙي ٿئي ٿي.

چيزل پلو هٽڻ جو مشورو:

عام طور تي زمين اندر سخت تهه جڙي پوي ٿو. جنهن جي ڪري پيداوار گهٽ لهي ٿي. ان ڪري سخت تهه کي ٽوڙڻ لاءِ ضروري آهي ته هر ٽئين سال زمين ۾ چيزل پلو ضرور هٽڻ گهرجي. چيزل پلو هٽڻ سان نه صرف زمين اندر جڙيل سخت تهه ٽٽي پوي ٿو. پر ساڳئي وقت چيزل پلو جي اها به خاصيت آهي ته اهو زمين اندر راجا ۽ بسڪ پلو کان گهڻو اونهو به وڃي ٿو ۽ زمين کي اٿلائڻ به بلڪل نٿو ۽ زمين جو مٿيون طاقت وارو تهه به پنهنجي جاءِ تي برقرار رهي ٿو.

وڻاڻ جي پاڻ ڏيڻ جو مشورو:

سنڌ جي زمينن ۾ هڪ سيڪڙو کان به گهٽ نامياتي مادو آهي. جيڪو زمينن مان سٺي پيداوار کڻڻ لاءِ بلڪل ناڪافي آهي جنهن کي وڻاڻ لاءِ ضروري آهي ته زمينن کي هر ٽئين سال وڻاڻ جو ڳريل سڙيل پاڻ ضرور ڏيڻ گهرجي. وڻاڻ جو پاڻ پاڇين پوکڻ کان پهرين زمين ۾ 150 کان 200 مٺ في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي پاڻ ڏيڻ وقت ان جي ڳريل سڙيل هجڻ جي پڪ ضرور ڪرڻ گهرجي فصل ۾ تازو وڻاڻ جو پاڻ هرگز نه وجهڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته هڪ طرف وڻاڻ جي تازي پاڻ م زمين کي

سڌارڻ واري گهريل طاقت ناهي هوندي ۽ ٻئي طرف ان ۾ گندگانه جا بچ موجود هوندا آهن. ان کان علاوه ڪچو پاڻ زمين ۾ وجهي ڀاڄيون پوکڻ سان ڀاڄين کي اڻوهي لڳي ٿي ۽ ڀاڄين جي فصل ۾ نقصان ٿئي ٿو. وڻڻ جو پاڻ ڀاڄيون پوکڻ کان هڪ مهينو پهرين زمين ۾ وجهي هڪدم هرن ذريعي ملائي مٿان پاڻي ڏيڻ گهرجي. پاڻي ڏيڻ کان پوءِ جڏهن زمين وٽ ۾ اچي ته هر ڏني وري ريج ڪجي ۽ ٻيهر جڏهن زمين وٽ ۾ اچي ته هر ڏني زمين کي تيار ڪجي.

ڀاڄين ۾ پاڻ ۽ پاڻيءَ جي استعمال لاءِ مشورا:

پاڻي ڀاڄين کي گهڻو هرگز نه ڏجي ۽ خاص طور تي ڪرين تي پوکيل ڀاڄين ۾ پاڻي اهڙي طرح ڏجي جيئن چنگين لڳل ٻوٽن تائين رڳو سيڪ پهچي پر اهي پاڻيءَ ۾ هرگز نه ٻڏن ڇاڪاڻ ته سيڪ واري ڀاڄي تمام گهڻي سٺي ٿئي ٿي. سڀني ڀاڄين کي پوکيءَ کان پوءِ به ٽي پاڻي ٽڪڙا ڏيڻ گهرجن.

بيجارو پوکڻ لاءِ مشورو:

بيجاري رستي پوکجندڙ ڀاڄين جهڙوڪ؛ مرچن، واڱڻن، بصرن، گوبي ٽماٽن وغيره جي بيجاري تيار ڪرڻ لاءِ هيٺين طريقي کي اختيار ڪجي:

بيجارو بگهين اڀين پٿرين جي شڪل وارين ٻارين ۾ پوکجي. اهڙين ٻارين ۾ لٽ واري مٽي وجهي زمين جي سطح کان مٿي ڪري وڃ مان اهڙي طرح ناليون ڪڍجن ته جيئن جيڪڏهن پاڻي ڪنهن به سبب جي ڪري گهڻو ٿي وڃي ته اهو نالين ۾ وهي وڃي ۽ بيجارو گهڻي پاڻيءَ جي ڪري سڙي نه. ان کان پوءِ ڪڪ پڻ ۽ ٻيو گند ڪڍڻ ساڙي خاڪ تيار ڪجي. ۽ اها خاڪ جڏهن ٿري وڃي ته جنهن به ڀاڄيءَ جو بيجارو پوکڻو هجي ان جو بچ لٽ واري مٽيءَ تي ڇڏي مٿان خاڪ ايتري وجهجي جيئن بچ چڱيءَ طرح ڍڪجي وڃي ۽ ڍڪيل بچ کي هٿ واري قوهاري سان پاڻيءَ جو قوهارو ڪري مٿان ڪڪ يا سارين جي پلال سان ڍڪي ڇڏجي. جنهن بعد روزانو ڪڪن جي مٿان هٿ واري قوهاري سان تيسنائين پاڻيءَ جو قوهارو ڪجي جيستائين بچ مڪمل ڦٽي وڃي. جنهن بعد پاڻيءَ جو ٻئي ٽئين ڏينهن قوهارو ڪيو رهجي ۽ جڏهن بيجارو وڏو ٿي وڃي ته ڪڪ ڪاٽا هٽائي ڇڏجن.

جيتن ۽ بيمارين لاءِ مشورو:



ڀاڄين ۾ ٻن قسمن جا جيت هوندا آهن. هڪڙا اهي جيڪي ڀاڄين کي نقصان پهچائن ٿا. مثال طور اڇي مک، ساڻو مهلو، ٿرڙو، ساڻو ڪينئون، لشڪري ڪينئون وغيره ۽ ٻيا وري اهي جيت آهن جيڪي فصل کي نقصان نٿا پهچائن پر نقصان وارن جيتن کي ڪاٽي پنهنجو پيٽ پرين ٿا. ان ڪري اهڙن جيتن کي هاري نوست جيت به چيو وڃي ٿو. جن ۾ پنيوريون، ڏينپو، ٽنڊيون وغيره اچي وڃن ٿيون. ان ڪري ڀاڄين ۾ جيتن جي نقصان کان بچڻ لاءِ زهرن جو قوهارو گهٽ ڪجي ۽ هيٺين ڳالهين تي نيان ڏجي:

ٻاجهري جي آن جو استعمال:

جيڪڏهن ڀاڄيءَ ۾ ڪينئن جو حملو گهڻو هجي ته ٻنن سان ٻاجهريءَ جي ان جي لڀ ڇڻي ڇڏجي ته ان تي پڪي ايندا جيڪي ٻاجهريءَ جي ان کي ڪاٽڻ سان گڏ ڪينئن جو به خاتمو آڻي ڇڏيندا.

سرف ۽ پاڻيءَ جو قوهارو:

جيڪڏهن ڀاڄيءَ ۾ رس چوسڻ وارا جيت هجن ۽ پنن تي مٽي يا سٽپ يا ڪاري ماڪيءَ جهڙي حالت هجي ته هڪ چمچو سرف جي پاڻوڊر جو ڪلهي واري قوهاري جي ٻيبي ۾ پاڻيءَ ۾ وجهي قوهارو ڪجي ته ڪافي حد تائين تدارڪ ٿي ويندو.

نم جي پنن جي ڳار جو استعمال:

نم جي ڏهه (10) ڪلوگرام سلون پنن کي ڪنهن ڊرم ۾ وجهي ايترو پاڻي ڀرجي جيئن ٻن چڱيءَ ريت پسي وڃن. جنهن بعد انهن کي باهه تي ڪاڙهجي ۽ ايتري تائين ڪاڙهجي جيئن پاڻي سڪي هڪ لٽر وڃي بچي. بچيل هڪ لٽر ڳار کي سنهي ڪپڙي ۾ ڇاڻي ڪنهن بوتل ۾ وجهي رکجي. جڏهن پوکيل ڀاڄين تي معمولي جيتن جو حملو نظر اچي ته ان وقت ان بوتل مان 100 ملي لٽر ڪلهي واري ڦوهاري جي دٻي ۾ وجهي ڦوهارو ڪجي ۽ وري انهن ٽينهن ٻيو ڦوهارو ڪجي. نم جي ڳار جو ڦوهارو ڪرڻ سان جيتوڻيڪ جيت مرندا ڪون پر اهي واڙيءَ مان ڀڄي ويندا ۽ ٻاهران وري ٻيا نقصانڪار جيت واڙيءَ ۾ داخل نه ٿيندا.

ٽوم جو ڦوهارو:

هڪ ڪلو ڪٽيل ٽوم، 20 چانهه وارا چمچا (100 گرام) سرف يا صابن، 20 چانهه وارا چمچا گاسليٽ ۽ 5 لٽر پاڻي جو ڳار ٺاهيو. جنهن لاءِ ٽوم گاسليٽ ۾ 24 ڪلاڪ پسانِي رکجي ان کان پوءِ ان ۾ سرف يا صابن ۽ پاڻي وجهي چڱي طرح هلائي هلائي ڇاڻيل ڳار مان هڪ حصو ۽ 20 حصا پاڻي ملائي ڀاڄين تي ڦوهارو ڪجي ته جيت ضابطي ۾ رهندا.



ڦوڏني جو ڦوهارو:

ڦوڏني جي هڪ ڪلو گرام پٺن کي گهڻي هڪ سؤ لٽر پاڻيءَ ۾ چڱيءَ طرح ملائي ڀاڄين تي ڦوهارو ڪريو ته پٺن تي داغن وارين بيمارين کان بچاءُ ۾ مدد ملندي. ڦوهاري لاءِ حجامن جي دڪانن تي استعمال ٿيندڙ هٿ وارو ڦوهارو استعمال ڪجي.

چنڊ پيون ڳالهيون:

1. ڀاڄين ۾ گندگاهه کي هرگز وڌڻ نه ڏجي ڇاڪاڻ ته گندگاهه جي اندر جيت جٿيا وڌيڪ شدت اختيار ڪن ٿا ۽ ڀاڄين جي خوراڪ کڻي انهن کي ڪمزور به ڪن ٿا.
2. نائٽروجن وارو پاڻ گهڻو نه ڏجي. گهڻو ڏيڻ سان ڀاڄيون ڪُڇ ۽ ساوڪ وڌيڪ ڪن ٿيون جنهن جي ڪري جيتن جو حملو وڌي ٿو وڃي.
3. بيمار ٻچ يا بيجارو هرگز نه پوکجي.
4. ڀاڄين جي روزانو جاچ ڪبي رهجي.
5. زرعي زهرن جو شروعات ۾ تڪڙو ڦوهارو ڪرڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي.
6. ڀاڄيءَ جي چوڌاري پٺن سان سورج مڪي، مڪئي يا جوئر جون قطارون ضرور پوکجن ڇاڪاڻ ته انهن قطارن ۾ جڏهن اُن ٺهندو ته پڪي اُن جي لاري فصل ۾ ايندا ۽ اتي ڀاڄيءَ ۾ موجود ڪينئن کي به ڇڏڻ لڳندا. جنهن جي ڪري ڀاڄيءَ ۾ هروپرو زهرن جو ڦوهارو نه ڪرڻو پوندو.

پينڊي (Okra/ lady Finger)

پوکيءَ جو وقت: نومبر کان مارچ تائين
 ٻج جو مقدار: ڪرين تي 4 کان 5 ڪلوگرام ۽ ناڙي لاءِ 10 کان 12 ڪلوگرام في ايڪڙ.
 نوٽ: جيئن ته عام طور تي خريدار ڪڇڙيون ۽ نرم پينڊيون خريڏڻ کي پسند ڪن ٿا. ان ڪري ڪي زميندار 20 کان 25 ڪلو في ايڪڙ ٻج ڏين ٿا. جنهن جي ڪري گهڻا پينڊين مان اهڙو مال ملي ٿو پر پوءِ گهڻا پينڊين ۾ جيتن جي ضابطي لاءِ خاص قدم کڻڻا پون ٿا.



پوکيءَ جو طريقو: ڪريا ۽ ناڙي
 مفاصلو: ڪرين لاءِ اڍائي کان ٽي فوٽ ۽ ناڙيءَ لاءِ ٽيڊ کان ٻه فوٽ.

ڪيميائي پاڻ: 1 1/2 پوري ڊي-اي-بي، 1 پوري ايس-او-
 پي ۽ اڌ پوري يوريا يا 3 پوريون زرخيز (8:23:18)
 پوکيءَ وقت ڏجي، هڪ پوري يوريا گلن نڪرڻ وقت ۽ هڪ کان ٽيڊ پوري يوريا 2 کان 3 چوٽا ڪرڻ بعد ڏيڻ گهرجن.
 پاڻي: شروع ۾ هفتي هفتي ۽ گل ٻائي تي ٽئين چوٽين ڏينهن ڏجي.

مرچ (Chillies)

پوکيءَ جو وقت: بيجارو تيار ڪرڻ: فيبروري، مارچ ۽ جون جولاءِ.
 رونبو: مارچ اپريل ۽ جولاءِ آگسٽ
 ٻج جو مقدار: اڌ ڪلو في ايڪڙ.
 پوکيءَ جو طريقو: ڪريا پوک.

مفاصلو: ڪري کان ڪري جو مفاصلو 3 فوٽ ۽ ٻوٽن جو مفاصلو ٽيڊ فوٽ.
 ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-بي ٽيڊ کان 2 پوريون يوريا اڌ پوري ۽ ايس-او-بي هڪ پوري يا زرخيز (8:23:18) جون 3 پوريون في ايڪڙ پوکيءَ وقت، اڌ پوري يوريا گل نڪرڻ تي، اڌ پوري يوريا

قريون نڪرڻ تي ۽ پوءِ اڌ ٻوري يوريا في ايڪڙ هر ٻن چونڊن بعد ڏجي.
پاڻي: هفتي ڏيڍ جي وقفي سان يا گهرج مطابق.

واڱڻ (Brinjal / Egg plant)



پوکيءَ جو وقت: بگهين جنسن جو ٻيجارو فيبروريءَ ۾، ۽ رونيو اپريل ۾
ڪجي ۽ گول جنسن جو ٻيجارو مئي جون ۽ رونيو جولاءِ آگسٽ ۾ ڪجي.
ٻج جو مقدار: 200 کان 250 گرام في ايڪڙ ٻيجاري لاءِ.
پوکيءَ جو طريقو: ڪريا.

مفاصلو: ڪرين جو مفاصلو 3 فوٽ ۽ ٻوٽن جو مفاصلو 2 فوٽ رکجي.
ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي ڏيڍ کان 2 ٻوريون، يوريا اڌ ٻوري ۽ ايس-او-پي
هڪ ٻوري يا 3 ٻوريون زرخيز (8:23:18) پوکيءَ وقت، باقي سوا
ٻوري يوريا گل نڪرڻ تي ۽ سوا ٻوري يوريا مال لڳڻ تي ڏجي.

پاڻي: پهريون پاڻي ٽنن چوٿين ڏينهن ۽ بعد ۾ موسم ۽ فصل جي حالت کي نظر ۾ رکندي 8 کان 10
ڏينهن جي وقفي سان ڏيڻ گهرجي.

گوار (Cluster bean)

پوکيءَ جو وقت: فيبروري کان مارچ ۽ جولاءِ کان آگسٽ.
ٻج جو مقدار: 2 کان 3 ڪلوگرام في ايڪڙ.

پوکيءَ جو طريقو: ناڙي ۽ ڪريا.

مفاصلو: قطار کان قطار ۽ ڪرڻي کان ڪرڻي جو مفاصلو 3 فوٽ.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان 2 ٻوريون، يوريا هڪ ٻوري ۽ پوٽاش هڪ ٻوري يا زرخيز
(8:23:18) جون 3 ٻوريون في ايڪڙ پوکيءَ وقت باقي هڪ ٻوري يوريا ٻه دفعا پندرهن پندرهن
ڏينهن ڏجي.

پاڻي: 10 کان 15 ڏينهن جي وقفي سان يا فصل جي گهرج مطابق ڏجي.





ميهيا (Indian Squash)

پوکيءَ جو وقت: فيبروري کان مارچ ۽ جولاءِ کان آگسٽ
بچ جو مقدار: ٻه کان اڍائي ڪلو گرام في ايڪڙ ٿجي.
پوکيءَ جو طريقو: ويڪرن ڪرين (بئن) تي ڪجي جنهن لاءِ 4 کان 6 فوٽ ويڪرا ڪريا (بنا) تيار ڪجن ۽ ٻوٽن جو مفاصلو ٽيڊ کان 2 فوٽ رکجي.

ڪيميائي پاڻ: ٽيڊ ٻوري ڊي-اي-پي، اڌ ٻوري يوريا ۽ هڪ ٻوري ايس-او-پي يا 3 ٻوريون زرخيز (8:23:18) في ايڪڙ پوکيءَ وقت، باقي اڌ ٻوري يوريا گلن اچڻ تي ۽ باقي اڌ اڌ ٻوري يوريا في ايڪڙ هر ٽن کان چئن چونڊن بعد ضرورت مطابق ڏيو رهي.
پاڻي: هفتي ٽيڊ جي وقفي سان يا فصل جي گهرج مطابق ٿجي.

ڪريلا (Bitter gourd)



پوکيءَ جو وقت: فيبروري کان مارچ ۽ جون کان جولاءِ
بچ جو مقدار: 3 کان ساڍا 3 ڪلو گرام في ايڪڙ ٿجي.
پوکيءَ جو طريقو: ويڪرن ڪرين (بئن) تي ڪجي جنهن لاءِ مفاصلو هڪ کان ٽيڊ فوٽ رکجي.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان ٽيڊ ٻوري يوريا اڌ ٻوري ۽ ايس-او-پي هڪ ٻوري يا 3 ٻوريون زرخيز (8:23:18) في ايڪڙ پوکيءَ وقت، باقي هڪ ٻوري يوريا گل اچڻ تي ۽ هڪ ٻوري يوريا هر ٽن چونڊن بعد ڏيڻ گهرجي.
پاڻي: هفتي ٽيڊ جي وقفي سان يا گهرج مطابق ٿجي.

ديسي توري (Ridged gourd)

گيه توري (Luffa gourd)



پوکيءَ جو وقت: فيبروري کان مارچ ۽ جون کان جولاءِ
بچ جو مقدار: ٻه کان اڍائي ڪلو گرام في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي.
پوکيءَ جو طريقو: 6 کان 8 فوٽن جا ويڪرا ڪريا (بئن) تيار ڪري ٻوٽن جو مفاصلو 2 فوٽ رکجي.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي ٽيڊ ٻوري. ايس-او-پي هڪ ٻوري ۽ اڌ ٻوري يوريا في ايڪڙ پوکيءَ وقت، باقي اڌ ٻوري يوريا گل اچڻ تي ٿجي ۽ بعد ۾ يوريا هر ٻن کان ٽن چونڊن بعد ضرورت مطابق ڏيڻ گهرجي.
پاڻي: هفتي ٽيڊ جي وقفي سان يا فصل جي گهرج مطابق ٿجي



ڪڍو (Bottle gourd)

پوکيءَ جو وقت: نومبر کان مارچ
 بچ جو مقدار: 2 کان 2 1/2 ڪلوگرام في ايڪڙ
 پوکيءَ جو طريقو: ويڪرن ڪرين (بئن) تي.
 مفاصلو: ڪرين جو مفاصلو 8 کان 12 فوٽ ۽ ٻوٽن جو مفاصلو 2 فوٽ.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي ٿيڊ ٻوري کان ٻه ٻوريون، يوريا اڌ ٻوري ۽ ايس-او-پي هڪ ٻوري في ايڪڙ پوکيءَ وقت، باقي هڪ ٻوري يوريا گلن نڪرڻ وقت ۽ ميوو ٺهڻ وقت ٿيڻ گهرجي.
 پاڻي: هفتي هفتي جي وقفي سان يا فصل جي گهرج مطابق ڏجي.



گدرو (Musk melon)

پوکيءَ جو وقت: جنوري کان فيبروري ۽ جون کان جولاءِ
 بچ جو مقدار: 2 ڪلوگرام في ايڪڙ ڏجي.
 پوکيءَ جو طريقو: ويڪرن ڪرين (بئن) تي.
 مفاصلو: 6 فوٽ ويڪرا ڪريا (بنا) ۽ ٻوٽن جو مفاصلو ٿيڊ کان ٻه فوٽ.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان ٻه ٻوريون، يوريا هڪ ٻوري ۽ پوٽاش هڪ ٻوري يا 3 ٻوريون زرخيز (8:23:18) في ايڪڙ پوکيءَ وقت، باقي هڪ ٻوري يوريا ٻه دفعا پندرهن پندرهن ڏينهن ڏجي.
 پاڻي: 10 کان 15 ڏينهن جي وقفي سان ڏجي.



چانهيون (Water melon)

پوکيءَ جو وقت: فيبروري کان جولاءِ.
 بچ جو مقدار: 2 ڪلوگرام في ايڪڙ.
 پوکيءَ جو طريقو: ويڪرن ڪرين (بئن) تي.
 مفاصلو: 6 فوٽ ويڪرا ڪريا (بنا) ۽ ٻوٽن جو مفاصلو ٿيڊ کان 2 فوٽ.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان ٻه ٻوريون، يوريا هڪ ٻوري ۽ پوٽاش هڪ ٻوري يا 3 ٻوريون زرخيز (8:23:18) في ايڪڙ پوکيءَ وقت، باقي هڪ ٻوري يوريا ٻه دفعا پندرهن پندرهن ڏينهن ڏجي.
 پاڻي: 10 کان 15 ڏينهن جي وقفي سان يا فصل جي گهرج مطابق ڏجي.



ڪيرا (Cucumber)

پوکيءَ جو وقت: فيبروري کان مارچ ۽ جون کان جولاءِ.
 بچ جو مقدار: 2 ڪلوگرام في ايڪڙ.
 پوکيءَ جو طريقو: ڪريا (بئن) تي.
 مفاصلو: ڪرين جو مفاصلو 2 کان 2 1/2 ميٽر ۽ ٻوٽن جو مفاصلو هڪ فوٽ.
 ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي ٿيڊ ٻوري، يوريا اڌ ٻوري ۽ ايس-او-پي هڪ ٻوري يا 3 ٻوريون زرخيز (8:23:18) في ايڪڙ پوکيءَ وقت، هڪ ٻوري يوريا گل نڪرڻ تي ۽ باقي يوريا مٺي مٺي ٻوري هر چوٽي بعد ڏجي.
 پاڻي: هفتي ڏيڊ جي وقفي سان يا فصل جي گهرج مطابق ڏجي.



تڪڙا، بعد ۾ ڏهين، ڏينهن ضرورت

melon)

فيبروري.

ڪلوگرام في ايڪڙ

پوکيءَ جو وقت: ڪرين (ٻنن) تي هڪ هڪ فوٽ جي مفاصلي تي چنڪيون هڻجن.

ڪيميائي پالڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان ٻه ٻوريون، يوريا هڪ ٻوري ۽ پوئش هڪ ٻوري يا 3 ٻوريون زرخيز (8:23:18) في ايڪڙ پوکيءَ وقت، باقي هڪ ٻوري يوريا ٻه دفعا پندرهن پندرهن ڏينهن ڏجي.

پاڻي: هفتي ڏيڍ جي وقفي سان ضرورت مطابق ڏجي.



ونگا (long)

پوکيءَ جو وقت: جنوري کان ٻچ جو مقدار: هڪ کان ڏيڍ

پوکيءَ جو طريقو: 4 کان 5 فوٽن جي ويڪرن ڪرين (ٻنن) تي هڪ هڪ فوٽ جي مفاصلي تي چنڪيون هڻجن.

ڪيميائي پالڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان ٻه ٻوريون، يوريا هڪ ٻوري ۽ پوئش هڪ ٻوري يا 3 ٻوريون زرخيز (8:23:18) في ايڪڙ پوکيءَ وقت، باقي هڪ ٻوري يوريا ٻه دفعا پندرهن پندرهن ڏينهن ڏجي.

پاڻي: هفتي ڏيڍ جي وقفي سان ضرورت مطابق ڏجي.

سني يا درڪ (Ginger)

پوکيءَ جو وقت: مارچ کان اپريل.

ٻچ جو مقدار: 10 کان 12 مڻ ڳنڍيون في ايڪڙ.

پوکيءَ جو طريقو: ڪريا.

مفاصلو: ڪري کان ڪري جو مفاصلو ڏيڍ فوٽ ۽ 6 انچ ٻوٽي کان ٻوٽي جو مفاصلو.

ڪيميائي پالڻ: 3 کان 3 1/2 ٻوريون ڊي-اي-پي، يوريا اڌ ٻوري ۽ ايس-او-پي هڪ ٻوري يا 3 ٻوريون زرخيز (8:23:18) في ايڪڙ پوکيءَ وقت پوءِ جولاءِ ۾ هر گڏ کان پوءِ هڪ ٻوري يوريا ڏيڻ گهرجي. فصل کي گهٽ ۾ گهٽ 4 گڏون ڏيڻ گهرجن.

پاڻي: پوکيءَ کان پوءِ به ٽي تڪڙا پاڻي ڏجن بعد ۾ هر هفتي گهرج مطابق ڏيڻ گهرجي.



هيڊ (Turmeric)

پوکيءَ جو وقت: مارچ کان اپريل.

ٻچ جو مقدار: 15 کان 17 مڻ ڳڙيون في ايڪڙ.


پوکيءَ جو طريقو: ڪريا.

مفاصلو: ڪري کان ڪري جو مفاصلو ڏيڍ فوٽ ۽ 6 انچ ٻوٽي کان ٻوٽي جو مفاصلو.

ڪيميائي پالڻ: 3 کان 3 1/2 ٻوريون ڊي-اي-پي، يوريا اڌ ٻوري ۽ ايس-او-پي هڪ ٻوري يا 3 ٻوريون زرخيز (8:23:18) في ايڪڙ پوکيءَ وقت پوءِ جولاءِ ۾ هر گڏ کان پوءِ هڪ ٻوري يوريا ڏيڻ گهرجي. فصل کي گهٽ ۾ گهٽ 4 گڏون ڏيڻ گهرجن.

پاڻي: شروعات ۾ به ٽي تڪڙا پاڻي ڏجن، بعد ۾ هر هفتي فصل جي ضرورت مطابق ڏيڻ گهرجي.

خريف جي پاڇين جا جيت ۽ انهن جو ضابطو

فصل	جيت	تدارڪ
ڪريلا، چانهيون، ميهه، گدرا، ڪڍو، ڪيرا، ونگا وغيره	ميووي جي مک (Fruit fly) 	ڊپٽريڪس 400 کان 500 گرام 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي ڦهاريو ڪريو يا ٽراءِ ڪلورفون 80 ايس بي 680 گرام في ايڪڙ فصل ۾ ميووي اڇڻ تي ڦهاريو ڪجي.
مرچ، گجرون وغيره	سسٽ مهلو (Aphid) 	پلنيم 80 گرام يا اميدا 60 سي سي يا ايڪٽارا 24 گرام يا ايدوانٽيج 200 سي سي في 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي ڦهاريو ڪجي.
ڪيرا، مرچ، چانهيون، گدرا، پينڊيون، واڱڻ وغيره	اڇي مک (White fly) 	پلنيم 80 گرام يا مونٽو 125 ملي لٽر يا پائريٿروڪسيڦين 120 ملي لٽر في 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي ڦهاريو ڪجي.
ڪڍو، گدرا، چانهيون وغيره	سرنگهه ٺاهڻ وارو ڪينٽون (Leaf minor) 	ٽراءِ گارڊ 30 گرام يا بيلٽافاس 500 ملي لٽر في 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي ڦهاريو ڪريو
ڪيرا، مرچ، چانهيون، گدرا، پينڊيون، واڱڻ وغيره	سانو مهلو (Jassid) 	ناڪ آئوٽ يا نانٽي پائرم 100 گرام يا پولو 180 کان 200 ملي لٽر في 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي ڦهاريو ڪريو. (پر ولين وارين پاڇين تي پولو استعمال نه ڪجي)
چانهيون، ميهه، گدرا، ڪڍو،	جون (Mites) 	اوبيران 100 ملي لٽر يا پائريڊين 200 سي سي يا پولو 180 کان 200 ملي لٽر في 100 لٽر

پاڻي ۾ ملائي ڦوهارو ڪجي. (پر ولين وارين پاڇين تي ڀولو استعمال نه ڪجي).		مرچ، پينڊيون، واڱڻ، گجرون وغيره
ڪيور اڪران 400 سي سي يا ڪلور فينيٽر 100 سي سي سي في 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي ڦوهارو ڪجي.	بصرن ۽ ٿوم جو ٿرڙو (Thirps) 	گجرون، واڱڻ، وغيره
ووليم فليڪس 80 سي سي يا بيلٽ 2 کان 3 سي سي يا اسٽيورڊ 175 سي سي يا ٽريسر 40 سي سي في 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي ڦوهارو ڪجي.	آمريڪين ڪينٽون، چٽڪرو ڪينٽون، مٿر جو ڪينٽون، لشڪري ڪينٽون 	ڪريلا، پينڊيون، ڪڍو، توريون، گجرون وغيره
ڪرائي 60 سي سي يا ايڪٽار 24 گرام يا اميڊا 60 سي سي سي في 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي ڦوهارو ڪريو.	گاڙهي تنڊي 	ميها، ڪريلا، توريون، ڪڍو، گدرو، چانهيون، ونگا وغيره
لارسيبن يا ڊيلٽافاس 500 ملي لٽر 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي ڦوهارو ڪريو يا ڪرائي 400 ملي لٽر في ايڪڙ ڏيو.	چور ڪينٽون 	پينڊيون، مرچ، لاهوري گجرون وغيره
ڪرائي يا بيسس 300 کان 400 ملي لٽر پاڻي ۾ ملائي ڦوهارو ڪجي.	پٺاڻي جو پوپٽ 	واڱڻ وغيره



ربيع جون پاڇيون

Rabi Vegetables

ڪيميائي پاڻن لاءِ مشورو:

جيئن ته زمينون مختلف قسمن جون ٿين ٿيون. جهڙوڪ؛ وارياسيون، لٽياسيون، پڪيون، ڪلر وغيره واريون. ان ڪري هر قسم جي زمين لاءِ پاڻ مختلف قسم جو مختلف وزن ۾ ڏيڻو هوندو آهي جنهن لاءِ زمين جي مٽي ليبارٽريءَ مان چڪاس ڪرائڻي هوندي آهي ته جيئن پتو پوي ته زمين ڪهڙي قسم جي آهي. ۽ ان کي ڪهڙو پاڻ ۽ ڪيترو ڏيڻ گهرجي. ليبارٽريون زراعت کاتي حڪومت سنڌ پاران گهڻو ڪري هر ضلعي اندر قائم ٿيل آهي. جيڪي معمولي في وصول ڪرڻ سان مٽي چڪاس ڪري ڏين ٿيون. ڪافي جاين تي اهو ڏٺو ويو آهي ته ڪلارائين ۽ پڪين زمينن ۾ به آبادگار ڊي-اي-پي پاڻ ڏين ٿا. جڏهن ته اهڙين زمينن ۾ ڊي-اي-پي پاڻ منع ٿيل آهي. جنهن جي جاءِ تي ايس-ايس-پي يا ٽي-ايس-پي وغيره ڏيڻو آهي. ان ڪري جتي پاڇيون پوکڻيون هجن اتي جي پهريان ليبارٽريءَ مان مٽي چڪاس ڪرائجي.

ڪيميائي پاڻ ڏيڻ جي لاءِ ان ڳالهه جو به خاص خيال رکجي ته پاڻ ڇڏي ڇڏي نه ٿجي پر پاڻ ڏئي مٿان هڪدم پاڻي ڏيڻ گهرجي.

ڪيميائي پاڻ ڪوشش ڪري پوئڻ جي پاڙن وٽ ڏيڻ گهرجي. سڄي زمين ۾ ڇڻڻ سان هڪ ته پاڇيءَ وارن پوئڻ کي پاڻ گهٽ ملي ٿو ۽ خالي زمين ۾ وڃي ڪري ٿو. جنهن جي ڪري پاڻ زيان به ٿئي ٿو ۽ زمين جي خالي جاين تي پاڻ پوڻ سان ڪنگاهه گهڻو زور وٺي وڃي ٿو.

زمين جي چونڊ ۽ تياريءَ لاءِ مشورو:

پاڇين جي پوکيءَ لاءِ ڪوشش ڪري نرم لٽياسي زمين جي چونڊ ڪجي ته جيئن پاڇيون پليون ٿين. تياريءَ ۾ خاص طور تي زمين جي سنوٽ ۽ اونهن هرن ڏيڻ تي خاص ڌيان ڏيڻ گهرجي. زمين جي سنوٽ لاءِ جيڪڏهن سهولت موجود هجي ته ليزر ليولنگ مشين استعمال ڪجي.

بج سيڪ تي هٽڻ جو مشورو:

بج جون چنگيون يا بيجاري جو روڻو ڪرين کي پهريان پاڻي ڏئي جتي سيڪ هجي اتي هٽڻ گهرجي. سيڪ تي پوکيل پاڇي جلد ڦٽي ٿي ۽ تيار به ٿڪڙي ٿئي ٿي.

چيزل پلو هٽڻ جو مشورو:

عام طور تي زمين اندر سخت تهه جڙي پوي ٿو. جنهن جي ڪري پيداوار گهٽ لهي ٿي. ان ڪري سخت تهه کي ٽوڙڻ لاءِ ضروري آهي ته هر ٽئين سال زمين ۾ چيزل پلو ضرور هٽڻ گهرجي. چيزل پلو هٽڻ سان نه صرف زمين اندر جڙيل سخت تهه ٽٽي پوي ٿو پر ساڳئي وقت چيزل پلو جي اها به خاصيت آهي ته اهو زمين اندر راجا ۽ بسڪ پلو کان گهڻو اونهو به وڃي ٿو ۽ زمين کي اٿلائي به بلڪل نٿو ۽ زمين جو مٿيون طاقت وارو تهه به پنهنجي جاءِ تي برقرار رهي ٿو.

وڻاڻ جي پاڻ ڏيڻ جو مشورو:

سنڌ جي زمينن ۾ هڪ سيڪڙو کان به نامياتي مادو گهٽ آهي. جيڪو زمينن مان سٺي پيداوار ڪڍڻ لاءِ بلڪل ناڪافي آهي جنهن کي وڻاڻن لاءِ ضروري آهي ته زمينن کي هر ٽئين سال وڻاڻ جو ڳريل سڙيل پاڻ ضرور ڏيڻ گهرجي. وڻاڻ جو پاڻ پاڇين پوکڻ کان پهرين زمين ۾ 150 کان 200 مٿ في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي. پاڻ ڏيڻ وقت ان جي ڳريل سڙيل هجڻ جي پڪ ضرور ڪرڻ گهرجي. فصل ۾

تازو وٽاڻ جو پاڻ هرگز نه وجهڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته هڪ طرف وٽاڻ جي تازي پاڻ م زمين کي سڌارڻ واري گهريل طاقت ناهي هوندي ۽ ٻئي طرف ان ۾ گندگانهه جا بچ موجود هوندا آهن. ان کان علاوه ڪچو پاڻ زمين ۾ وجهي پاڇيون پوکڻ سان پاڇين کي اڏوھي لڳي ٿي ۽ پاڇين جي فصل ۾ نقصان ٿئي ٿو. وٽاڻ جو پاڻ پاڇيون پوکڻ کان هڪ مهينو پهرين زمين ۾ وجهي هڪدم هرن ذريعي ملائي مٿان پاڻي ڏيڻ گهرجي. پاڻي ڏيڻ کان پوءِ جڏهن زمين وٽ ۾ اچي ته هر ڏئي وري ريج ڪجي ۽ ٻيهر جڏهن زمين وٽ ۾ اچي ته هر ڏئي زمين کي تيار ڪجي.

پاڇين ۾ پاڻ ۽ پاڻيءَ جي استعمال لاءِ مشورا:

1. پاڻ هميشه ماڪ سڪڻ کان پوءِ پر ٿڌ واري وقت تي ڏجي.
2. پاڻ اهڙي طرح سان ڏجي جيئن پاڻ پاڇيءَ جي پاڙن جي ڀر ۾ ڪري.
3. پاڻ ڏيڻ کانپوءِ پاڻي ڏيڻ ۾ دير هرگز نه ڪجي بلڪه هڪدم پاڻي ڏجي.
4. بچيل پاڻ کي کليل ۽ گهم واري حالت ۾ نه رکجي پر چڱيءَ طرح ٻڌي يا دٻي ۾ بند ڪري خشڪ جاءِ تي رکجي.
5. پاڻي پاڇين کي گهڻو هرگز نه ڏجي ۽ خاص طور تي ڪرين تي پوکيل پاڇين ۾ پاڻي اهڙي طرح ڏجي جيئن چنگين يا لڳل ٻوٽن تائين صرف سيڪ ٻهجي پر اهي پاڻيءَ ۾ هرگز نه ٻڌن، ڇاڪاڻ ته سيڪ واري پاڇي تمام گهڻي سٺي ٿئي ٿي.
6. سڀني پاڇين کي پوکيءَ کان پوءِ به ٽي پاڻي تڪڙا تڪڙا ڏيڻ گهرجن.
7. هر پاڇيءَ کي ٻڌايل پاڻيءَ جي وقفي کان علاوه موسم ۽ فصل جي حالت کي به نظر ۾ رکجي.



بيجارو پوکڻ لاءِ مشورو:

بيجارو رستي پوکجندڙ پاڇين جهڙوڪ؛ مرچن، واڱڻن، بصرن، گوبي ٿمائن وغيره جي بيجاري تيار ڪرڻ لاءِ هيٺئين طريقي کي اختيار ڪجي:

بيجارو بگهين اپين پٿرين جي شڪل وارين ٻارين ۾ پوکجي. اهڙين ٻارين ۾ لت واري مٽي وجهي زمين جي سطح کان مٿي ڪري وچ مان اهڙي طرح ناليون ڪڍجن ته جيئن جيڪڏهن پاڻي ڪنهن به سبب جي ڪري گهڻو ٿي وڃي ته اهو نالين ۾ وهي وڃي. ۽ بيجارو گهڻي پاڻيءَ جي ڪري سڙي نه. ان کان پوءِ ڪڪ پڻ ۽ ٻيو گند ڪڍرو ساڙي خاڪ تيار ڪجي اها چار (خاڪ) جڏهن ٿري وڃي ته جنهن به پاڇيءَ جو بيجارو پوکڻو هجي ان جو بچ لت واري مٽيءَ تي چڻي مٿان خاڪ ايتري وجهجي جيئن بچ چڱيءَ طرح ڍڪجي وڃي. ۽ ڍڪيل بچ کي هٿ واري ڦوهاري سان پاڻيءَ جو ڦوهارو ڪري مٿان ڪڪن يا سارين جي پلال سان ڍڪي ڇڏجي. جنهن بعد روزانو ڪڪن جي مٿان هٿ واري ڦوهاري سان تيسٽائين پاڻيءَ جو ڦوهارو ڪجي جيستائين بچ مڪمل ڦٽي وڃي. جنهن بعد پاڻيءَ جو ٻني نئين ڏينهن ڦوهارو ڪبو رهجي ۽ جڏهن بيجارو وڏو ٿي وڃي ته ڪڪ ڪانا هٽائي ڇڏجن.

ربيع جي پاڇين جون فصلوار سفارشون

مٿر (Peas):

پوکيءَ جو وقت: آڪٽوبر کان نومبر.
جنسون: پرلي، سونيڪس، پي ايف 400، شيرين.
بچ جو مقدار: 15 کان 20 ڪلو گرام.
پوکيءَ جو طريقو: ننڍي قد وارين جنسن جون چئن فوٽن جي ويڪرن ڪرين تي اڍائي کان ٽن انچن جي مفاصلي تي چنگيون هڻجن.
وڏي قد ۽ وچولي قد وارين جنسن جون چئن فوٽن جي ويڪرن ڪرين تي ٻن کان ٽن انچن جي مفاصلي تي چنگين ذريعي پوکجي.
ڪيميائي پالڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان ٽيڊ ٻوري، يوريا هڪ ٻوري ۽ پوٽاش هڪ کان ٻه ٻوريون في ايڪڙ پوکيءَ وقت ۽ بعد ۾ به ٻيرا هڪ هڪ يوريا هر پندرهن ڏينهن يا اين-پي-ڪي (17:17:17)

جون 3 ٻوريون في ايڪڙ. هڪ ٻوري اين-ٻي-ڪي پوکيءَ وقت ٻي ٻوري اين-ٻي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا پوکيءَ جي 15 ڏينهن ۽ ٽين ٻوري اين-ٻي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا في ايڪڙ مهيني بعد ڏجي. هفتي هفتي ضرورت مطابق ڏجي.

ٽماٽا (Tomato):

پوکيءَ جو وقت: ٻجگارو جون کان جولاءِ يا آگسٽ ۾ پوکجي رونبو آگسٽ کان سيپٽمبر تائين ڪجي. جنسون: روما، ايس آرٽوئي 10 وڪڙي لانگ سپر ميني ميڪر، مارگلوب، گرنتا، رنڪرس وغيره.

ٻج جو مقدار: 200 کان 250 گرام في ايڪڙ. پوکيءَ جو طريقو: 6 کان 8 فوٽن جي ويڪرن ڪرين تي هڪ کان ٻن فوٽن جي مفاصلي تي رونبو ڪجي.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-ٻي هڪ کان ڏيڍ ٻوري، يوريا هڪ ٻوري ۽ پوٽاش هڪ کان ٻه ٻوريون في ايڪڙ پوکيءَ وقت ۽ بعد ۾ ٻه ڀيرا هڪ ٻوريا هر پندرهن ڏينهن يا اين-ٻي-ڪي (17:17:17) جون 3 ٻوريون في ايڪڙ. هڪ ٻوري اين-ٻي-ڪي پوکيءَ وقت ٻي ٻوري اين-ٻي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا پوکيءَ جي 15 ڏينهن ۽ ٽين ٻوري اين-ٻي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا في ايڪڙ مهيني بعد ڏجي. هفتي هفتي ضرورت مطابق ڏجي.



ٻٽا (Potato):

پوکيءَ جو وقت: آڪٽوبر کان نومبر

جنسون: اڇا ٻٽا، ملٽا ۽ پيٽرونس

ٻج جو مقدار: 15 کان 20 مٺ في ايڪڙ.

پوکيءَ جو طريقو: 2 کان اڍائي فوٽن جي ڪرين جي چوٽيءَ تي، 5 کان 6 انچن جي مفاصلي تي لڳائجن.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-ٻي هڪ کان ڏيڍ ٻوري، يوريا هڪ ٻوري ۽ پوٽاش هڪ کان ٻه ٻوريون في ايڪڙ پوکيءَ وقت ۽ بعد ۾ ٻه ڀيرا هڪ ٻوري يوريا هر پندرهن ڏينهن يا اين-ٻي-ڪي (17.17.17) جون 3 ٻوريون في ايڪڙ، هڪ ٻوري اين-ٻي-ڪي پوکيءَ وقت ٻي ٻوري اين-ٻي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا پوکيءَ جي 15 ڏينهن ۽ ٽين ٻوري اين-ٻي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا في ايڪڙ مهيني بعد ڏجي. پاڻي: پهريون پوکيءَ وقت هڪدم ٽجي باقي هفتي ڏهين ڏينهن ضرورت مطابق ايترو ڏجي جنهن جو چوٽيءَ تي صرف سيڪ بهجي.



ٻٽائي گجرون (Carrot):

پوکيءَ جو وقت: آڳاٽي پوک سيپٽمبر کان آڪٽوبر

مندائتي پوکي: نومبر

جنسون ۽ ٻج جو مقدار: ديسي 5 کان 6 ڪلو ۽ ولانتي 3 کان 4 ڪلو گرام في ايڪڙ.

مفاصلو: ٻوٽا ٽن چئن انچن جا ٿين ته 13 انچن جي مفاصلي تي ڇڏائي ڪجي.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-ٻي هڪ کان ڏيڍ ٻوري يوريا هڪ ٻوري ۽ پوٽاش هڪ کان ٻه ٻوريون في ايڪڙ پوکيءَ وقت ۽ بعد ۾ ٻه ڀيرا هڪ ٻوريا هر پندرهن ڏينهن يا اين-ٻي-ڪي (17.17.17) جون 3 ٻوريون في ايڪڙ، هڪ ٻوري اين-ٻي-ڪي پوکيءَ وقت ٻي ٻوري اين-ٻي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا پوکيءَ جي 15 ڏينهن ۽ ٽين ٻوري اين-ٻي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا في ايڪڙ مهيني بعد ڏجي.

پاڻي: آڳاٽي فصل کي پهريان ئي چار پاڻي هر هفتي بعد ۽ ٽئين ۾ ڏهين کان ٻارهيون ڏينهن بعد پاڻي ڏجي.

بسر (Onion):



پوکيءَ جو وقت: اڳاٽي فصل لاءِ بيجارو جولاءِ کان آگسٽ تائين لڳائجي ۽ رونبو آگسٽ کان سيپٽمبر ۾ ڪجي ۽ پاڇائي پوکي جنوري تائين ڪري سگهجي ٿي.
جنسون: هزارِي، ڦلڪارا، ٿاڻو بولا خان، نصرپوري، گهوٽڪي ۽ ديسي وغيره.
بج جو مقدار: ڪٺ به کان اڍائي ڪلو گرام في ايڪڙ.
پوکيءَ جو طريقو: ٻه کان اڍائي فوٽن جي مفاصلي وارن ڪرين جي ٻنهي پاسي ٻن کان ٽن انچن جي مفاصلي تي بيجارو رونبو ڪجي.

ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان ٽيڊ پوري، يوريا هڪ پوري ۽ پوٽاش هڪ کان ٻه پوريون في ايڪڙ پوکيءَ وقت ۽ بعد ۾ ٻه ڀيرا هڪ هڪ پوري يوريا هر پندرهن ڏينهن يا اين-پي-ڪي (17.17.17) جون 3 پوريون في ايڪڙ، هڪ پوري اين-پي ڪي پوکيءَ وقت ٻي پوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ پوري يوريا پوکيءَ جي 15 ڏينهن ۽ ٽين پوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ پوري يوريا في ايڪڙ مهيني بعد ڏجي.



پاڻي: شروعاتي 3 پاڻي هفتي هفتي بعد پوءِ ڏهين کان ٻارهين ڏينهن بعد ڏيڻ گهرجي.
گڏ ۽ مٽي ڇاڙهڻ: گندگاهه جيئن نظر اچي ته گڏ ڪري گندگاهه جي صفائي ڪجي ۽ پوئڻ تي ٻه ڀيرا مٽي ڇاڙهجي.

ٿوم (GARLIC):

پوکيءَ جو وقت: اڳاٽي پوکي سيپٽمبر کان شروع ڪجي ۽ ختم نومبر جي آخر ۾ ڪجي.
جنسون: ديسي نيو دمبالو.

بج جو مقدار: 100 ڪلوگرام في ايڪڙ.
پوکيءَ جو طريقو: ننڍين ٻارين ۾ اڌ فوٽ جي مفاصلي تي قطارن ۾ ٽن ٽن انچن جي مفاصلي تي ڳڙيون رونبو ڪجن. جڏهن ته ڪرين تي به پوکي ڪري سگهجي ٿي.
ڪيميائي پاڻ: ڊي-اي-پي هڪ کان ٽيڊ پوري، يوريا هڪ پوري ۽ پوٽاش هڪ کان ٻه پوريون في ايڪڙ پوکيءَ وقت ۽ بعد ۾ ٻه ڀيرا هڪ هڪ پوري يوريا هر پندرهن ڏينهن يا اين-پي-ڪي (17.17.17) جون 3 پوريون في ايڪڙ، هڪ پوري اين-پي-ڪي پوکيءَ وقت ٻي پوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ پوري يوريا پوکيءَ جي 15 ڏينهن ۽ ٽين پوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ پوري يوريا في ايڪڙ مهيني بعد ڏجي.

پاڻي: شروعاتي ٻه ٽي پاڻي ٽڪڙا ڏجن ته جيئن ڳڙيون ڦٽن. جنهن بعد گرميءَ ۾ اين-پي-ڪي هفتي هفتي بعد ۽ سرديءَ ۾ ڏهين کان ٻارهين ڏينهن بعد ڏيڻ گهرجي.

پالڪ (SPINACH/ CHARD):



پوکيءَ جو وقت: ديسي پالڪ آڪٽوبر کان جنوري تائين پوکجي پر ولايتي پالڪ ان سان گڏ سائوٿيءَ ۾ پوکي وڃي ٿي.
جنسون: ديسي پالڪ نرم ۽ سنهن پنن واري ۽ ولايتي پالڪ سخت ۽ وڏن پنن واري.

بج جو مقدار: 15 کان 20 ڪلو گرام في ايڪڙ
پوکيءَ جو طريقو: ننڍين ٻارين ۾ قطارن جي شڪل ۾ پوکجي پر ساڳئي وقت ننڍن ڪرين تي پوکي سگهجي ٿي.

ڪيميائي پاڻ: پوکيءَ وقت اين-پي-ڪي (17.17.17) هڪ پوري. ٻي پوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ پوري يوريا 15 ڏينهن بعد، ٽين پوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ پوري يوريا مهيني بعد ڏجي. ان کان پوءِ هر لوب کان پوءِ هڪ پوري يوريا في ايڪڙ وجهجي.
پاڻي: گرميءَ ۾ هر هفتي بعد ۽ ٿڌ ۾ ٻارهين کان پندرهن ڏينهن بعد ڏيڻ گهرجي.

بند گوبي (CABBAGE):

پوکيءَ جو وقت: منڊائتي پوکي لاءِ بيجارو سيپٽمبر-آڪٽوبر ۾ ۽ رونبو آڪٽوبر- نومبر ۾ ڪجي. جڏهن ته پاڇائي پوکيءَ لاءِ بيجارو نومبر ۾ ۽ رونبو ڊسمبر ۾ ڪجي. بچ جو مقدار: 100 کان 400 گرام في ايڪڙ.



ڪيميائي پلڻ: اين-پي-ڪي هڪ کان ٽيڊ هوري ۽ پوئاش هڪ کان ٻه هوريون في ايڪڙ پوکيءَ وقت ۽ بعد ۾ ٻه ڀيرا هڪ هڪ هوري يوريا هر پندرهن ڏينهن يا اين-پي-ڪي (17.17.17) جون 3 هوريون في ايڪڙ. هڪ هوري اين-پي-ڪي پوکيءَ وقت ٻي هوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ هوري يوريا پوکيءَ جي 15 ڏينهن ۽ ٽين هوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ هوري يوريا في ايڪڙ مهيني بعد ٿجي.

گڏ ۽ پائي: گڏ جڏهن رونبي کان پوءِ ٻوٽا چڱي طرح لڳي وڃن ته ڪجي ۽ ٻوٽن تي هلڪي مٽي چاڙهجي. اهڙي طرح پندرهن ڏينهن ٻي گڏ ڪري وري مٽي چاڙهجي پائي شروع ۾ ٻه ٽي ٽڪڙا ڏجن. ان بعد سردِي ۾ ڏهين کان پندرهن ڏينهن ۽ گرمي ۾ هر هفتي پائي ۾ پائي ٿجي.

هربو (FENUGREEK):

پوکيءَ جو وقت: منڊائتي پوکي سيپٽمبر کان نومبر تائين پر جنوريءَ تائين لڳائي سگهجي ٿو. جنسون: ديسي ۽ قصوري

بچ جو مقدار: 6 کان 8 ڪلو گرام في ايڪڙ

پوکيءَ جو طريقو: ننڍيون چورس ٻاريون ٺاهي، انهن ۾ ريج ڪري مٿان پائيءَ ۾ بچ چٽي چڻجي. ڪيميائي پلڻ: پوکيءَ وقت اين-پي-ڪي (17.17.17) هڪ هوري في ايڪڙ. ٻي هوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ هوري يوريا 15 ڏينهن بعد ۽ ٽين هوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ هوري يوريا مهيني بعد ٿجي. ان کان پوءِ هر لوب کان پوءِ هڪ هوري يوريا في ايڪڙ ٿجي. پائي: گرميءَ ۾ هر هفتي بعد ۽ ٿڌ ۾ ٻارهن کان پندرهن ڏينهن بعد پائي ڏيڻ گهرجي.



سلاد (LETTUCE):

پوکيءَ جو وقت: سيپٽمبر کان نومبر تائين

پوکيءَ جو طريقو: ٻن کان اڍائي فوٽن جا ڪريا ڪڍي ڪرين جي ٻنهي پاسي 9 انچن جي مفاصلي تي چنگيون هڻي ڪرين کي ايترو پائي ڏجي جيئن چنگين تائين صرف پائيءَ جو سيڪ پهچي.

ڪيميائي پلڻ: پوکيءَ وقت اين-پي-ڪي (17.17.17) هڪ هوري في ايڪڙ. ٻي هوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ هوري يوريا 15 ڏينهن بعد ۽ ٽين هوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ هوري يوريا مهيني بعد ٿجي. ان کان پوءِ هر لوب کان پوءِ هڪ هوري يوريا في ايڪڙ ٿجي. پائي: گرميءَ ۾ هفتي هفتي بعد ۽ سردِيءَ ۾ ٻارهن کان پندرهن ڏينهن بعد پائي ٿجي.



ڏاٽا (CORIANDER):

پوکيءَ جو وقت: منڊائتي پوک سيپٽمبر کان آڪٽوبر تائين تجويز ٿيل آهي. باقي سڄو سال پوکجڻ ٿا.

جنسون: ايراني ۽ ديسي.

بچ جو مقدار: 6 کان 8 ڪلو گرام في ايڪڙ

پوکيءَ جو طريقو: ٻن اڍائين فوٽن جي ڪرين تي ٻنهي پاسن کان ليڪ ڪڍي ان ۾ بچ چٽي. مٿان هٿ سان ڍڪي. سيڪ جيترو پائي ٿجي. اهڙي طرح ناڙي به ڪري سگهجي ٿي. بچ کي

سڄي رات ٿڌائي رکجي ۽ پوءِ پوکجي.
ڪيميائي پاڻ: پوکيءَ وقت اين-پي-ڪي (17.17.17) هڪ ٻوري في ايڪڙ. ٻي ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا 15 ڏينهن بعد ۽ ٽين ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا مهيني بعد ڏجي. ان کان پوءِ هر لوب کان پوءِ هڪ ٻوري يوريا في ايڪڙ ڏجي.
پاڻي: گرميءَ ۾ هر هفتي بعد ۽ سرديءَ ۾ ٻارهي کان پندرهن ڏينهن بعد پاڻي ڏيڻ گهرجي.

سُونف (وڌڻ) (FENNEL):

پوکيءَ جو وقت: 15 آڪٽوبر کان نومبر جو سڄو مهينو
ٻج جو مقدار: 5 ڪلو گرام في ايڪڙ
پوکيءَ جو طريقو: ڏيڍ کان ٻن فوٽن جي مفاصلي تي قطارن ۾ پوکجي.
ڪيميائي پاڻ: پوکيءَ وقت اين-پي-ڪي (17.17.17) هڪ ٻوري في ايڪڙ ۽ ٻي ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا 15 ڏينهن بعد ۽ ٽين ٻوري اين-پي-ڪي ۽ اڌ ٻوري يوريا مهيني بعد ڏجي.
پاڻي: پهريون پاڻي مهيني بعد ۽ ٻيا پاڻي پندرهن کان ويهين ڏينهن بعد ڏجن.



ڦوندو (MINT):

پوکيءَ جو وقت: نومبر کان ڊسمبر ۽ فيبروري کان مارچ.
ٻج جو مقدار: ڦوندو پراڻي پوکيل فصل جون پاڙون ڪڍي پوکجي. ان لاءِ چاليهه هزار کان پنجاهه هزار پاڙون پوکجن.
پوکيءَ جو طريقو: ڪرين تي ۽ قطارن ۾ پوکي سگهجي ٿو.
مفاصلو: ڪريا ڏيڍ فوٽ جا هجن ۽ قطارون هڪ فوٽ تي ڪري پوکجن ۽ ٻوٽي کان ٻوٽي جو مفاصلو 6 انچ رکجي.
ڪيميائي پاڻ: پوکيءَ وقت اين-پي-ڪي هڪ ٻوري في ايڪڙ ۽ بعد ۾ هر لوب کان پوءِ يوريا هڪ ٻوري في ايڪڙ ڏجي.
پاڻي: شروعات ۾ ٻه ٽي پاڻي ٽڪڙا ۽ بعد ۾ هر هفتي بعد فصل جي گهرج مطابق ڏجن.



پاڇين جا جيت، بيماريون ۽ آءِ پي ايم

پاڇين ۾ ٻن قسمن جا جيت ٿين ٿا. هڪڙا نقصانڪار جيت جيڪي پاڇين کي نقصان رسائن ٿا ۽ ٻيا فائديمند جيت ٿين ٿا. جيڪي پاڇين کي پنهنجي خوراڪ نٿا بڻائن پر اُهي نقصانڪار جيتن کي کائي پنهنجو پيٽ ڀرين ٿا. ۽ پاڇين کي نقصانڪار جيتن جي نقصان کان بچائن ٿا. اهڙن فائديمند جيتن ۾ ٽنڊيئون، پنيپوريون، ڏنڀو، ڪورينٽرو وغيره اچي وڃن ٿا.
فائديمند جيتن جي پاڇين ۾ گهڻي تعداد ۾ هئڻ جي صورت ۾ نقصانڪار جيتن جو تعداد گهڻو نٿو وڌي ۽ پيسٽيسائيڊس جي هروڀرو ڦوهارن جي ضرورت پيش نٿي اچي پر اڻڄاڻائي ۽ ٽڪڙي فائدي وٺڻ جي چڪر ۾ پاڇين جا باغبان پاڇي پوکڻ کان پوءِ جيتن تي هڪ اڌ نقصانڪار جيت ڏسن ٿا ته هڪدم پيسٽيسائيڊ يعني زرعي زهر جو ڦوهارو شروع ڪري ڏين ٿا. جنهن سان نقصانڪار جيتن سان گڏ فائديمند جيت مري وڃن ٿا ۽ ڦوهاري جو اثر ختم ٿي مس ٿو ٿئي ته هڪدم ٻيا نقصانڪار جيت ظاهر ٿي پون ٿا.
پاڇين ۾ نقصانڪار جيت عام طور تي ٻن قسمن جا ٿين ٿا. هڪڙا رس چوسڻ وارا جهڙوڪ؛ اڇي مک، ساڻو مهلو، سست مهلو، ٿرڙو وغيره.
اهڙي طرح ٻيا وري پاڇين کي کاڌ وارا جيت جهڙوڪ؛ امريڪي ڪينئون، ٽنڊيون، لشڪري

ڪيٽون وغيره اچي وڃن ٿا. هنن ٻنهي قسمن جي جيتن مان رس چوسڻ وارا جيت ڀاڄين تي شروع ۾ ئي ڀاڄيون جڏهن گهڻيون سايون ۽ نرم هجن ٿيون تڏهن حملي آور ٿين ٿا. جڏهن ته ڀاڄين کي، کائڻ وارا جيت بعد ۾ آهستي آهستي اچن ٿا ۽ پوءِ گهڻو ڪري ٻنهي قسمن جا جيت موجود هجن ٿا ساڳئي وقت ڀاڄين تي ڪيترن ئي قسمن جون بيماريون پڻ حملو ڪن ٿيون. هنن نقصانڪارن کي زرعي سائنسدان ”جيتن ۽ بيمارين جي ضابطي واري گڏيل حڪمت عملي، يعني آءِ پي ايم (IPM) واري طريقي سان ضابطي ۾ آڻڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ۽ ان جون ئي حڪمت عمليون ٻڌائن ٿا.

ڀاڄين لاءِ آءِ پي ايم:

فصلن (ڀاڄين) جي نقصانڪار جيتن جي ضابطي واري گڏيل حڪمت عملي يعني آءِ پي ايم (IPM) هڪ اهڙي مؤثر ۽ ماحول دوست سوچ آهي. جنهن ۾ ڪيميائي زهرن يعني پيسٽيسائيڊس کي آخري هٿيار طور استعمال ڪيو وڃي ٿو. جڏهن ته ان کان پهرين ٻين طريقن سان نقصانڪار جيتن جي نقصان کان بچي سگهجي ٿو. آءِ پي ايم جي سوچ ۾ بنيادي اهميت ان ڳالهه کي ڏني وڃي ٿي ته جيت بيماريون يا گندگاهه اسان جي فصلن ڀاڄين وغيره ۾ آخر شدت اختيار ڇو ٿا ڪن؟ شدت ڪيئن ٿا اختيار ڪن ۽ ڪڏهن ٿا ڪن؟ ۽ انهن جي شدت کي گهٽائڻ جا غير ڪيميائي طريقا ڪهڙا آهن؟ وغيره.

آء پي ايم جا چار مُڪيه اصول طئه ٿيل آهن:

1. صحتمند فصل اپائڻ (Grow Healthy Crop).
2. فصل کي روزانو چڱي طرح گهمي ڏسڻ ته جيئن ڪو به مسئلو ظاهر ٿيڻ شرط شروع ۾ ئي ان کي حل ڪري ڇڏجي.
3. دوست جيئڻ کي بچائڻ (Conserve Natural Enemies) جيئن ته فصلن ۾ نقصانڪار جيئڻ سان گڏ فائديمند جيئڻ يعني اهي جيت جيڪي فصل کي نٿا کائڻ پر نقصانڪار جيئڻ کي پنهنجي خوراڪ بڻائڻ ٿا انهن کي بچائجي.
4. آبادگار خد ماهر ٿي وڃي (Farmer Becomes Expert) آبادگار هر وقت ٻين تي نه ڀاڙي پر خد ايتري ڄاڻ حاصل ڪري جو هو خد ماهر ٿي وڃي.

عملي طور تي ڀاڄين جي آء پي ايم ۾ هيٺين عملن تي زور ڀريو وڃي:

1. ڀاڄين ۾ گندگاهه کي هرگز وڌڻ نه ڏجي، ڇاڪاڻ ته گندگاهه جي اندر جيت جٿيا وڌيڪ شدت اختيار ڪن ٿا ۽ ساڳئي وقت ڀاڄين جي خوراڪ کڻي انهن کي ڪمزور به ڪن ٿا.
2. نانٽروجن وارو پاڻ گهڻو نه ڏجي گهڻو پاڻ ڏيڻ سان ڀاڄيون ڪڇ ۽ ساوڪ وڌيڪ ڪن ٿيون جنهن جي ڪري جيئڻ جو حملو وڌي ٿو.
3. بيمار بچ يا بيجارو هرگز نه پوکجي ۽ شروعات ۾ غير ڪيميائي طريقن کي اختيار ڪرڻ گهرجي.
4. ڀاڄين جي روزانو چاچ ڪبي رهجي.
5. زرعي زهرن جو شروعات ۾ تڪڙو ڦوهارو ڪرڻ کان پاسو ڪجي.

جيئڻ ۽ بيمارين جو غير ڪيميائي ضابطو:

1. ڪششي ٻوٽا پوکڻ:

واڙيءَ جي چوڌاري سورج مُڪي، مڪئي، يا جوئر جي قطار ضرور پوکجي، جن ۾ جڏهن بچ ايندو ته ان بچ تي پڪي ايندا جيڪي ان بچ کي کائڻ سان گڏ ڀاڄيءَ ۾ موجود نقصانڪار ڪيئن ڪي به کائي ناس ڪندا.

2. ٻاجهر جي آن جو استعمال:

جيڪڏهن ڀاڄيءَ ۾ ڪيئنن جو حملو گهڻو هجي ته ٻنن سان ٻاجهريءَ جي آن جي لڀ ڇڻي وڃجي ته ان تي پڪي ايندا جيڪي ٻاجهريءَ جي آن کي کائڻ سان گڏ ڪيئنن جو به خاتمو آڻي ڇڏيندا.

3. سرف ۽ پاڻيءَ جو ڦوهارو:

جيڪڏهن ڀاڄيءَ ۾ رس چوسڻ وارا جيت هجن ۽ ٻنن تي مٽي يا سٺپ يا ڪاري ماڪيءَ جهڙي حالت هجي ته هڪ چمچو سرف جي پائوڊر جو ڪلهي واري ڦوھاري جي ڊٻي ۾ وجهي ڦوھارو ڪجي ته ڪافي حد تائين تدارڪ ٿي ويندو.

4. نم جو استعمال:

نقصانڪار جيتن جي نقصان کان پاڇين کي بچائڻ ۽ ماحولياتي گدلاڻ کان بچڻ لاءِ نم بهترين ذريعو آهي. عام طور تي ڏٺو اهو ويو آهي ته پاڇين تي ڪيميائي زهرن جو بي حساب استعمال ٿئي ٿو. جنهن تي نه صرف خرچ گهڻو ٿئي ٿو پر مختلف رپورٽن مان ظاهر ٿيو آهي ته اهڙين پاڇين ۾ زرعي زهرن جو اثر رهي وڃي ٿو. جيڪو پاڇيون واپرائيندڙن جي صحت کي نقصان رسائي ٿو. ان ڪري اءِ پي ايم جي استعمال کي وڏي اهميت ڏني وڃي ٿي.

نم جي پنن جو ڳار:

نم جي ڏهه (10) ڪلو گرام کن ساون پنن کي ڪنهن ڊرم ۾ وجهي ايترو پاڻي ڀرجي جيئن پن چڱي ريت ڀسي وڃن. جنهن بعد انهن کي باهه تي ڪاڙهي ۽ ايتري تائين ڪاڙهي جيئن پاڻي سُڪي هڪ لٽر وڃي بچي. بچيل هڪ ليٽر ڳار کي سنهي ڪپڙي ۾ ڇاڻي ڪنهن بوتل ۾ وجهي رکجي. جڏهن جيتن جو حملو نظر اچي ته ان وقت 100 ملي لٽر ڪلهي واري ڦوهاري جي ڊبي ۾ وجهي ڦوهارو ڪجي ۽ وري انين ڏينهن ٻيو ڦوهارو ڪجي. نم جي ڳار جو ڦوهارو ڪرڻ سان جيتوڻيڪ جيت مرندا ڪو نه پر اهي واڙيءَ مان پڇي ويندا ۽ ٻاهران وري بيا نقصانڪار جيت واڙيءَ ۾ داخل نه ٿيندا.

نم جي تيل جو استعمال:

نم جون نموريون وڻ مان جيئن ڪرن ته انهن کي ميڙي ڇانو ۾ سڪائڻ لاءِ رکجي ۽ نموريون جڏهن بلڪل سُڪي وڃن ته انهن کي گهاٽي تان پيڙائي، تيل ڪيرائي رکي ڇڏجي. جڏهن واڙيءَ ۾ جيتن جو معمولي حملو نظر اچي ته هڪدم 100 ملي لٽر نمورين جو تيل ڪلهي واري ڦوهاري جي ڊبي ۾ وجهي هڪ چمچو سرف جي پائوڊر جو ملائي، چڱي طرح گڏائجي پوءِ واڙيءَ ۾ ڦوهارو ڪجي ۽ اهو ڦوهارو ائين ڏينهن وري ورجائجي ته جيئن تي ضابطو اچي ويندو.

نم جي ڪڙ جو استعمال:

نمورين مان تيل ڪڍرائڻ کان پوءِ جيڪو ڪڙ بچي ٿو ان جا 5 ڪلو گرام 5 لٽر ٽهڪندڙ پاڻيءَ ۾ وجهي 2 چمچا سرف جي پائوڊر جا وجهي چڱيءَ طرح ملائي ڍڪ ڏئي 24 ڪلاڪن تائين رکي ڇڏجي. جنهن بعد ان کي هٿن سان مهڻي سنهي ڪپڙي ۾ ڇاڻي هڪ سو ليٽر پاڻيءَ ۾ ملائي واڙيءَ تي ڦوهارو ڪجي.

نمورين جي پائوڊر جو استعمال:

سڪل نمورين کي پاڻيءَ ۾ تيسائين پُسانجي هيستائين نمورين جون ڪلون نرم ٿي وڃن جنهن بعد نمورين جون ڪلون لاهي گورن کي ڇانو ۾ سڪڻ لاءِ رکجي، جڏهن گورا سُڪي وڃن ته انهن کي پينهين يا ڪُٽي پائوڊر ٺاهجي. پائوڊر جي 3 ڪلو گرام وزن کي 24 ڪلاڪ پُساني رکجي جنهن بعد ان کي سنهي ڪپڙي ۾ ڇاڻي هڪ سو ليٽر پاڻيءَ ۾ ملائي 8 کان 10 چمچا سرف وجهي ڦوهارو ڪجي.

ٿوم جو ڦوهارو:

هڪ ڪلو ڪنيل ٿوم 20 ڇانهن وارا چما (100 گرام) سرف يا صابن، 20 ڇانهن وارا چمچا ۽ هڪ ليٽر گاسليٽ ۽ 5 لٽر پاڻي جو ڳار ٺاهيو جنهن لاءِ ٿوم گاسليٽ ۾ 24 ڪلاڪ پُساني رکجي. ان کان پوءِ ان ۾ سرف يا صابن ۽ پاڻي وجهي چڱي طرح هلائي هلائي ڇاڻجي ڇاڻيل ڳار مان هڪ حصو ۽ 20 حصا پاڻي ملائي پاڇين تي ڦوهارو ڪجي ته جيت ضابطي ۾ رهندا.

تماڪ جو ڳار:

هڪ سو پنجاهه گرام تماڪ جي پنن کي ننڍا ننڍا ٽڪر ڪري هڪ لٽر ٽهڪندڙ پاڻيءَ ۾ وجهي ٻه چار ٽهڪا ڏئي ڇلهي تان لاهي 12 ڪلاڪن لاءِ رکي. ٻارنهن ڪلاڪن کان پوءِ هٿ سان چڱي طرح مهڻي ڪنهن سنهي ململ جي ڪپڙي ۾ ڇاڻي پاڻي صاف بوتل ۾ وجهي رکي.

جڏهن پاڇين ۾ مهلو، اڇي مک، جُون پڻ ڪٽڻ وارا ڪيئن نظر اچن ته هڪ حصو تماڪ جي ڳار جو ۽ 10 حصا پاڻيءَ جا پاڻ ۾ ملائي ڦوهارو ڪريو.

ڦودني جو ڦوهارو:

ڦودني جي هڪ ڪلو گرام پڻن کي گهوٽي هڪ سو لٽر پاڻيءَ ۾ چڱيءَ طرح ملائي پاڇين تي ڦوهارو ڪريو ته پڻن تي داغن وارين بيمارين کان بچاءُ ۾ مدد ملندي. ڦوهاري لاءِ حجامن جي دڪانن تي استعمال ٿيندڙ هٿ وارو ڦوهارو استعمال ڪجي.

مال جي ڇيٽن جو ڦوهارو:

اڌ ڪلو گرام مال جا تازا ڇيٽا 5 لٽر پاڻيءَ ۾ وجهي چڱيءَ طرح گڏائي سنهي ڪپڙي ۾ ڇاڻي جراثيمي بيمارين جي ضابطي لاءِ پاڇين تي ڦوهارو ڪريو.

چور ڪيئون ۽ پٽاٽا:

چور ڪيئون ٿاڻن، مرچن ۽ شمله مرچن کي ڏاڍو نقصان ٿئي ٿو. هي جيت رات جو نڪري پڇاري جي ڏانڊين کي ٽڪي ٿو. ان لاءِ پڇاري ۾ رات جي وقت پٽاٽن جا وڏا ڳترا ڪري پڻن جي ويجهو رکي ڇڏجن، صبح جو اڇي ڏسبو ته انهن ڳترن تي ڪيئن موجود هوندا جن کي هٿن سان ناس ڪجي.

ربيع جي ڀاڄين جا جيت، بيماريون ۽ ڪيميائي ضابطو

ڀاڄي	جيت	پيٽيسائيڊ	وزن في ايڪڙ
ٽماٽا	اڇي مک، سائو مهلو، سست مهلو	ڪونفيڊور يا اميدا	250 ملي لٽر
	اڇي مک، ڪهڙي تعداد ۾ هجي ته	ڀولو يا ڍولو يا سولو يا بائفيٽيوران	200 ملي لٽر
		موسپيلان يا ايسيلان يا پائري پروڪسيفن	125 گرام 400 ملي لٽر
	آمريڪي ڪينٽون، ميوڙي جو ڪينٽون، لشڪري ڪينٽون	پروڪليم يا ٽائيمر يا ٽائي ڪون	200 ملي لٽر
	اڳاڻو ساڙ	ميڇ يا ڊرون يا اسٽيورڊ	150-100 ملي لٽر
	پاڇو ساڙ	اسڪور يا ريڊومل گولڊ	250 ملي لٽر 200 کان 250 گرام 100 لٽر پاڻي ۾
	ريوس		240 ملي لٽر 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي ڦهاريو ڪجي
	پائونٽي مينيڇر	اسڪور يا بائيٽان فوليئر	50 ملي لٽر 100 لٽر پاڻي ۾
		ٽائپسن ايم يا ريڊومل گولڊ	250 گرام 100 لٽر پاڻي ۾

200 کان 250 ملي لٽر	اميدا يا ڪونفڊور	سست مهلو 	پٽاٽا
		سانو مهلو 	
200 ملي لٽر 100 لٽر پاڻي ۾	پروڪليم يا ٽائيمر يا ٽائي ڪون	پٽاٽي جو پوپٽ 	
		آمريڪي ڪيٽون 	
100 ملي لٽر 100 لٽر پاڻي ۾	ميچ يا ڊرون يا اسٽورڊ	چور ڪيٽون 	
		لشڪري ڪيٽون 	
250 ملي لٽر 200 کان 250 گرام 100 لٽر پاڻي ۾	اسڪور يا ريڊومل گولڊ	اڳاڻو ساڙ 	

		پاڇاڻو ساڙ 	
125 گرام 100 لٽر پاڻي ۾	اڇي مک ۽ سست مهلي جي حملي کان ضابطو رکڻ ۽ موسيڀلان استعمال ڪريو		
500 ملي لٽر	ڪيور اڪران يا ڪريڪر	ٿڙڙو 	
200 ملي لٽر	اميدا		
200 ملي لٽر	پروڪليم يا ٽائيمر يا ٽائي ڪون يا ميچ يا ڊرون	آمريڪي ڪينٽون 	بصر ۽ ٽوم
		چور ڪينٽون 	
		لشڪري ڪينٽون 	

500 گرام	ريڊومل گولڊ يا ڊائٽين ايم	بصر جو ساڙ ڊائونِي ملڊيو 	
500 گرام	اينٽراڪول يا ڪاڀر آڪسي ڪلورائيڊ يا ڊائٽين	پرپل بلاچ 	
50 ملي لٽر	اسڪور		
100 ملي لٽر 100 لٽر پاڻي ۾	پروڪليم يا ٽايمر يا ٽائي ڪون يا مينچ	چور ڪينٽون 	مٽر
		آمريڪي يا لشڪري 	
		چڻي وارو ڪينٽون 	
30 ملي لٽر 60 ملي لٽر 120 گرام	ٿرائي گارڊ يا پوليٽرن سي يا ريڊينٽ	ليف مائينر	

			
250 ملي لٽر	ڪونفيڊور يا اميڊا	اچي مک 	
200 گرام	ٽاپسن ايم	اچي پائونڊري	
50 ملي لٽر ۾ 100 لٽر پاڻي ۾	اسڪور يا بائيٽان فولينر		
250 ملي لٽر	ڪونفيڊور يا اميڊا يا ڊيلفڪس	سسٽ مهلو 	
		اچي مک 	
100 ملي لٽر ۾ 100 لٽر پاڻي ۾	پروڪليم. يا ٽائيمر. يا ٽائي ڪون يا ميج يا ڊرون	چور ڪينٽون 	پالڪ
		لشڪري ڪينٽون 	

50 ملي لٽر ۾ لٽر پاڻي ۾	اسڪور يا ڊاءِ فيٽاڪونازول	نشان واري بيماري 	
200 ملي لٽر	پروڪليم، ٽائيمر، ٽائي ڪون	چور ڪينٽون 	
125 ڪن 150 ملي لٽر 500 ملي لٽر	ميچ يا ڊرون يا ڊيلٽامپڪس يا لارسيبين	آمريڪي ڪينٽون 	هر ٻو
		ٽڏ 	
50 ملي لٽر 100 لٽي پاڻي ۾	اسڪور يا ڊاءِ فيٽاڪونازول	نشان واري بيماري	
250 ملي لٽر 100 لٽر پاڻي ۾	ڪونفيڊور	ساتو مهلو 	سلاد
200 سي سي 24 گرام 100 لٽر پاڻي ۾	نانٽي پائرم يا ايڪٽارا		
هڪ لٽر	لارسيبين	اڏو هي 	
		ٽڏ	

			
100 ملي لٽر 100 لٽر پاڻي ۾	پروڪليم يا ٽائيمر، يا ٽائي ڪون ميچ يا ڊرون	چور ڪينٽون 	
		لشڪري ڪينٽون 	
50 ملي لٽر لٽر پاڻي ۾	اسڪور يا ڊاء فينڪونازول	نشان واري بيماري 	
250 ملي لٽر	ڪينفيڊور	سائو مهلو 	ڏاڏا ڦوڏنو
24 گرام 100 لٽر پاڻي ۾	ايڪٽارا		
هڪ لٽر	لارسيبن	اڏوهي 	
		ٽڏ 	
100 ملي لٽر 100 لٽر پاڻي ۾	پروڪليم يا ٽائيمر يا ٽائي ڪون يا ميچ يا ڊرون	چور ڪينٽون 	

		لشکري کينئون	
			
		نشان واري بيماري	
50 ملي لٽر لٽر پاڻي ۾	اسڪور يا ڊاءِ فيٽاڪونازول		
250 ملي لٽر 80 گرام 100 لٽر پاڻي ۾	ڪونفيڊور يا اسينامپيرڊ يا پلنيم	اچي مک 	
200 سي سي	ڪونفيڊور يا نائٽي پائرم	سائو مهلو 	گل گوبي، بند گوبي
100 سي سي 500 سي سي	ڪونفيڊور يا ايڊوانٽيج	سسٽ مهلو 	
200 ملي لٽر	پروڪليم يا ٽائيمر يا ٽائي ڪون	ڊائيمنڊ بيڪ ماٽ گوبي جو ڪينئون	

			
40 گرام في ٽانڪي	ريڊومل گولڊ	بيجاري جو ساڙ	
80 گرام 200 ڪن 250 سي سي 100 لٽر پاڻي ۾	پلينم يا پولو	سسٽ مهلو 	
		چور ڪينئون 	
100 ملي لٽر 100 لٽر پاڻي ۾	پروڪليم يا ٽائيمر يا ميچ يا ٽائي ڪون يا ميچ يا ڊرون	لشڪري ڪينئون 	موري ۽ گوکڙو

زهرن جي استعمال جو صحيح طريقو:

1. جيڪو به زهر ڦوهارو ڪرڻو هجي ان جي مٿان ڏنل هدايتن کي پڙهي عمل ڪجي.
2. ڦوهاري ڪندڙ کي زهر جي اثر کان بچڻ لاءِ هٿن تي پلاسٽڪ يا ربر جا جوراب، اکين تي عيڪ، نڪ تي ماسڪ يا ڪپڙي جي ٻٽ، پيرن ۾ بوٽ ضرور پائڻ گهرجن.
3. ڦوهاري دوران ڪاٺ، پيئڻ ۽ سگريٽ چڪڻ جي بلڪل اجازت ناهي. اهڙو ڪوبه عمل ڪرڻ سان ڦوهارو ڪندڙ جي صحت خراب ٿيندي.
4. ڦوهاري ٺاهڻ يا ڦوهاري ڪرڻ واري جاءِ تي ٻارن بچن، ٻين ماڻهن، جانورن ۽ ڪڪڙن وغيره کي هرگز اچڻ نه ڏجي.
5. ڦوهاري ڪرڻ کانپوءِ هڪدم ڦوهاري واريون خالي ٿيلهيون، بوتلون يا دٻا وغيره کڻي پوري ڇڏڻ ۽ گهر جي ڪنهن به استعمال ۾ نه آڻڻ.
6. ڦوهاري واري مشين کي وهندڙ پاڻيءَ ۾ هرگز نه ٽوڙجي نه ته اهو پاڻي هيٺ جڏهن جانور يا ماڻهو يا ٻڪري پڪڻ پيئندا ته انهن جي صحت خراب ٿيندي.
7. ڦوهاري ڪيل باغ مان گهٽ ۾ گهٽ هفتو ڏهه ڏينهن ميوو نه پئجي ۽ باغ ۾ پوکيل گاهه وغيره نه لڻجي ۽ جيڪڏهن پاڇي پوکيل هجي ته اها به هرگز نه پئڻ گهرجي.
8. تيز هوا هلڻ مهل ڦوهارو هرگز نه ڪجي.
9. ڦوهاري واري اهڙي مشين استعمال ڪجي، جيڪا صحيح هجي.
10. ڦوهاري ڪرڻ جو مناسب وقت صبح يا شام آهي، منجهند جو گهڻي تيز اس ۾ ڦوهارو نه ڪجي.



مڪئي - Maize

زمين:

مڪئي جو فصل هر قسم جي زمين تي ٿئي ٿو پر زرخيز ۽ وڌيڪ نيڪال واري چيڪي زمين تمام موزون آهي. اهڙي طرح مڪئي جي پوک ۽ پيداوار لاءِ بهتر يا وڌيڪ نيڪال واري لٽاسي زمين جنهن ۾ وڌيڪ پاڻي جهڻ جي صلاحيت هجي. جڏهن ته مڪئيءَ جو فصل 5.5 کان 8.5 زمين جي ڪارڊ واري حد ۾ پوکي سگهجي ٿو. مڪئي جو فصل ڪلار وارين حالتن لاءِ غير موزون آهي ۽ ڪلارائي زمين يا آبپاشي واسطي ڪارو پاڻي مڪئيءَ لاءِ موزون نه آهي.

زمين جي تيار:

مڪئيءَ جي پوکي لاءِ نرم ۽ گهڻي تيار ٿيل زمين جي ضرورت آهي. جنهن کي 3 کان 5 هر ڏنا وڃن ۽ پٽر پوري طرح ڇڏڻ گهرجن. زمين جي تياريءَ لاءِ پهريون هر ڪنر يا مڙيل هر ذريعي ڏيڻ گهرجي. جڏهن ضرورت پوي ته زمين کي هموار ڪجي.

پوکيءَ جو وقت:

اناج لاءِ مڪئي جي پوکيءَ واسطي جولاءِ جي پهرين هفتي کان 15 آگسٽ وارو وقت وڌيڪ موزون آهي. گاهه لاءِ مڪئي جي پوکي فيبروري جي شروع کان آڪٽوبر تائين ڪري سگهجي ٿي. جڏهن ته فيبروري ۽ مارچ ۾ پڻ مڪئي اناج لاءِ پوکي سگهجي ٿي.

پوکيءَ جو طريقو:

مڪئي جو فصل اناج ۽ سائي گاهه لاءِ پوکيو وڃي ٿو. جيڪڏهن اناج لاءِ مڪئي ٺاڙي واري طريقي ذريعي پوکي وڃي ته بهتر آهي ۽ قطارن جي وچ وارو مفاصلو 60 سينٽي ميٽر کان 75 سينٽي ميٽر هجڻ گهرجي. جيڪڏهن مڪئي گاهه لاءِ پوکي وڃي ته ڇٽ وارو طريقو بهتر آهي.

بج جو مقدار:

اناج لاءِ پوکيل مڪئي واسطي بج جو مقدار 12 کان 15 ڪلوگرام في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي ۽ گاهه لاءِ پوکيل مڪئي واسطي 40 کان 50 ڪلوگرام في ايڪڙ استعمال ڪرڻ گهرجي.

جنسون:

مڪئي جي پوکيءَ لاءِ سفارش ڪيل جنسون جهڙوڪ؛ اڪبر، نيلم، صدف، اڪيتي-72، سلطان، سنهري، DC-59، DC-697 ۽ ڪمپوزٽ-15 وغيره وڌيڪ پيداوار ڏيندڙ آهن.

پاڻ:

زمين جي زرخيزي قائم رکڻ ۽ فصل مان وڌيڪ پيداوار وٺڻ لاءِ اهو ضروري آهي ته زمين ۾ وڻاڻ جو پاڻ يا ڪيميائي پاڻ ڏنو وڃي. مڪئي جي فصل لڳائڻ کان 4 هفتا يا هڪ مهينو اڳ 15 کان 20 گاڏيون وڻاڻ جو پاڻ وجهي ۽ زمين ۾ چڱيءَ طرح ملايو وڃي. پر جيڪڏهن وڻاڻ جو پاڻ موجود نه آهي ته سائو پاڻ سفارش ڪيو وڃي. مڪئي جي فصل واسطي ڪيميائي پاڻ جو گهربل مقدار جنهن ۾ نائٽروجن 120 ڪلوگرام ۽ فاسفورس 60 ڪلوگرام في هيڪٽر ڏيڻ گهرجي.

پاڻي:

اناج لاءِ پوکيل مڪئي جي فصل کي 6 کان 7 پاڻي ڏيڻ گهرجن. پهريون پاڻي 25 کان 30 ڏينهن پوکي بعد ڏيڻ گهرجي ۽ سلسليوار پاڻي 10 کان 15 ڏينهن جي وقفي ۾، فصل جي ڇڏڻ تائين ڏيڻ

گهرجي. جڏهن ته گاهه لاءِ پوکيل فصل کي 2 کان 3 پاڻي ڏجن.

گڏ ڪيڻ:

گندگاهه سبب فصل جي پيداوار وڌيڪ اثر هيٺ اچي ٿي. تنهن ڪري اثرائتو گندگاهه جو خاتمو فصل جي پيداوار ۾ اضافو آڻي ٿو. مڪئي جي فصل ۾ هر پاڻي ڏيڻ کان بعد ضرورت پوي ته گڏ ذريعي گندگاهه جو خاتمو آڻڻ گهرجي. جڏهن ته مڪئي ۾ ٻئي پاڻي ڏيڻ کان پوءِ فصل جي پاڙن تي مٽي چاڙهي وڃي ته جيئن فصل ڪرڻ يا لپيڻ کان بچي وڃي.

لابارو:

مڪئي جي ڪٽائي سنگ پچڻ ۽ سنگ جي خشڪ ٿيڻ وقت ڪجي. سنگن کي اناج لاءِ پوکيل زمين مان ڪڍيو وڃي ۽ رهيل ڪانا ڪٽي ۽ سُڪايا وڃن، جيڪو بعد ۾ سڪل چاري لاءِ ڪتب اچي ٿو.

پيداوار:

مڪئي جي في ايڪڙ اناج واري پيداوار 1000 کان 1600 ڪلوگرام آهي. جڏهن ته 2500 کان 3000 ڪلوگرام ڪڙب ۽ 12000 کان 16000 ڪلوگرام في ايڪڙ سائو گاهه ملي ٿو. مقامي جنسن مان اناج جي پيداوار 400 کان 500 ڪلوگرام في ايڪڙ ملي ٿي.



جوئر Sorghum -

زمين:

جوئر جو فصل زرخيز ۽ ڳري لئاسي زمين ۾ تمام سٺو لڳي ٿو. پر ان ۾ گهٽ زرخيز زمين تي بهتر پيداوار ڏيڻ جي صلاحيت پڻ آهي. جوئر هر قسم جي زمين ۾ ڪاميابيءَ سان پوکي سگهجي ٿي. جهڙوڪ؛ ڳري چيڪي، وچولي لئاسي، ڪلراني ۽ نامياتي مادي واري زمين ۽ اهو تڏهن ممڪن آهي جڏهن زمين زرخيز ۽ سٺي ڪيڙيل هوندي.

زمين جي تياري:

سنڌ ۾ باراني علائقي ۾ جوئر جي محدود پوک ڪئي وڃي ٿي. جڏهن ته آبپاشي وارن علائقن ۾ جوئر گهڻي ايراضيءَ تي پوکي وڃي ٿي ۽ بهتر نتيجن واسطي زمين جي مڪمل تياري هجڻ گهرجي. جوئر جي پوکيءَ لاءِ 3 کان 4 خشڪ هر ڏيڻ گهرجن. جنهن کي بعد ۾ پتر پڇي ۽ هموار ڪيو وڃي. پهريون هر مٽي اٽلائيندڙ اوزار سان ڏيڻ گهرجي. ننڍي قد وارين ٻاهرين جنسن لاءِ زمين جي تياري بهتر هئڻ گهرجي.

بج جو مقدار:

اناج لاءِ پوکيل جوئر جي فصل واسطي 8 کان 10 ڪلوگرام في ايڪڙ بج استعمال ڪجي. جڏهن ته سائي گاهه لاءِ بج جو مقدار ٻيڻو هجڻ گهرجي يعني 24 کان 28 ڪلوگرام في ايڪڙ بج پوکڻ گهرجي.

پوکيءَ جو وقت:

اناج لاءِ جوئر جي پوک 15 جون کان جولاءِ جي آخري هفتي تائين پوکڻ گهرجي. جڏهن ته چاري لاءِ جوئر جي پوکي 15 فيبروري کان شروع ڪجي ۽ جولاءِ تائين پوکي وڃي.

پوکيءَ جو طريقو:

جوئر جو اناج وارو فصل ناڙي رستي پوکيو وڃي ٿو. جڏهن ته گاهه يا چاري لاءِ پوکڻ واري جوئر ڇت ذريعي پوکي وڃي ٿي. اهڙيءَ طرح اناج لاءِ جوئر جي ناڙي واري پوک بهتر نتيجا ڏئي ٿي. فصل جي قطارن جو مفاصلو ٻه فٽ سفارش ڪيو وڃي ٿو پر ٻوٽن جي وچ ۾ 3 کان 4 انچ مفاصلو بهتر پيداوار جو ضامن آهي.

جنسون:

جوئر سنڌ جو اهم اناج وارو فصل آهي. هن فصل جو ٻن قسمن جون جنسون آهن. جيڪي مقامي ڊگهي قد واريون جنسون ۽ ننڍي قد واريون ٻاهريون جنسون شامل آهن. فصل جون مقامي سطح تي جنسون علائقي جي مناسبت سان هيٺ ڏجن ٿيون.

(الف) مقامي جنسون (Local Varieties):

نوابشاهه ۽ سکر لاءِ	: سٽرو، ڪارڻهو
جيڪب آباد لاءِ	: ڳاڙهي، جانپر، الڪ
لاڙڪاڻي، سکر ۽ خيرپور لاءِ	: اڇو بازيگر
دادو لاءِ	: اڇو ڪوڏري
سکر لاءِ	: اڇو ڪارڻهو

جڏهن ته نئون سفارش ڪيل جوئر جي جنسن ۾ خاص ڪري هيٺ ڏنل جنسون آهن، جنهن لاءِ صرف پنجاب جي ساهيوال جو علائقو شامل آهي.

1. پاڪ SS-II

2. A-4009

(ب) ننڍي قد واريون جنسون (Dwarf varieties):

جوئر جي فصل جون نئون سفارش ڪيل جنسون جيڪي اناج لاءِ پوکيون وڃن ٿيون. انهن ۾ ننڍي قد واريون جنسون اچن ٿيون. جيڪي پڻ وڌيڪ پيداوار ڏين ٿيون. جنهن ۾:

1. ميلولنڊ (Meloland)، 2. شاهين جنس.

(ت) سائي گاهه واريون جنسون (Green fodder varieties):

نوابشاهه لاءِ	: اچو ڪارٽهو
حيدرآباد لاءِ	: ڪمندري
نوابشاهه لاءِ:	: اچي تري
دادو ۽ نوابشاهه	: گاڙهي تري

پاڻ ڏيڻ:

سنڌ ۾ هي فصل اڪثر حالتن ۾ ڪنهن به قسم جي زمين ۾ پوکي سگهجي ٿو. پر وڌيڪ پيداوار وٺڻ لاءِ اهو ضروري آهي ته هي فصل زرخيز زمين تي پوکيو وڃي. جيڪڏهن زمينون زرخيز نه آهن ته انهن ۾ گهريل ڪيميائي پاڻ يا وڻاڻ جو پاڻ مهيا ڪيو وڃي. باراني علائقن ۾ سڄو دٻان بارش جي گهٽائيءَ تي آهي. جڏهن ته زمين جي زرخيزي هن فصل جي پوک لاءِ ابتري اهم نه آهي. جوئر جي پوک لاءِ 15 گاڏيون وڻاڻ جو پاڻ زمين ۾ پوکيءَ کان هڪ مهينو اڳ في ايڪڙ ڏنو وڃي.

جوئر جي ننڍي قد وارين جنسن جهڙوڪ؛ شاهين ۽ ميلولنڊ لاءِ پاڻ نانڌروجن 120 ڪلوگرام ۽ 60 ڪلوگرام فاسفورس في هيڪٽر سفارش ٿيل آهي. مقامي جنسن لاءِ ان سفارش ڪيل پاڻ جو اڌ مقدار يعني 60 ڪلوگرام نانڌروجن ۽ 30 ڪلوگرام فاسفورس في هيڪٽر ڏنو وڃي ٿو. جڏهن ته سائي گاهه لاءِ پوکيل جوئر واسطي پاڻ جو مقدار وڌائي ۽ گهٽائي سگهجي ٿو. اڪثر حالتن ۾ سائي گاهه لاءِ پوکيل جوئر ۾ نانڌروجن پاڻ ڏنو وينو آهي.

پاڻي ڏيڻ:

پاڻي فصل جي واڌ ۽ پيداوار ۾ وڏي اهميت رکي ٿو. ڪجهه فصل گهٽ پاڻي کڻن ٿا ۽ ٻيا پاڻي جو وڌيڪ مقدار وٺن ٿا. جڏهن ته جوئر خشڪ فصل آهي.

جوئر ۾ پهريون پاڻي 3 کان 4 هفتا پوکيءَ کان بعد ڏيڻ گهرجي ۽ سلسليوار آبپاشي 15 ڏينهن جي وقفي تي ڪئي وڃي. هن فصل لاءِ 3 کان 4 پاڻي ڏيڻ جي ضرورت پوي ٿي. تنهنڪري هن جي واڌ واري مرحلي دوران 10 کان 12 ايڪڙ انچ پاڻي گهرجي. جوئر جي فصل ۾ اها خوبي آهي ته ناموافق حالتن ۾ پنهنجي واڌ روڪي ٿو ۽ جڏهن حالتون موافق ٿين ٿيون ته پنهنجي واڌ جاري رکي ٿو.

گڏ ڪيڻ:

فصل مان گندگاهه جي صفائي لاءِ ان ۾ گڏ ڪرڻ لازمي آهي. جوئر جي فصل ۾ هڪ کان ٻه گئون ڪيڻ گهرجن. جنهن لاءِ ڪوٽر يا چنچور جو استعمال ڪيو وڃي. اهڙي طرح فصل مان گندگاهه ختم ٿي ويندا ۽ پيداوار ۾ به اضافو ايندو.

پيداوار:

باراني علائقي ۾ جوئر جي اناج واري پيداوار 5 کان 7 مٺ في ايڪڙ آهي. جڏهن ته آبپاشي وارن علائقن ۾ 8 کان 10 مٺ في ايڪڙ پيداوار ملي ٿي. اهڙيءَ طرح باراني علائقن ۾ 20 کان 25 مٺ جوئر جي ڪڙب ملي ٿي ۽ آبپاشي وارن علائقن ۾ 40 مٺ في ايڪڙ ڪڙب حاصل ٿئي ٿي. باراني علائقن ۾ سائي گاهه جي پيداوار 2200 کان 2800 ڪلوگرام آهي ۽ آبپاشي وارن علائقن ۾

سائي گاهه جي پيداوار 8000 کان 10000 ڪلوگرام في ايڪڙ آهي. جڏهن ته ننڍي قدر وارن جنسن ميلولينڊ ۽ شاهين مان اسان جي حالتن ۾ اناج جي پيداوار 2000 ڪلوگرام في ايڪڙ ڏيڻ ٿيون.



ٻاجهري جو فصل هر قسم جي زمين تي ٿئي ٿو. هي فصل سم واري زمين ۾ نٿو ٿئي. هن فصل ۾ ڪار وارين حالتن جي برداشت جي صلاحيت آهي. جتي ٻاجهري، ڪڻڪ ۽ ڪجهه جي پيٽ ۾ وڌيڪ اڀري ٿو. هي فصل گهٽ زرخيزي زمين تي پوکي سگهجي ٿو. جتي وڌيڪ پيداوار وٺڻ لاءِ اضافي پاڻ جو مقدار ڏنو وڃي ٿو. جڏهن ته ٻاجهري جي فصل لاءِ وارياسي لٽ واري زمين بهتر آهي. اهڙي زمين ۾ 15 کان 20 گاڏيون وٺڻ جو پاڻ في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي. ٻاجهري جي پوک لاءِ تمام هودار ۽ گهٽ زرخيزي وارياسيون زمينون گهرجن. جڏهن ته گريون زمينون ٻاجهري لاءِ غير موزون آهن.

هن فصل لاءِ ڪنهن خاص قسم واري زمين جي تيارِي جي ڪابه ضرورت نه آهي. ٻاجهري جي سٺي پيداوار حاصل ڪرڻ لاءِ 2 کان 3 هر ڏيئي سانهر ڏنو وڃي. باراني علائقن ۾ چوماسي جي برساتن کان پهريائين زمين جي تيارِي مڪمل ڪئي وڃي. انهن ڪرڻ سان زمين ۾ پاڻي جي جاذبيت واري صلاحيت وڌي ويندي.

اناج لاءِ پوکيءَ واري ٻاجهري واسطي 3 کان 4 ڪلوگرام في ايڪڙ بچ استعمال ڪرڻ گهرجي. جڏهن ته سائي گاهه يا چاري لاءِ بچ جو مقدار 10 کان 20 ڪلوگرام في ايڪڙ سفارش ڪيو وڃي ٿو.

سنڌ ۾ ٻاجهري جون ٻه جنسون جهڙوڪ C-48 ۽ C-18 عام پوکيون وڃن ٿيون. جڏهن ته ٻاجهري جي نئين جنس ۾ 84-4، 18-84، ۽ IC-8206 پوکيءَ هيٺ آهن.

اناج لاءِ ٻاجهري جي پوکڻ جو وقت جون ۽ جولاءِ کان 15 آگسٽ تائين موزون آهي. جڏهن ته سائي گاهه لاءِ پوکيل ٻاجهري واسطي بهتر وقت اپريل آهي. هي فصل گاهه لاءِ آگسٽ تائين پوکي سگهجي ٿو.

ٻاجهري جي پوکي ناڙي ذريعي وڌيڪ بهتر آهي. پر فصل جي پوک ڇٽ ۽ ناڙي ذريعي ڪئي وڃي. ناڙي ذريعي پوکيل ٻاجهري لاءِ قطارن ۽ ٻوٽن وارو مفاصلو ”9 x 12“ سفارش ڪجي ٿو.

هن فصل لاءِ پاڻ وڏي پيماني تي استعمال نٿو ٿئي. ۽ عام حالتن ۾ ٻاجهري جو فصل وٺڻ جي پاڻ ۽ ڪيميائي پاڻ کان سواءِ پوکيو وڃي ٿو. پر وڌيڪ اهم فصل لاءِ هڪ ٻوري يوريا في ايڪڙ پوکيءَ وقت ڏيڻ گهرجي.

ٻاجهري مختصر موسم يا گهٽ وقفي وارو فصل آهي. جنهن جي ڇڏڻ لاءِ ٻه کان اڍائي مهينن جو وقت گهرجي. هن فصل لاءِ گهٽ مقدار ۾ پاڻي گهرجي. ٻاجهري لاءِ 2 کان 3 پاڻي گهرجن. پهريون

پاڻي پوکيءَ کان 30 ڏينهن جي اندر ٽجي ۽ باقي آبپاشي جو پاڻي 15 ڏينهن جي وقفي تي ڏيڻ گهرجي.

لابارو:

ٻاجهري جو فصل ڇٽ واري موسم يعني سيپٽمبر ۽ آڪٽوبر جي مهينن ۾ ڀڄي ٿو ۽ لابياري لاءِ تيار ٿي وڃي ٿو.

پيداوار:

باراني علائقن ۾ اناج لاءِ پوکيل ٻاجهري جي پيداوار 5 مڻ في ايڪڙ آهي. ۽ آبپاشي وارن علائقن ۾ 10 کان 12 مڻ في ايڪڙ پيداوار ملي ٿي. جڏهن ته سائي گاهه جي پيداوار 300 کان 400 مڻ في ايڪڙ آبپاشي وارن علائقن اندر ورتي وڃي ٿي. ۽ باراني علائقن ۾ ٻاجهري جي سائي گاهه جي پيداوار 200 مڻ تائين آهي.



برسيم Egyptian Clover

زمين:

برسيم جي پوک وارياسي کان چيڪي زمين ۾ ڪري سگهجي ٿي. هي فصل مختلف زمينن اندر پوکيو وڃي ٿو. جنهن ۾ وارياسي کان گريون لٽياسيون زمينون جنهن ۾ نيڪال سٺو هجي اهي بهتر آهن. جڏهن ته برسيم جا پوٽا ڪلر وارين زمينن کي برداشت ڪن ٿا.

زمين جي تيارِي:

برسيم ڊگهي پاڙ وارو فصل آهي. جنهن لاءِ زمين جي تياري بهتر نموني ڪئي وڃي ٿي. هن فصل جي پوک لاءِ 3 کان 4 هر ڏئي پٽر ڇڏي زمين کي هموار ڪجي. پاڻي ڏيڻ بعد بيٺل پاڻي ۾ برسيم جو بچ ڇڏ ڪرڻ گهرجي.

پوکيءَ جو وقت ۽ طريقو:

هن فصل جي پوک 15 سيپٽمبر کان 15 نومبر تائين ڪري سگهجي ٿي. جڏهن ته اهي علائقا جتي گرمي جو درجو وڌيڪ هجي ان حالت ۾ برسيم آڪٽوبر مهيني ۾ پوکيو وڃي ٿو. برسيم جي پوکي ڇت ذريعي ڪئي وڃي ٿي. هن فصل جي پوک لاءِ پهريائين زمين کي پاڻي ٽجي. ان بعد بيٺل پاڻيءَ ۾ برسيم جو بچ ڇڏ ڪجي. هي فصل وونٽن ۽ مڪئي جي بيٺل فصل ۾ پوکيو وڃي ٿو. جنهن لاءِ آڪٽوبر جي مهيني ۾ وونٽن ۽ مڪئي کي پاڻي ٽجي ۽ بعد ۾ برسيم جو بچ ڇڏ ڪجي. جڏهن ته ساريل جي علائقي ۾ برسيم جي پوک سارين جي فصل جي لابياري بعد ڪئي وڃي ٿي. ڇاڪاڻ ته هن علائقي جي زمين جي سڌاري واسطي سارين ۽ برسيم جي وارفير ڪئي وڃي ٿي ته جيئن زمين مان ڪلر جو خاتمو ٿئي.

جنسون:

هن فصل لاءِ مقامي جنس پوکي وڃي ٿي. جنهن ۾ پٺن ۽ رسدار ڏانڊين جو گهڻو مقدار ٿئي ٿو.

بچ جو مقدار:

هن فصل لاءِ 10 کان 12 ڪلوگرام في ايڪڙ بچ استعمال ڪجي. ڇاڪاڻ ته بچ سنهي هجڻ سبب ان جو مقدار وڌائي سگهجي ٿو.

پاڻ ڏيڻ:

هن فصل کي عام ڪري پاڻ نه ڏنو ويندو آهي. پر زمين اندر هڪ ٻئي پٺيان لڳاتار فصل پوکڻ سبب زمين جي زرخيزيءَ تي اثر پوي ٿو ۽ پيداوار گهٽ ملي ٿي. تنهنڪري زمين جي زرخيزي کي قائم رکڻ لاءِ پاڻ ڏيڻ ضروري آهي. هن فصل جي پوکيءَ لاءِ اڌ پوري يوريا ۽ ڏيڻ پوري ڊي-اي-ڇي پاڻ في ايڪڙ پوکيءَ کان اڳ ڏيڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته فاسفورس پاڻ نه فقط فصل جي پيداوار وڌائي ٿو پر ان جي خاصيت تي پڻ سٺو اثر ڏيکاري ٿو. جڏهن ته فصل جي پهرين لوب يا لابياري بعد يوريا پاڻ جي اڌ پوري ڏيڻ گهرجي. جنهن سان فصل سانو ۽ سرسبز ٿيندو ۽ واڌ جلدي ٿيندي.

پاڻي ڏيڻ:

هن فصل جي پوکيءَ بعد ٻه هلڪا پاڻي هفتي اندر ڏيڻ گهرجن ته جيئن سٺو ڦوٺهڙو ٿئي. ڇاڪاڻ ته

جلدي پاڻي ڏيڻ سبب سلا جلدي ساوا ٿيندا ۽ واڌ تيز ڪندا. هن فصل ۾ مجموعي طور 8 کان 10 پاڻي ڏيڻ گهرجن. جيڪي 10 کان 15 ڏينهن جي وقفي سان ڏيڻ گهرجن.

گندگاهه:

هن فصل ۾ عام طور ڳڏ يا گندگاهه ڪيڻ جي ضرورت نه آهي. پر هن فصل ۾ جيڪڏهن بصري، ڪاسي، سنجھه ۽ جهل نظر اچن ته هٿ ذريعي ڪڍي ڇڏجن.

برسيم جي ڪٽائي:

هن فصل جي پهرين ڪٽائي يا پهريون لوب هڪ مهيني جي اندر وٺڻ گهرجي ۽ سلسلي وار ڪٽائي ٻن يا ٽن هفتن بعد ڪندو رهجي. جڏهن ته آخري ڪٽائي بعد هن فصل کي سائي پاڻ لاءِ ڪم آڻي سگهجي ٿو.

پيداوار:

هن فصل مان 800 کان 1000 مٺ سائو چارو ملي ٿو. جڏهن ته بچ لاءِ پوکيل برسيم مان 8 کان 10 مٺ في ايڪڙ بچ ملي ٿو.

لوسٽ - Alfalfa



زمين:

هن فصل جي پوکيءَ لاءِ زرخيز لٽياسي زمين کان هڪي زرخيز زمين جو قسم بهتر آهي. جنهن ۾ پاڻيءَ جي نيڪال وارو سرشتو بهتر آهي. لوسٽ جون پاڙون تمام هيٺ زمين ۾ وڃن ٿيون. ان ڪري لوسٽ ۾ سوڪهڙي برداشت ڪرڻ جي صلاحيت آهي. جڏهن ته دوبياري، بوسي يا خشڪ علائقن ۾ هڪي ڪار واريون زمينون ۾ لوسٽ ڪاميابيءَ سان پوکي سگهجي ٿو.

زمين جي تياري:

لوسٽ دائمي قسم جو فصل آهي. جيڪو بهتر حالتن سبب زمين تي 6 کان 7 سالن تائين موجود رهي ٿو. ان ڪري لوسٽ جي پوک لاءِ زمين جي تياري بهتر نموني ڪرڻ گهرجي. زمين کي 3 کان 4 اونها هر ڏئي، پر ڇي ان کي هموار ڪجي. گندگاهه جي پوڻ کي فصل پوکڻ کان اڳ ختم ڪيو وڃي.

پوکيءَ جو وقت ۽ طريقو:

لوسٽ جو فصل 15 سيپٽمبر کان 15 نومبر تائين پوکي سگهجي ٿو. پر آڪٽوبر جو مهينو سڀ کان بهتر آهي. هي فصل ناڙي ذريعي پوکڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته قطارن ۾ پوکيل فصل سائي گاهه ۽ بچ جي پيداوار وڌيڪ ڏئي ٿو. بچ ناڙي ڪرڻ وقت اهو خيال ڪجي ته جيئن بچ ڏيڍ انچ کان وڌيڪ هيٺ نه وڃي. لوسٽ ڪرين تي به پوکيو وڃي ٿو. جنهن ۾ ٻن ڪرين جي وچ ۾ مفاصلو ڏيڍ کان ٻه فٽ هجڻ گهرجي. جڏهن ته لوسٽ جو فصل آلي زمين ۾ ڇٽ ذريعي پوکي سگهجي ٿو.

بچ جو مقدار:

لوسٽ جي ناڙي ذريعي پوک لاءِ 5 کان 6 ڪلوگرام في ايڪڙ بچ استعمال ڪجي. جڏهن ته ڇٽ ڪيڙ واري پوک لاءِ 8 ڪلوگرام في ايڪڙ بچ استعمال ڪيو وڃي.

پاڻ ڏيڻ:

لوسٽ جي فصل مان وڌيڪ پيداوار وٺڻ لاءِ وڻاڻ جو ڳريل سڙيل پاڻ ڏيڻ ضروري آهي. جڏهن ته فصل پوکڻ وقت اڌ ٻوري ڏي اي ٻي يا هڪ ٻوري نائٽروفاس استعمال ڪجي.

پاڻي ڏيڻ:

فصل ۾ پهريون پاڻي پوکيءَ جي ٻن ڏينهن اندر ڏجي. اونهاري ۾ 10 کان 15 ڏينهن ۽ سياري ۾ 15 کان 20 ڏينهن جي وقفي ۾ ڏجي.

گندگاهه ۽ گڏ ڪيڻ:

لوسٽ جي شروعاتي واڌ واري مرحلي دوران گندگاهه جي پوڻ جي تڪڙي واڌ ٿئي ٿي. جيڪڏهن ان عرصي دوران گندگاهه کي ختم نه ڪيو ويو ته اهي لوسٽ کي نقصان ڏيندا. جنهنڪري پيداوار ۽ ان جي خاصيت متاثر ٿيندي. لوسٽ جي پوکيءَ بعد پهرين ٽن مهينن دوران ڪوڏر جي مدد سان گڏ ڪجي ته جيئن فصل جي واڌ ۽ ڦوڙهڙو بهتر ٿئي.

لوسٽ جي بچ جي تياري:

لوسٽ جي بچ جي تياري جي لاءِ بهتر موسم بهار آهي. جنهن ۾ فيبروري واري مهيني ۾ ڪٽائي بند ڪجي. لوسٽ جا بچ اپريل مهيني ۾ ڇي لابياري لاءِ تيار ٿي وڃن ٿا. عام طور فصل مان 5 کان 6

لوب وٺي سگهجن ٿا.

پيداوار:

عام حالتن ۾ لوسٽ مان 400 کان 500 مٺ في ايڪڙ سائو گاهه وٺي سگهجي ٿو. جڏهن ته ٻج لاءِ پوکيل فصل مان بهتر حالتن ۾ 4 کان 8 مٺ في ايڪڙ ٻج يا 150 کان 350 ڪلوگرام ٻج في ايڪڙ وٺي سگهجي ٿو.



جنتر يا دانچو

Sesbania

زمين:

جنتر جو فصل هر قسم جي زمين ۾ پوکيو وڃي ٿو. جنهن ۾ سم ۽ ڪلر واريون زمينون اچي وڃن ٿيون. جڏهن ته چيڪي ۽ لٽياسي زمين ۾ به هي فصل پوکي سگهجي ٿو. عام طور هي فصل ڪلراني زمين ۾ ئي پوکيو ويندو آهي.

زمين جي تيارِي:

هن فصل جي پوکيءَ لاءِ زمين کي 2 کان 3 سڪيءَ جا هر ڏئي سانهر يا پاڻيو گهمائي سنوت ۾ اٽجي. زمين ۾ پٿر هجن ته اهي پڇي ڇڏڻ گهرجن ۽ بعد ۾ پوکي ڪجي.

پوکيءَ جو وقت ۽ طريقو:

هي فصل سنڌ ۾ مارچ کان جولاءِ تائين پوکي سگهجي ٿو. عام طور تي جنتر جي پوک ڇٽ ذريعي ڪئي وڃي ٿي. جنهن جو بچ بيٺل پاڻي ۾ هٿ سان ڇٽ ڪجي.

بج جو مقدار:

هن فصل لاءِ عام طور تي بج جو مقدار 12 کان 30 ڪلوگرام في ايڪڙ استعمال ڪجي. جيڪڏهن جنتر بج لاءِ پوکجي ته بج جو مقدار 12 ڪلوگرام ۽ مال جي چاري لاءِ يا سائي پاڻ لاءِ پوکجي ته پوءِ 20 کان 30 ڪلوگرام في ايڪڙ بج استعمال ڪجي. جڏهن ته بج جو مقدار زمين جي قسم ۽ آب هوا جي لحاظ مطابق گهٽائي ۽ وڌائي سگهجي ٿو.

پاڻ ڏيڻ:

عام طور تي هن فصل ۾ پاڻ استعمال نٿو ڪيو وڃي. ڇاڪاڻ ته جنتر ۾ نانٽروجن جي جمع ڪرڻ واري صلاحيت وڌيڪ آهي.

پاڻي ڏيڻ:

جنتر جي پوک ڇٽ ذريعي بيٺل پاڻيءَ ۾ ڪئي وڃي ٿي. هن فصل کي پوکيءَ بعد پهريون پاڻي 30 ڏينهن بعد ڏنو وڃي ۽ باقي ٻيا رهيل پاڻي 15 ڏينهن جي وقفي بعد ڏجن. گندگاهه جون پاڙون هٿ سان ڪڍجن.

پيداوار:

هن فصل مان سائو گاهه 350 مٺ في ايڪڙ ۽ بج 12 مٺ في ايڪڙ ملي ٿو.



گوار Cluster bean

زمين:

گوار هر قسم جي زمين تي ٿي سگهي ٿي. پر هن فصل لاءِ وڌيڪ موزون وارياسي لڻياسي زمين آهي. هن جي پوک بهتر نيڪال واري چيڪي زمين تي به ڪري سگهجي ٿي. ٿر ۽ ڪاڇي ۾ هن فصل جي پوک عام ٿئي ٿي.

زمين جي تياري:

گوار جي پوک لاءِ زمين کي ٻه يا ٽي هر ڏئي ۽ سانهر گهمائي هموار ڪجي. ۽ بعد ۾ برسات يا ريڇ واري پاڻيءَ تي پوکي ڪجي.

پوکيءَ جو وقت ۽ طريقو:

سائي گاهه لاءِ گوار جي پوکي اپريل کان جولاءِ تائين ڪرڻ گهرجي. جڏهن ته پوکيءَ جو بهتر وقت جون-جولاءِ آهي. برساتي علائقي ۾ گوار جي پوک چوماسي جي موسم ۾ ڪجي. گاهه لاءِ پوکي واسطي چٽ وارو طريقو بهتر ٿيندو.

بج جو مقدار:

سائي گاهه لاءِ گوار جي پوکيءَ واسطي 25 کان 30 ڪلوگرام في ايڪڙ بج استعمال ڪجي.

پاڻ ڏيڻ:

هن فصل ۾ هڪ ٻوري ڊي-اي-بي پوکيءَ وقت ڏيڻ گهرجي.

پاڻي ڏيڻ:

هن فصل لاءِ 2 کان 3 پاڻي ڪافي آهن. پهريون پاڻي پوکيءَ جي 30 ڏينهن اندر ڏجي ۽ باقي سلسليوار پاڻي ٽن هفتن جي وقفي سان ڏيڻ گهرجن.

ڪٽائي ۽ پيداوار:

گوار جي فصل جي گاهه لاءِ ڪٽائي پوکيءَ جي ٻن کان اڍائي مهينن بعد ڪرڻ گهرجي. هن فصل مان آبپاشي جي علائقي ۾ 300 مٺ سائو چارو ۽ باراني علائقي ۾ 150 مٺ في ايڪڙ سائو گاهه ملي ٿو.



انب - Mango

نئين باغ لڳائڻ لاءِ سڀ کان پهرين جنهن زمين ۾ باغ لڳائڻو هجي ان زمين جي مٽي چڪاس ڪرائڻ گهرجي. مٽي چڪاس لاءِ زراعت کاتي حڪومت سنڌ جون مٽي ۽ پاڻي جي چڪاس واريون ليبارٽريون اڪثر ڪري هر ضلعي ۾ موجود آهن. جتان آسانيءَ سان پنهنجي زمين جي مٽي چڪاس ڪرائي سگهجي ٿي.

مٽيءَ جي چڪاس مان پتو پوندو ته اها زمين انبن جي باغ لاءِ ڪيتري مناسب آهي ۽ ان زمين کي ڪهڙي طرح تيار ڪري باغ لڳائجي. ان کان علاوه ڪهڙا ۽ ڪيتري مقدار ۾ پاڻ ڏيڻ گهرجن.

باغ لڳائڻ جو وقت:

باغباني جون مدون:

1. بهار جي موسم (فيبروري کان مارچ)	2. سرءُ جي موسم (آگسٽ کان سيپٽمبر)
بهار جي موسم ۾ انبن جو باغ لڳائڻ نسبتاً بهتر خيال ڪيو وڃي ٿو. ان موسم ۾ ٻوٽو سٺل هوندو آهي. ۽ نرسري کان باغ لڳائڻ واري زمين ۾ منتقل ڪرڻ سان نقصان جو انديشو گهٽ ۾ گهٽ هوندو آهي. پر منتقليءَ جي ڪجهه عرصي کانپوءِ گرم ۽ خشڪ موسم شروع ٿي ويندي آهي. جنهن ۾ انهن ننڍين چڪين جي حفاظت ۽ پاڻيءَ جي ضرورت جو خيال رکڻ گهرجي. ته جيئن گرم موسمي اثر ۽ پاڻي جي کوٽ سبب مري نه وڃن. اهڙي طرح وري سرديءَ جي موسم شروع ٿيڻ ۽ ڀاري ڀوڻ کان پهرين ٻوٽا زمين ۾ پنهنجون پاڙون مضبوط ڪري وٺندا آهن. جنهن جي ڪري انهن ۾ ڀاري کان بچاءُ جي طاقت ججهي ٿي ويندي آهي. پر پوءِ به ڀاري ٻوٽن وارن ڏينهن ۾ حفاظت جي ڪاڻ نئين ٻوٽن کي ڍڪڻ گهرجي. باغ جو سٺاءُ: انبن جي باغ لڳائڻ لاءِ قطار کان قطار ۽ چڪي کان چڪيءَ جي وچ ۾ هڪ جيترو مفاصلو رکڻ گهرجي. ۽ اهڙي طريقي لڳايل باغ ۾ ان جي ننڍي عمر دوران ٻيا فصل ٻوڪڻ ۾ به آساني ٿئي ٿي. باغ لڳائڻ وقت اهو احتياط ضروري آهي ته ننڍي قد ۽ گهٽ گهير واريون جنسون (نيلم، امر پالي، رتنا، محموده، ملڪه، سينسيشن، دسهڙي ۽ انور رتول وغيره 7x7 کان 9x9 ميٽر - 23x23 کان 30x30 فوٽ) جي مفاصلي ۽ وٽيڪ گهير واريون جنسون جهڙوڪ؛ لنگڙو، سنڌڙي، چونسو، فجري ۽ ثمر بهشت وغيره 12x12 ميٽر کان 40x40 فوٽن جي مفاصلي تي لڳائجن. نئين چڪين کي سنهين نالين ذريعي ننڍا چلها ٺاهي پاڻي ڏنو وڃي ته وٽيڪ بهتر آهي. چاڪاڻ ته باغن ۾ ٻيو فصل ٻوڪي پاڻي ڏيڻ سان وڻ پاڙون ڀري ڀري هٿن ٿا. جنهن جي ڪري بعد ۾ تيار باغ وارن وٽن کي وٽيڪ خوراڪ ۽ پاڻيءَ جي گهرج ٿئي ٿي.	

چڪين جو في ايڪڙ تعداد:

7x7 ميٽر = 72 چڪيون	9x9 ميٽر = 48 چڪيون	12x12 ميٽر = 24 چڪيون
---------------------	---------------------	-----------------------

ڪڏا کوٽڻ ۽ چڪيون لڳائڻ:

باغ لڳائڻ لاءِ زمين ۾ نشان لڳائڻ کانپوءِ انهن جڳهن تي 3 فوٽن جا ويڪرا ۽ 3 فوٽ اونها ڪڏا کوٽڻ وقت کڏي جي مٿئين اڌ فوٽ جي مٽي هڪ طرف ڪري رکڻ. ۽ کٽن کي 3 کان 4 هفتن جي لاءِ کليل ڇڏي ڏيو ته جيئن هوا ۽ اس لڳڻ سان کڏي ۾ موجود جراثيم ختم ٿي وڃن.

ڪڏو ڀرڻ وقت مٿين حصي واري مٽي ۽ هڪ حصو گربل سڙيل وٽاڻ جو پاڻ ۽ هڪ حصو لٽ ۽ 3 ڪلوگرام سنگل سپر فاسفيٽ ۽ 3 ڪلوگرام جيسم ملاني کڏي کي زمين جي سطح کان 4 کان 6 انچ

مٽي ٽائين پريو ته جيئن پاڻي ڏيڻ کانپوءِ مٽي ويهي زمين جي سطح تي بيهي. ان کانپوءِ ڪڏن تي پاڻي ڏيو ۽ وٽ اچڻ تي ڪڏن ۾ هڪي گڏ ڪري ٻيهر پاڻي ڏيو ۽ ٻيهر اچڻ تي ڪڏن تي چڪين جي مناسب سان کوٽي انهن ۾ چڪيون ويهاريو.

پاڻ ڏيڻ جو طريقو:

پاڻ ٿڙ جي ڊڪي سميت هڪ فوٽ چڙهي ڪري وٽ جي چوڌاري گهٽ ۾ گهٽ ڏيڍ ميٽر اندر چٽي گڏ ڪجي. ۽ گڏ کان پوءِ فوري پاڻي ڏجي. پاڻ ڏيڻ کان پهرين وٽ جي ٿڙ سان اٽڪل منو فوٽ مٽي چاڙهي ته جيئن ٿڙ کي سڌو سنئون پاڻي نه لڳي.

انٺ جي باغ لاءِ ڪيميائي پاڻن جون سفارشون			
وٽن جي عمر	بور اچڻ کان اڳ	انٺيون ٺهڻ کانپوءِ	انٺ پڻڻ کانپوءِ
2 کان 5 سال	هڪ ڪلوگرام يوريا يا پوٽا 2 ڪلوگرام امونيم نائٽريٽ	هڪ ڪلوگرام يوريا يا پوٽا 2 ڪلوگرام امونيم نائٽريٽ	30 ڪلوگرام ڊيسي پاڻ ۽ اڍائي ڪلوگرام سنگل سپرفاسفيٽ ۽ منو ڪلوگرام پوٽاش وارو پاڻ
5 کان 10 سال	ڏيڍ ڪلوگرام يوريا يا اڍائي ڪلوگرام امونيم نائٽريٽ ۽ هڪ ڪلوگرام پوٽاش وارو پاڻ	ڏيڍ ڪلوگرام يوريا يا اڍائي ڪلوگرام امونيم نائٽريٽ ۽ هڪ ڪلوگرام پوٽاش پاڻ	50 ڪلوگرام ڊيسي پاڻ ۽ 3 ڪلوگرام سنگل سپرفاسفيٽ ۽ هڪ ڪلوگرام پوٽاش وارو پاڻ

نوٽ: پاڻ ڏيڻ وقت زمين جي قسم کي ڏيان ۾ رکڻ گهرجي. ان لاءِ جيڪڏهن زمين ڀلي هجي ته يوريا ڏيڻ گهرجي ۽ جيڪڏهن زمين پڪي ۽ گهري هجي ته ان ۾ امونيم نائٽريٽ ڏجي. **قوھاري ذريعي پاڻ جو استعمال:** انٺن جي باغ جي زمين ۾ پاڻ ڏيڻ سان گڏ هيٺين پاڻن جا به قوھارا پهريون بور اچڻ کان اڳ ۽ ٻيو انٺيون ٺهڻ بعد ڪرڻ گهرجن. انهن پاڻن جي قوھاري سان نه صرف ميو جي معيار ۽ پيداوار ۾ اضافو ٿيندو پر وڌيڪ بور ۽ ميو اچي ٿو. پوٽاشيم نائٽريٽ (قلمي شورو) 2 ڪلوگرام، زنڪ سلفيٽ 250 گرام، فیرس سلفيٽ 200 گرام، ڪاپر سلفيٽ (نيرو توتيو) 200 گرام، بورڪ ايسڊ (سهاجو) 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي وٽن تي قوھارو ڪجي.

نوٽ: قوھارو ڪرڻ دوران جيڪڏهن مينهن پوڻ جو انديشو هجي ته پوءِ قوھاري ڪرڻ جو وقت مٽائجي ۽ قوھارو ٿڌ واري وقت تي ڪجي.

گڏ يا ڌڙ:

گندگاهه جي خاتمي، جيتن ۽ بيمارين جي شدت کان بچڻ ۽ زمين کي هوارار رکڻ لاءِ ضروري آهي ته باغ ۾ گڏ يا ڌڙ جو عمل ضرورت مطابق ڪجي. ننڍي باغ ۾ وٽن جي قطارن جي وچ ۾ روٽا ويٺر هڻي وٽن جي ڀر ۾ ڪوٽر سان اهڙي طرح گڏ يا ڌڙ ڪجي جيئن وٽن جي ٿڙن يا پاڙن کي زخم هرگز نه رسي.

پاڻي ڏيڻ: انٺن جي باغ ۾ پاڻي بور اچڻ کان هڪ مهينو اڳ بند ڪجي ۽ جڏهن ميوو چٽي جيترو ٿي وڃي ان کانپوءِ هر مهيني باقائده پاڻي ڏجي ڇو ته ميو جي واڌ ويجهه لاءِ پاڻي جي ضرورت گهڻي هوندي آهي. ان ڪري سٺي پيداوار حاصل ڪرڻ لاءِ پاڻي جو صحيح ۽ وقتائو استعمال ضروري آهي. پاڻ ڏيڻ وقت جلد پاڻي ڏنو وڃي ته جيئن خوراڪي جزا جلد پاڻي ۾ ڳري جذب ٿي وڃن. پاڻيءَ جي وقفي ۾ گرمي، سردي ۽ زمين جي قسم کي به نظر ۾ رکڻ گهرجي.

نقصانڪار جيت ۽ انهن جو تدارڪ: انٺ جي وٽن تي ڪيترن ئي قسمن جا جيت حملو ڪري ڳوٺن ڪرڻ کان وٺي ميو پڇڻ تائين نقصان پهچائڻ ٿا. انهن مان اهم نقصانڪار جيتن جو ذڪر هيٺ ڏجي ٿو.

انڊ جو مهلو يا تيلو (Mango Hopper):



هي جيت ٽڪڙي قسم جو ٿيندو آهي. جيڪو هلڻ ۾ تمام تيز ۽ چست هوندو آهي. هن جيت جا 3 قسم ٿيندا آهن. جيڪي انهن جي نون گونچن ۽ پور نڪرڻ وقت حملو ڪري پنن جي واڌ ويجهه کي ڪافي متاثر ڪن ٿا. انڊ جي تيلي يا مهلي جو اصل گهر انڊ جو ٿڙ هوندو آهي. ان لاءِ اڳواٽ بچاءُ طور اسان کي انڊ جي وڻ جي ٿڙ کي چڱيءَ نموني ڦوهارو ڪرڻ گهرجي. هي جيت گهڻي گرمي يا سرديءَ جي وقت انهن جي ٿڙ جي پورن يا چوڻن جي ڦوٽن ۾ لڪي ويندو آهي. گرم جهڙالي موسم هن جيت جي واڌ ويجهه لاءِ موزون آهي.

هن جيت جي هڪڙي مادي 60 کان 200 آنا لاهيندي آهي. انن مان چئن کان ستن ڏينهن اندر ٻچا نڪري ايندا آهن. هن جيت جي حملي سبب انهن ۾ ماکي جهڙو ليس دار مادو ڏسڻ ۾ ايندو جنهن تي مٽي لڳڻ کانپوءِ ڪاري گر (Sooty Mould) واري بيماري ٿي پوندي آهي. جنهن ڪري پنن ۽ پور جو رنگ ڪارو ٿي ويندو آهي.

نقصان جو وقت: هن جيت جو حملو سڄو سال رهي ٿو. اڪثر ڪري گهڻو حملو فيبروري کان اپريل تائين رهي ٿو، پر مينهن واري موسم ۾ جولاءِ ۽ آگسٽ تائين به ڪافي حملو رهي ٿو.

ٿرڙو (Thrips):



هي جيت رنگ جو ڪارو ۽ پورو ناسي سنهڙو لڪير وانگر هوندو آهي. هن جيت جا بالغ ٿوڙي ٻچا پنن جي هيٺئين پاسي نسن جي ڀرسان پنن مان رس چوسيندا آهن. حملي آور پنن تي اڇاڻ مائل پورا داغ نظر ايندا آهن. شديد حملي جي صورت ۾ پن سڪي ختم ٿي ويندا آهن. هن جيت جو حملو نون نڪتل پنن ۽ گونچن تي

وڌيڪَ نظر ايندو آهي. جنهن ڪري انڊ جي واڌ رڪجي ويندي آهي.

نقصان جو وقت: انهن تي هن جيت جو حملو سڄو سال رهي ٿو، پر اپريل جي آخر کان جون مهيني تائين حملو وڌيڪَ رهي ٿو.

چوٽيءَ وارو ڪينئون (Shoot Borer):



هن جيت جو ڪينئون انهن جي نون نڪتل ٿارين کي (مٿان کان هيٺئين طرف) نقصان ڏيندو آهي. هن جو حملو نون ٿارين تي ٿئي ٿو. هي ٿارين جي وچ وارو نرم حصو کائيندو آهي. هن جي حملي ڪري نين ٿارين جي مٿان پن مرجھائجي ويندا آهن. ۽ آخرڪار حملي آور ٿاريون سڪل ۽ ڪاريون نظر اينديون آهن.

ڦردار انهن تي جيڪڏهن هن جيت جو حملو ٿئي ٿو ته اهي انڊ ميوڙي ڏيڻ جي قابل نٿا رهن. نقصان جو وقت: هي جيت جولاءِ کان نومبر مهيني تائين وڌيڪَ نقصان ڏئي ٿو.

ٿڙ وارو ٽنڊڻ (Trunk Borer):



هن جيت جو بالغ ڊگھين ٽنگن ۽ وڏين مڇن (Antennae) سان ناسي ميرانجهڙي رنگ جو ٿئي ٿو. سندس پرن تي گهرا اڇا نشان هوندا آهن. هن جا ٻچا هلڪي پيلي رنگ جا ۽ سندس مٿو ڪارو



هوندو آهي. جنهن جي مند سان وڻ جون پهريان
ٿاريون سڪڻ شروع ڪنديون آهن. ۽ آخر ۾ سڄو
سڪي ختم ٿي ويندو آهي.
نقصان جو وقت: هن جيت جو حملو سڄو سال رهي
ٿو. پر هي جيت برسات جي موسم ۾ وڌيڪ نقصان
رسائي ٿو.

ميوِي واري مک (Fruity Fly):

انڊ جي ميوِي واري مک عام مک (گهريلو) کان ننڍي هوندي آهي. هن جي بالغ جون رنگ چمڪندڙ
خاڪي ٿئي ٿو. هن جون مکيون ميوِي اندر انا لاهينديون آهن. جيڪي ٻن ٽن ڏينهن اندر ڦٽي ايندا آهن.
هن جيت جو حملو انڊ جي سڀني جنسن تي ٿئي ٿو. پر ڀاڄائين جنسن جهڙوڪ؛ بيگن پالي، سورنيڪا
تي تمام گهڻو رهي ٿو.

هن جيت جا صرف ٻچا (Maggot) نقصان ڏيندا آهن، جيڪي اڇي رنگ جا سنها ٿيندا آهن. ميوِي
اندر ڳر ڪي ڪاٺي ميوِي کي ختم ڪري ڇڏيندا آهن. آخرڪار ميوو هيٺ ڪري پوندو آهي. جڏهن
وڻ ٿيندو آهي ته ڪل مان ٻاهر نڪري زمين تي ڪري سوپڻ ٿي ويندو آهي. هن جيت جا ڪيائون 6
کان 29 ڏينهن زمين ۾ سوپڻ جي شڪل اختيار ڪندا آهن. سوپڻ مان 44 ڏينهن اندر بالغ نڪري
ايندو آهي.

نقصان جو وقت: هن جيت جو حملو جون-جولاءِ ۾ وڌيڪ رهي ٿو يا جيستائين انين جي پٺاڻي
مڪمل ٿئي.

انڊن جو ميرانجهڙو منگهڻ/ميلي بگ (Mango Mealy Bug):



ميلي بگ تراڪڙي اٺي جهڙو جيت ٿيندو آهي. هن جي مادي
جا پر اڇي پائونڊر سان ڍڪيل هوندا آهن. پاڻ اندر گلابي
ميرانجهڙو هوندو آهي. هن جي مادي زمين تي ڳوٺري ۾ انا
لاهي پوءِ مري ويندي آهي. هن جا نر ڪارن ٻرن سان هوندا
آهن. هن جيت جي ٻچي جو حملو نون نڪتل پنن ۽ ڳوٺن تي
رهي ٿو. هي جيت لئه دار مادو خارج ڪندو آهي. جنهن
ڪري پنن تي ڪاري ڳر واري بيماري ٿي پوندي آهي. ان
صورت ۾ ٻوٽي ۾ خوراڪ ٺهڻ جو عمل رڪجي ويندو آهي.

ميلي بگ جي حملي کان بچاءُ لاءِ نومبر مهيني کان پاڻي ڏيڻ کانپوءِ وڻن جي چوڌاري زمين کان 4
فوت مٿي پلاسٽڪ ويڙهجي ۽ پوءِ ان کي گريس هنيو وڃي. يا جتي نظر اچي ته لارسيبن 150 ملي
لٽر 100 لٽر پاڻيءَ ۾ وجهي ڦوهارو ڪرڻ گهرجي. زمين ۾ بهتر نموني سان هر ڦار ڪريو ته جيئن
زمين ۾ لڪل ٻچا اس ۾ مري ختم ٿي وڃن.

نقصان جو وقت: هن جيت جو حملو سڄو سال رهي ٿو ۽ مارچ کان مئي تائين وڌيڪ حملو ٿئي ٿو.

سرنگهه وارو ڪينئون (Leaf Minor):



هن جيت جو ڪينئون گلابي رنگ جو ٿيندو آهي ۽ جڏهن
انين ۾ نوان ڳوٺج يا پن نڪرندا آهن ته انهن تي حملو ڪندو
آهي. حملي دوران جهلي يا پردو ٺاهي ان اندر کاڌ ڪندو
رهندو آهي. ۽ سڄي پن کي اندرو اندر کاڌي پرڻ ڪري
سڪائي ڇڏيندو آهي. ۽ ان سان گڏوگڏ سنهين ڏانڊين تي پڻ
حملو ڪندو آهي.

نقصان جو وقت: هن جيت جو حملو آڪٽوبر کان نومبر
تائين ۽ جنوري کان مارچ تائين ٿئي ٿو.

چلر وارو جيت (Scales):



هي جيت رنگ جا خاڪي ڳاڙهسري چار جهڙي شڪل ۽ سخت جسم جا ٿيندا آهن. هن جيت جا نر (Male) تمام گهٽ هوندا آهن. هن جيت جي مادي جنسي ميلاپ کانسواءِ (Parthenogenesis) جي عمل ذريعي واڌ ڪندي آهي. هن جا انا ڳوٺري ۾ هوندا آهن جن مان گرم موسم ۾ 24 ڪلاڪن اندر ٻچا نڪري ايندا آهن. هي جيت پنن ۽ ٿارين تي چنڀريل نظر ايندا آهن. هي جيت پنن، ٿارين مان رس چوسيندا آهن. حملي آور پن، ٿاريون، انڙيون، پيلي رنگ جون ٿي چڻي وينديون آهن. جنهن ڪري انب جي پيداوار تي برو اثر پوندو آهي.

نقصان جو وقت: هن جيت جو حملو سڄو سال رهي ٿو.

چوڏي واري تنبٿي (Bark Beetle):



چوڏي واري تنبٿي سنڌ ۾ انبن جي تباهه ڪندڙ بيماري ڦهلائي ٿي. تنبٿي ۽ بيماري ٻنهي تي آءِ پي ايم ذريعي ضابطو آڻي سگهجي ٿو. هي تنبٿي هلاڪي خاڪاڻ ماڻل يا پوري يا ميرانجهڙي رنگ جي هوندي آهي. سخت ڏانڊي، گلن ڦلن جي ٻوٽن، ميويدار علم ٻوٽن تي ڀلجندي وڌندي رهي ٿي. هي ڪاٺ جي چرپر وسيلي ۽ پنهنجو پاڻ به هڪ جاءِ کان ٻئي جاءِ ائين منتقل ٿيندي رهي ٿي. قديم ۾ باريڪ آهي. مٿس وڻن ۽ ٻوٽن ۾ شروعاتي حملي دوران ڪي خاص اهڃاڻ نظر نه ايندا آهن. مادي

تنبٿي جي چرپر ۽ نقصان سببن وڻن جي ٿڌ جا چوڏا چيريل ۽ منجهن سنهڙا سوراخ نظر ايندا آهن. هن تنبٿي سان جراثيم جا مختلف قسم به گڏوگڏ رهندا آهن. جن کي مادي تنبٿي پاڻ سان گڏي ٻين وڻن تائين پهچائي ٿي. تنبٿي جا ٻچا توڙي بالغ فجاج ڪي بطور خوراڪ ڪتب آڻيندا آهن ۽ وڻن کي تنبٿي ايندڙ نقصان نٿي رسائي، جيترو مختلف قسم جي جراثيم سان ٿئي ٿو. پر تنبٿي پاران سوراخ ٿيل سببن فجاج وڻن جي ٿڌن ۽ ٿارين تائين وڃن ٿا. انبن جي آبادگارن کي صلاح ٿي ٿجي ته هو انبن جي باغن کي صحتمند رکڻ لاءِ ڪڏ خوراڪ، پاڻي جي کوٽ ۽ هر قسم جي زخم وغيره کان وڻن کي بچائين. شديد مٿس وڻن کي ڪڍي ختم ڪجي. تنبٿي جي ختمي لاءِ سال ۾ 3 دفعا مارچ، جولاءِ ۽ آڪٽوبر مهيني ۾ ٿڌن تي ڏيرپا اثر رکندڙ پيرائٽرنيڊ گروپ جي دوا جهڙوڪ، ٿالڊار 200 سي سي 100 لٽر پاڻي ۾ يا لارسيپن 150 ملي لٽر 100 لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي ٿڌن تي چڱيءَ طرح ڦهاريو ڪجي. جيئن اهي تنبٿي ۽ فجاج جي واڌ جو سبب نه بڻجن.

جيئن جو ضابطو: عام طرح سان جيئن جي ضابطي لاءِ انبن تي ٻن مرحلن ۾ ڦهاريو ڪيو ويندو آهي. هڪ انبن جي پٺاڻي کان پوءِ سڪل ٿاريون، گڏ، پاڻ ۽ پاڻي وغيره ڏيڻ کانپوءِ يعني آگسٽ-سيپٽمبر وارن مهينن دوران جيئن ڦوٽهڙي دوران نقصان ڏيندڙ جيئن کان بچاءُ ٿي سگهي ٿو ۽ ٻيو ڦهاريو ٻور ٺهڻ کان اڳ ۾ يعني ڊسمبر يا جنوري دوران ڪيو ويندو آهي. نون ڪيل تجربن جي روشنيءَ ۾ جيئن ۽ بيمارين جي ضابطي لاءِ هيٺين سفارشن تي عمل ڪري وڌيڪ فائدو ماڻي سگهجي ٿو.

1. پهريون ڦهاريو آگسٽ کان سيپٽمبر دوران جيت مار دوا سان گڏ ڪنهن ڪاپر گروپ جي دوا ملائي ڦهاريو ڪرڻ گهرجي. ته جيئن سوڪهڙي (Anthracnose) ۽ پنن جون ٻيون بيماريون ختم ٿي وڃن.

2. ٻيو ڦهاريو بهتر ان وقت ٿيندو. جڏهن انب ۾ ٻور ٺهڻ شروع ٿئي ۽ ٻور مڪمل نه نڪتو هجي يعني جنوري مهيني دوران مهلي واري دوا سان اڇي سينور (Powdery Mildew) واري بيماري کان بچاءُ لاءِ دوا ملائي ڦهاريو ڪرڻ گهرجي. ڇو ته ٻوٽي ۾ مهلي ۽ اڇي سينور جي خلاف انبن ۾ مدافعت رهندي آهي ته اڳتي اهي بيماريون گهٽ حملي آور ٿين.

3. عام روايت رهي آهي ته جيڪڏهن جيت ۽ بيماريون ٻور دوران حملو ڪن ٿا ته ڪنهن دوا جو تيسائين ڦهاريو نه ٿو ڪيو وڃي جيستائين انڙيون چڻي جيتريون نه ٿي وڃن. پر انبوا جي تبديلي جي ڪري نيون بيماريون ۽ جيت ٻور اچڻ دوران حملي آور ٿين ٿا. جهڙوڪ مهلو (Mango Hopper) ۽ اڇي سينور واري بيماري (Powdery Mildew) جيڪي اڪثر فيبروري مهيني ۾ اچي انبن کي نقصان رسائين ٿا. تحقيق جي روشنيءَ ۾ اهو مشاهدو ڪيو ويو آهي ته ٻور دوران جيڪڏهن بيمارين ۽

جيت جو نالو	سفارش ڪيل دوا	وزن 100 لٽر پاڻيءَ ۾
1. مهلو (هاپر)	ڪراٽي يا ڪونفيڊور يا اڪٽارا يا لارسبين	50 سي سي 100 لٽر پاڻيءَ ۾ 100 سي سي 100 لٽر پاڻيءَ ۾ 10 گرام 100 لٽر پاڻيءَ ۾ 150 سي سي 100 لٽر پاڻيءَ ۾
2. ٿرڙو	ڪنفيڊور يا ڪلوروفيناپائر	100 ملي لٽر 100 لٽر پاڻيءَ ۾ 30 کان 35 ملي لٽر 100 لٽر پاڻيءَ ۾
3. چوٽيءَ وارو ڪينئون	ڪراٽي يا ٽالسٽار يا لارسبين	50 سي سي 100 ملي ليٽر 150 ملي ليٽر
4. ميو جي مک	ليزر يا ڊپريڪسن	250 ملي ليٽر 100 کان 160 گرام 100 لٽر پاڻيءَ ۾
5. ميرانجهڙو ميلي بگ، چلر وارو جيت	لارسبين يا ڪيوراکران يا ايسوفيت	150 ملي لٽر 100 لٽر پاڻيءَ ۾ 150 کان 200 سي سي 100 لٽر پاڻيءَ ۾ 200 گرام 100 لٽر پاڻيءَ ۾
6. سرنگهه وارو ڪينئون	باء فيٽرين يا ٿريسر	150 ملي لٽر 100 لٽر پاڻيءَ ۾ 20 ملي لٽر 100 لٽر پاڻيءَ ۾
چوڏي واري ٽنڊڻي	ٽالسٽار يا بائيفينٿرين لاسبين	200 سي سي 100 لٽر پاڻيءَ ۾ 150 ملي ليٽر 100 لٽر پاڻيءَ ۾

4. جيتن جو حملو نظر اچي ته سفارش ڪيل دوائن جو ڦوهارو ڪري سگهجي ٿو. پر ڦوهارو جي نوزل کي اهڙي طرح سبٽ ڪجي جيتن اهو بلڪل سنهون ڦوهارو ڪري ۽ ڦوهارو اهڙي طرح ڪجي جيتن پريشر سان ڦوهارو ٻور يا هلڪي ڍاڻ کي ڇاڻي نه وجهي پر مٿان رڳو اچي ڪري. نوٽ: ميو واري مک جي ضابطي لاءِ دوائن کان علاوه جنسي ڦٽن (Sex Pheromones) وارو طريقو پڻ ڪامياب ثابت ٿيو آهي. هن طريقي ۾ 8 ڦٽا في ايڪڙ مارچ کان آگسٽ مهينن ۾ باغ اندر 6 فوٽن جي اوچائيءَ تي وڻن جي چٽو ۾ ٻڌا وڃن.

جن ۾ موجود خوشبوءِ تي به ميو جي مک جون نر مکيون ميل جي چوڻين حصي کان ڊوڙي اچي ان ۾ ڦاسي مري وينديون. هنن ڦٽن ۾ موجود دوا جو اثر ٻه مهينن تائين رهي ٿو. جڏهن ته ڊبن ۾ موجود ٻُڙن ۾ هر مهيني دوا وجهڻ گهرجي.

ميو جي مک کي ضابطي هيٺ آڻڻ لاءِ هميشه باغن جي صفائي چڱي نموني ڪرڻ گهرجي ۽ ڪريل، سڙيل ۽ ڪني ٿيل ميو جي باغ مان چونڊي ڪنهن پلاسٽڪ جي ڪٽي يا ٿيلهي ۾ وجهي باغ کان ٻاهر دفنائڻ گهرجي يا ساڙڻ گهرجي. ائين ڪرڻ سان ڪني ميو جي ۾ جيڪي ميو جي مک جا ٻچا هوندا اهي جوان ٿي ٻاهر نڪري حملو ڪري نه سگهندا.

اچو سينور (Powdery Mildew):

هن بيماريءَ جي ڪري پٺن، ڏانڊين ۽ ٻور تي اچي خاڪي رنگ جا داغ ٿي پوندا آهن. هن بيماريءَ جون نشانين گهڻو ڪري فيبروري ۽ مارچ مهينن ۾ ظاهر ٿينديون آهن. ان لاءِ باغ ۾ چڪاس ڪبي رهجي ۽ بيماري نظر اچڻ شرط ڪنهن ويجهي زرعي ڪارڪن جي صلاح سان يا ٽاپسن ايم 100 گرام 100 لٽر پاڻيءَ ۾ يا بيٽان فوليئر 50 سي



سي 100 لٽر پاڻي ۾ يا اسڪور 50 سي سي 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي ڦوهارو ڪجي.



انٺ جو ڪوڙهه (Anthracnose):

شروعات ۾ هن بيماريءَ جي حملي ۾ وڻن جا پن ڪنارن کان سڪڻ شروع ڪن ٿا. ۽ آهستي آهستي هيءَ بيماري نئين شاخن تائين پکڙجي وڃي ٿي ۽ وڻ مٿان کان هيٺ سڪڻ لڳن ٿا.

هن بيماريءَ جي نقصان کان بچڻ واسطي سال ۾ ٻه ٽي دفعا ٽاپسن ايم 100 گرام 100 لٽر پاڻيءَ ۾ يا ڪنهن به ڪاپر گروپ جي دوا جو ڦوهارو ڪرڻ گهرجي.



ڪربوڪ (Malformation):

هي بيماري پور تي لڳي ٿي. جنهن ۾ انٺ جو پور ڇڄڻ جي صورت ۾ ڳوڙهو ٿي وڃي ٿو ۽ ميوو نٿو ٺهي. هن بيماريءَ جي نقصان کان بچڻ واسطي هر سال ميوو ختم ٿيڻ شرط ڇانگ ڪرڻ گهرجي. جڏهن ته حملي وقت بيماري وارين ٿارين جي مٿاڇر ٿيل حصن کي 6 کان 8 انچ صحتمند شاخن سميت تيز اوزار سان ڪپي ساڙي ڇڏڻ گهرجي. زمين جي چڪاس ڪرائجي ۽ سفارش ڪيل خوراڪ جو بندوبست ڪجي.

انٺن ۾ سوڪهڙي واري بيماري (Mango Decline):



اڄڪلهه هي مرض عام ٿي رهيو آهي. جنهن سبب جي ڪري وڻن جا وڻ سڪي سڙي رهيا آهن. هي مرض هڪ فنڪس جي جراثيم (Lasi odiploidathebromoe) وسيلي پکڙجي ٿو. هي جراثيم وڻن جي ٿڙ ۽ شاخن اندر پنن کي کاڌو رسائيندڙ نالين کي بند ڪري ڇڏين ٿا. جنهن ڪري پنن ۽ ٿارين کي کاڌي ۽ پاڻي جي رس بند ٿيو وڃي ۽ پوءِ اهي ٿاريون يا وري سڄو وڻ سڪيو وڃي. وڻن جي

تجزيي دوران مٿاڇر وڻن ۾ ٿڙ جي ڪل اندر ججهي انداز ۾ ننڍڙيون ننڍڻيون نظر اچن ٿيون.

هنن ننڍڻين جي جسم ۽ پيٽ ۾ مومار فنڪس ٿئي ٿو. وڻن جي اندر بيماري پهچائڻ جو عمل دخل انهن ننڍڻين جو آهي. ننڍڻيون وڻن ۾ سوراخ ڪن ٿيون، ته انهن مان ڪونر جهڙو بدبودار رس ٻاهر نڪري ٿو ۽ ٿڙ تي ڳوڙها (Gummosis) ٺهيو وڃن. تجربن دوران کاڌي وارين نالين ۾ ڪجهه ٻيا جراثيم پڻ نظر آيا. جنهن ۾ هڪ قسم فيوزيريم جو پڻ موجود هو. انهيءَ جي وڌڻ ۽ ٻنهي جراثيمن جي گڏجڻ ڪري حملو وڌيڪ شديد ٿي سگهي ٿو.

سفارشون : علاج کان احتياط بهتر آهي، جيڪڏهن باغ جي سار سنڀال سٺي هوندي ۽ ان کي سفارش ڪيل طريقي سان پاڻي، پاڻ، وقت سر ڦوهارو ڪرڻ، وڻن جو وڌيڪ مفاصلو رکڻ، انٺن جي وڌڻ باغن ۾ ٻيا فصل نه پوکڻ ۽ گندگهڻ کي ملچ طور استعمال سان وڻن ۾ بيماريءَ کان بچاءُ ڪري سگهجي ٿو.

- ڪيميائي پاڻ جو مرحليوار پورو بنو وزن ڏيڻ گهرجي.
- باغ ۾ موجود گندگهه ۽ ڪڪن پٺن کي ڪي آبادگار گڏ ڪري باهه ڏيئي ساڙين ٿا. جڏهن ته ماهرن جي مشوري مطابق ائين هرگز نه ڪرڻ گهرجي. بلڪه گندگهه ۽ ڪڪن پٺن کي گڏ ڪري زمين ۾ ملائي ڇڏجي ته جيئن طاقتور ٿئي ۽ باغ زور وٺي.
- سياري جي موسم ۾ وڻن کي وڌيڪ پاڻي ڏيڻ کان پاسو ڪجي. جنهن ڪري باغن ۾ ربيع وارا فصل هرگز نه پوکڻ گهرجن.
- انٺن جي وڻن جون پاڙون ڪوئي ظاهر ڪري ريومل گولڊ يا ايليٽ 250 گرام 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي وڻن تي استعمال ڪجي.

- متاثر وٿڻ ۾ سال ۾ 3 دفعا مهيني جي وقفي سان 50 گرام ايليت يا رڊومل گولڊ 50 گرام يا ٽاپسن ايم 50 سي سي پاڻيءَ ۾ ملائي انجڪشن رستي وٺڻ ۾ سوراخ ڪري استعمال ڪجي. تحقيق جي نتيجي ۾ ايليت جا نتيجا بهتر ڏنا ويا آهن.
- بيماريءَ کان پاڪ وٺڻ مان نئون بچ پوکجي. انهيءَ مان قلم ۽ گوشا لڳائجن، نرسري ۾ فنگس کي ناس ڪندڙ دوا استعمال ڪجي.
- بيماريءَ ۾ لڳل سڪل ٿارين/وٺڻ کي ڪپي ساڙي ڇڏجي.
- سڪل ٿارن/ڏارن کي ڪنهن تيز اوزار سان اهڙي طرح ڪچي، جيئن ڇيتون نه ٿين بلڪه موران مچ سڪل ٿار ويڃي وڃي.
- وٺڻ جي بيمار ٿارن کي چار پنج انچ صحتمند حصي وٺان تيز ڪارائيءَ سان ڪپي کڻي ڪنهن خالي زمين ۾ رکي ساڙي ڇڏجن.
- ڪپيل ٿارين وارين جاين تي بيٺل وٺڻ ۾ ڪنهن ماهر جي صلاح سان بورڊيڪس مڪسچر جي پيسٽ ٺاهي لڳائجي يا وري ڦٽڪي مار دوا هڻجي.
- بيجارو تيار ڪرڻ لاءِ بيمار وٺڻ جون ڪڪڙيون يا قلم هرگز استعمال نه ڪرڻ گهرجن، ڇاڪاڻ ته انهن ڪرڻ سان بيماريءَ پکڙڻ جو خطرو رهندو.
- ٿڙ کي سال ۾ ٻه دفعا بورڊيڪس مڪسچر لڳايو وڃي.
- باغن جي اندر ٻيا فصل پوکڻ کان پاسو ڪجي.
- وٺڻ کي ڪنهن به قسم جو زخم نه اچڻ گهرجي. جيئن جراثيمن کي حملي ڪرڻ جو ڪوبه موقعو نه ملي.
- ننڍڻين ۽ متاثر ٿيل وٺڻ تي ضابطو آڻڻ لاءِ زرعي ماهرن سان رابطو رکجي.
- ڇوڏي واري ننڍڻي کي ناس ڪرڻ لاءِ متاثر ٿيل ٿڙ کي ماهر جي راءِ سان ڪنهن مناسب دوا جو ڦوهارو ڪجي ۽ ٿڙ کي وقفي وقفي ڊبريا يا گهٽي وقت تائين زهريلو اثر رکندڙ پيرائينڊ يا پرمٿرين 100 سي سي 100 لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي مارچ، جولاءِ ۽ آگسٽ ۾ ٿڙ کي ڦوهارو ڪيو وڃي.
- متاثر وٺڻ اندر اهڙين ڦٽڪي مار دوائن جو استعمال ڪجي جيڪي ڪنهن نظام تحت وٺڻ جي متاثر ٿيل حصي تي ضابطو آڻين.
- زرعي دوائون زهر آهن. تنهن ڪري صرف انهن کي ضرورت مطابق ماهرن جي سفارشن سان استعمال ڪجي.
- جيڪڏهن بيماريءَ سبب وٺ سڪي وڃن ته انهن کي هڪدم ڪپي ان جي جڳهه تي صحتمند نيون ڇڪيون پوکجن.
- بورڊيڪس مڪسچر تيار ڪرڻ جو طريقو ڪار: بورڊيڪس مڪسچر کي ٻن طريقن سان انهن جي باغن تي استعمال ڪيو ويندو آهي.
- ڦوهارو (Spray) 2 ڪلوگرام نيرو توتي 2 Copper Sulphate ڪلوگرام ڇن جو پٿر (Lime Stone) ۽ 200 لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي استعمال ڪجي. ڦوهارو ڪرڻ لاءِ ڳار جهڙو ڇڏو تيار ڪجي ته جيئن آسانيءَ سان ڦوهارو جي مشين واري نوزل/نالي مان نڪري سڄي وٺ کي چڱيءَ طرح سان ٽوئي سگهجي.



ڪيلو - Banana

پوکيءَ جا جديد طريقا:

دنيا اندر آسٽريليا ۽ فلپائين ۾ ڪيلي جي جديد طريقي سان پوک ڪجي ٿي. ساڳيا طريقا سنڌ اندر به آزمايا ويا آهن. ۽ پيداوار انهن ملڪن کان ڪنهن به صورت ۾ گهٽ نه آهي. يعني هڪ ڇڳي جو وزن 40 کان 50 ڪلوگرام مليو آهي. جنهن مان 40 کان 50 ٽن في ايڪڙ پيداوار ملي ٿي. هاڻي سنڌ دنيا جي ملڪن جي پيٽ ۾ ڪيلي جي پوک ۾ پوئتي نه آهي. ۽ آبادگار محنت ڪن ته ملڪ جو نالو روشن ٿي سگهي ٿو.

(الف) اپريل ڪرين وارو پوکي جو طريقو

(RAISED BED PLANTING METHOD)

(ب) پاڻي جي ڦڙي ڦڙي وارو پوکيءَ جو طريقو

(DRIP IRRIGATION SYSTEM)

هن نئين ٽيڪنالاجي تي زرعي تحقيق جا ماهر آسٽريليا ۽ فلپائين جي زرعي ماهرن سان گڏ ڪم ڪري رهيا آهن.

ڪيلي جي اپريل ڪرين واري طريقي جا فائدا:

- ڪيلي جي قطارن جي وچ واري فاصلي وڌيڪ هئڻ ڪري ڇڳن کي پرڻ لاءِ گادي (سوزڪي) وچ واري فاصلي ۾ اچي سگهي ٿي.
- ڪيلي جي نڪتل ٿڌڻن کي ٻاهر اچڻ جي ضرورت نٿي پوي.
- ڪيلي جي قطارن جي وچ ۾ اڇليل پنن کي هر 6 مهيني يوربا پاڻ جي هڪ ٻوري في ايڪڙ ڇڏڻ سان ڪڪ پن يا ٿڙيون ڳري سڙي نامياتي مادو ٺهي پوي ٿو.
- گندگاهه کي ختم ڪرڻ لاءِ گڏ يا ڍڙ نٿي ڪرڻي پوي.

(الف) اپريل ڪرين وارو پوکيءَ جو طريقو

:(RAISED BED PLANTING METHOD)

زمين جي تياري: زمين کي اونها هر چار ڦاري يا پنج ڦاري سان ڏنا وڃن انهي کان پوءِ گوبل هر هڪ پيرو هلايو وڃي ۽ پوءِ زمين کي سنوٽ ۾ اٿجي ان بعد هڪ هر ڪلٽيوپٽر جو هلايو وڃي. آخر ۾ چار فوٽ يا اٺ فوٽ ويڪرا اپريل ڪريا تيار ڪيا وڃن. هر ڪرني وچ ۾ به هڪ فوٽ ويڪري نالي تيار ڪجي نالي جي پاسن کان پنجن فوٽن جي فاصلي تي ٿيڊ فوٽ جا ڪڏا تيار ڪيا وڃن. اهي ڪڏا اهڙي نموني تيار ڪجن جو نالي جي ٻنهي پاسن کان ڪڏا آمهون سامهون نه هجن.

بوٽن لڳائڻ جو طريقو :

انهن ٿيڊ فوٽ تيار ڪيل هر هڪ ڪڏي ۾ ٻه ڪلو گرام وٽاڻ جو پاڻ وجهي پاڻي ڏجي. جڏهن ڪڏا وٽ ۾ اچن ته پوءِ هر هڪ ڪڏي ۾ 200 گرام ايس-ايس-پي ڪيميائي پاڻ ٿڙي ۾ وجهي ڪيلي جي ٻچن يا ٿڙين کي سٽو بيهاري پاسن کان مٿي وجهي پر جي ۽ پوءِ پاڻي ڏجي.

ڪيلي کي پاڻ ڏيڻ جي ترتيب :

- پهريئن مهيني ٿيڊ ٻوري ايس-ايس-پي في ايڪڙ ڏجي.
- ٻئي مهيني ۾ ٿيڊ ٻوري ايس-ايس-پي في ايڪڙ ڏجي.
- ٽن کان سائين ٽن مهينن تائين هڪ ٻوري امونيم سلفيٽ في ايڪڙ ڏجي.
- چئن کان ڇهن مهينن تائين هر مهيني ٿيڊ ٻوري امونيم سلفيٽ في ايڪڙ ڏجي.
- ستن مهينن کان ڏهن مهينن تائين هر مهيني هڪ ٻوري ايس-او-پي في ايڪڙ ڏجي.

ٻوٽن جي سار سنڀال :

- ڇهن مهينن کان پوءِ ٻوٽن جي پاسن کان اضافي بچا ڪڍي اپريل پٿريءَ جي وچ واري فاصلي تي ڇڏجن ته جيئن اهي سڙي ڳري وڃن.
- انهن نڪتل اضافي ٻڄن کي نرسريءَ طور پڻ رکي سگهجي ٿو. ان لاءِ جدا زمين جو حصو هر ڏئي تيار ڪجي. گهرج پوڻ تي ڪڍي پوک لاءِ استعمال ۾ آڻي سگهجي ٿو.
- نائين کان ڏهين مهيني تڙ مان چڱو نڪري ٿو. جڏهن چڱو تيار ٿي وڃي ته پوءِ چڱو ڪڍي تڙ جي پنن کي ڪپي قطارن جي وچ واري فاصلي تي اڇلائي ۽ تڙ کي اتي بيٺل ڇڏجي وقت گذرڻ سان گڏ اهو ڳري پاسي واري تڙ کي پاڻ طور ڪتب ايندو.
- سردي يا گرمي ۾ وچ جي فاصلي واري مٽيءَ سان نالين کي پري زمين جي سنوت ڪجي ۽ پوءِ پاڻ ٽجي.

(ب) ڪيلي جي پوک لاءِ ڦڙي ڦڙي وارو طريقو:

هن پوکيءَ جي طريقي لاءِ به زمين جي تياري اپريل ڪرين طريقي وانگر ڪجي ٿي ۽ ڪرين جو وچ وارو فاصلو 12 فوٽ رکيو وڃي ٿو. جيئن ته هن طريقي ۾ به زمين اندر گڏ يا دڙ ڪونه ٿي ڪئي وڃي. ان ڪري زمين جي هوا لاءِ اڍائي فوٽ اونجهيون ناليون پوکي واري پلاٽ جي اندران کوٽيون وڃن ٿيون رستن جي پاسن کان ٻوٽن جي قطارن جو فاصلو 6 فوٽ رکيو وڃي ٿو. ٻوٽن لاءِ ڪڏا ڏيڍ فوٽ جا 5 فوٽن جي فاصلي تي ڪرين جي پاسن کان کوٽيا وڃن ٿا. تڙين يا ٻڄن کي الف طريقي وانگر لڳايو وڃي ٿو. پر هن طريقي ۾ تڙين کي 60 ڊگري پاسيرو رکيو وڃي ٿو انهن ڪرڻ سان تڙي جي پن کان هڪ يا ٻه ٻڄا نڪرن ٿا.

هن طريقن ۾ پاڻي جو طريقو نهايت مختلف هوندو آهي. ٻوٽن کي پاڻي جي لاءِ رڙڙ جون ناليون ٻوٽن جي قطارن ڀرسان هيٺ زمين اندر پوريون وڃن ٿيون. جيڪي ويڪري پائپ لائين سان جڙيل هجن ٿيون. جڏهن ته ويڪري پائپ لائين مشين جي سرشتي سان جڙيل رهي ٿي. ڪيلي جي قطارن سان گڏو گڏ نالين مان سنهيون ڏانڊيون زمين کان ٻاهر ٿي فوٽ اوچيون نڪتل هونديون آهن ۽ هر هڪ ڏانڊي مٿان چرخی ۾ سوراخ هجن ٿا. مشين هلائڻ سان پاڻي ڦهاري وانگر ٻاهر نڪري ٿو. پر هن پوکيءَ جي طريقي ۾ ٻوٽن لڳائڻ کانپوءِ ۽ پهريان هڪ ٻه پاڻي عام رواجي طريقي سان ڏجن ٿا. جيئن ٻوٽا تڙين مان نڪري ڦٽي وڃن. انڪسواءِ اونھاري جي موسم ۾ مٺي يا جون مهينن دوران ۽ سياري جي موسم ۾ ڊسمبر ۽ جنوري دوران هڪ ٻه پاڻي عام رواجي طريقي سان ڏجن ٿا ڇو ته انهن ڏينهن ۾ گرمي جي شدت وڌيڪ ٿئي ٿي.

ڦڙي ڦڙي واري طريقي جا فائدا:

- سنڌ ۾ هيءُ طريقو پهريون دفعو متعارف ڪرايو ويو آهي.
- هن طريقي سان ٻوٽا پاڻي سان ڌوپجي وڃن ٿا ۽ ٻوٽن جي پنن تي مٺي نٿي رهي. زمين تي پوسل هنڌ ڪري هر هڪ ٻوٽي کي گهرج موجب پاڻي ملي ٿو جنهن سان ٻوٽا سٺي نموني وادو بجهه ڪن ٿا.
- ڊرپ واري مشين ٻه ڪلاڪ هلڻ سان هر هڪ ٻوٽي کي 20 ليٽر پاڻي ملي ٿو.
- عام رواجي پاڻي ڏيڻ واري طريقي جي ڀيٽ ۾ 75 سيڪڙو پاڻي جي بچت ٿئي ٿي.
- هن طريقي ۾ پاسن کان ٻوٽن جون ويجهيون قطارون ۽ وچ ۾ 12 فوٽ تي قطارون رکڻ سان هڪ ايڪڙ ۾ هڪ هزار ٻوٽن جو تعداد ٿئي ٿو.
- وچ واري قطارن جي 12 فوٽ فاصلي هنڌ ڪري ڇڏڻ کي ڪيلي جي باغ اندر کليل گاڏي ۾ آرام سان رکي سگهجي ٿو.
- قطارن جي وڌيڪ فاصلي هنڌ ڪري هر هڪ ٻوٽي جي سار سنڀال ڪري سگهجي ٿي.
- ٻوٽن کي گهريل خوراڪ ۽ پاڻيءَ جي گهرج پوري هنڌ ڪري ٻوٽا صحتمند رهن ٿا، تڙين ۾ جلد ڦڙ لڳي ٿو، ڦريون وڌيون ۽ وزن واريون ٿين ٿيون هڪ چڱي اندر ڦرين جو وڌيڪ تعداد هنڌ ڪري ڇڏڻ ڊگها ۽ وڌيڪ وزن وارا ٿين ٿا.



زیتون - Guava

زمین (Soil):

ڪرائي، وارياسي ۽ سم واري زمين کان سواءِ ٻئي ڪنهن به قسم جي زمين ۾ زیتون لڳائي سگهجي ٿو. پر عام طور لٿياسِي زمين ۾ زیتون جو فصل ڪامياب آهي ۽ ان ۾ وڌيڪ پيدائش ٿئي ٿو. پوکي جون مدون:

1. هڪ بهار جي موسم فيبروري کان مارچ 2. سرءُ جي موسم آگسٽ کان سيپٽمبر.

زمین جي تیاري ۽ کڏا تیار ڪرڻ:

باغ لاءِ زمين کي هر هٿي ڪيڻ سان سنوٽ ۾ آڻي 30x30 جي مفاصلي تي اڍائي فوٽ اونها ۽ اڍائي فوٽ ويڪرا کڏا کوڙجن. جنهن ۾ ٻه حصا لٿياسِي مٽي ۽ هڪ حصو گريل سڙيل وڻاڻ جو پاڻ چڱيءَ طرح ملائي کڏن کي پرڄي ۽ هر کڏي ۾ ڪاٺ جو ڪلو يا ڪاٺو ماپ اهر نشان طور لڳائجي ته جيئن چڪيءَ لڳائڻ وقت نشان ظاهر ٿئي ۽ قطار سڌي بيهي.

هي سڀ ڪم چڪيون لڳائڻ کان هڪ مهينو اڳ ڪجي. انهيءَ وچ ۾ کڏن کي پاڻي ٽنهي ته جيئن مٽيءَ ۾ ملايل پاڻ گرمي ڇڏي ٿو ٿئي وڃي ۽ مٽي به کڏي ۾ جمِي وڃي. تنهن کان پوءِ رهيل مٽي کڏن ۾ وجهي کڏا لتاڙي پري ڇڏجن.

جنسون (Varieties):

زیتون جون مختلف علائقن ۾ مختلف جنسون ڪامياب آهن. جن جا تفصيل هيٺ ڏجن ٿا. لاڙ ڪاٿي ضلعي جون مشهور جنسون:

1. ريالي (Riali):

هن جنس جو وڻ وچولو قد، ٻن ننڍا سوڙها، وچولو ڇٽو هٿندڙ، ميوو گهڻي نموني، کل نرم لسي، رنگ هلڪو پيلو وزن 50 کان 150 گرام مندانٽو فصل وڌيڪ پيداوار ڏيندو آهي. پيداوار 5 کان 7 مڻ ۽ مارڪيٽ ۾ ملهه سٺو آهي.

2. لوڪل سنڌي (Local Sindhi Larkana):

هن جنس جو وڻ ريالي ۽ ٽڌاراميءَ کان قد ۾ ڊگهو ٿئي ٿو. ۽ سندس ڦهلاءُ ۽ ڇٽو (Spreading) به وڌيڪ آهي. سندس ٻن ننڍو ۽ سنهو وچ تي ويڪرو ٿئي ٿو ۽ آخر ۾ سوڙهو هوندو آهي. وڻ ۾ ٿارين جو تعداد گهٽ هوندو آهي. ٿڙ جي پکيڙ وچولي هوندي آهي. شاخن ۾ ميوو جدا جدا جهليندو آهي. زیتون شڪل ۾ دلي يا گهڻي نموني يعني هيٺان ويڪرو ۽ مٿي ڳچيءَ ۾ سوڙهو هوندو آهي. ميوو جو وزن 50 کان 100 گرام، ڪاٺ ۾ مٺو، ڏانڊيدار ڳر ۾ بچ گهڻو هوندو اٿس کل جو رنگ سائي کان پيلو، مٿاڇرو لسو هوندو اٿس. پيدائش 4 کان 5 مڻ في وڻ لهندو آهي. مارڪيٽ ۾ ملهه تمام سٺو ملندو آهي. هي لاڙ ڪاٿي جي تمام ڪامياب جنس آهي.

3. ٽڌارامي (Thadha Rami):

هن جنس جو وڻ ٻين سڀني کان وڌيڪ گهاٽو ڇٽو هٿندو آهي. ٻن ڊگها ۽ ويڪرا چوٽيءَ ۾ سوڙها ٿين ٿا. ميوو جڳهين ۾ به ٻه ٽي ٿي ٿارين ۾ جهليندو آهي. هن جو ميوو اٽڪل 400 گرام تائين ڏنو ويو آهي. کل ۾ سخت، رنگ گهرو سائو ۽ ڏانڊي ۾ کٽو ٿيندو آهي. ٻنهي مندن اونهارِي ۽ سياري ۾ فصل هڪجهڙو کٽندو آهي. ميوو کي گهڻي سرديءَ ۾ ڪوڙهه جو مرض لڳندو آهي. تنهن ڪري خاصيت خراب ٿي پوندي اٿس، پيداوار 3 کان 5 مڻ في وڻ ڏيندو آهي. ڪراچي، حيدرآباد، سکر ۽ خيرپور ڊويزن جون جنسون:

مالٽو، گولو، شملو جنسن کان سواءِ ننڍي پيماني تي ميهو، ڪريلو، ونگو، سرخو گول، سفيدو، چتريدار، رمضان، الهه آبادي، فيصل آبادي، ۽ بنا بچ واريون جنسون پوکيون وڃن ٿيون.

چڪين لڳائڻ جي مند (Season of Transplanting):

چڪين لڳائڻ لاءِ بهار جي موسم يعني 15 فيبروري کان مارچ ۽ سرءُ ۾ جولاءِ کان سيپٽمبر وارا مهينا موزون آهن. چڪيون کڻڻ ۾ لڳائڻ لاءِ ڪاٺيءَ جي جاءِ تي مٽي کوٽي سندن اصل مٽيءَ جي چڪيءَ جي نشان تائين سڌيون وھارجن ۽ سندن چوڌاري دڪيون ٺاهجن ته جيئن پاڻي سڌي طرح چڪيءَ کي نه لڳي.

پاڻي ڏيڻ جو طريقو (Method of Irrigation):

پاڻي ڏيڻ لاءِ سڌيون ناليون کڻڻ کان فوٽ ٽيڊ ٻاهر هٿ گهرجن ته جيئن هر هڪ چڪيءَ کي جدا جدا پاڻي ملندو رهي.

شروعات جا ٻه ٽي پاڻي ٽڪڙا ٽڪڙا ڏجن. پوءِ اونھاري ۾ ستين ڏينهن ۽ سياري ۾ پندرهن ڏينهن پاڻي ڏيڻ گهرجي ۽ هر وقت دڪيءَ جي چوڦير گڏ ڪري گاهه وغيره ڪڍي صاف ڪري نئين سر دڪيءَ ٻڌجي. جيئن وڻ وڏا ٿيندا وڃن نئين سندن چلها ويڪرا ڪرڻ گهرجن ۽ هر مهيني گڏ (Interculturing) ڪرڻ گهرجي. جڏهن وڻ ڦر جهلڻ تي اچن تڏهن انهن جون ناليون ۽ چلها ختم ڪري ٻارا ۽ ناليون اهڙي نموني تيار ڪجن جيئن هر هڪ ٻاري کي جدا جدا پاڻي اچي. اونھاري ۾ پاڻي پندرهن ڏينهن ۽ سياري ۾ مهيني بعد ڏيڻ گهرجي. ميوو جڏهن ڀڄڻ تي اچي ته گهريل پاڻي وقت سر ڏجي ته جيئن ميوو پوري واڌ ڪري، سياري ۾ ٻارهن پاڻي ۽ اونھاري ۾ گهٽ ۾ گهٽ پندرهن پاڻي ڏيڻ گهرجن.

گڏيل پوک (Intercropping):

جيسائين وڻ وڏا ٿين تيستائين برسيم ۽ ٻيا ڦرين وارا فصل جهڙوڪ گوار، جنتر، چونڊرا وغيره پوکجن، جيڪي زمين کي نانڙوڄن مهيا ڪن ٿا.

پاڻ ڏيڻ جو طريقو (Manuring):

زيتون سال ۾ ٻه دفعا ميوو ڏيندو آهي. ۽ سڄو سال منجهس گل ۽ ميوو موجود هوندا آهن. انهيءَ ڪري زمين جي طاقت قائم رکڻ لاءِ وڻل جو پاڻ (Farm Yard Manure) ڏيڻ تمام ضروري آهي. جولاءِ مهيني ۾ مٿن کان ٽيڊ مٿن ڊيسي پاڻ في وڻ جي حساب سان زنڪ سلفيٽ (زينگرو-33 سيڪڙو) 150 کان 200 گرام في وڻ ٿڙ کان هڪ فوٽ پري ٿارين جي پکيڙ تائين ٻوٽن جي چوڌاري پکيڙي پوءِ گڏ ڪري ڇڏجي. پاڻي ڏيڻ سان پاڻ ڳرندو رهندو ۽ زمين جي طاقت وڌندي رهندي. سٺي زمين واري باغ کي هڪ ٻوري ڊي-اي-پي ۽ هڪ ٻوري يوريا ڪمزور يا سخت ۽ ڪلرائين زمين واري باغ کي ٻه ٻوريون نائٽروفاس ۽ هڪ ٻوري امونيم نائٽريٽ في ايڪڙ جي حساب سان ڏجي. ان لاءِ سمورو ڊي اي پي ۽ يوريا جو اڌ يا ٻه ٻوريون نائٽروفاس في ايڪڙ آگسٽ مهيني ۾ ڏيڻ گهرجي. جڏهن ته بقايا اڌ ٻوري يوريا يا اڌ ٻوري امونيم نائٽريٽ في ايڪڙ نومبر مهيني ۾ ڏجي.

چانگ (Pruning):



چانگ فقط ننڍن وڻن ۾ ڪئي وڃي ٿي. چاڪاڻ ته ان وقت ڪيتريون ئي شاخون هيٺان ٿڙ مان نڪرن ٿيون ۽ سنهيون ۽ ڊگهيون ٿين ٿيون ۽ ميوو جهلڻ وقت سٺ سهي ڪو نه ٿيون سگهن. هڪ طرف وڻ جي شڪل ۽ بيهڪ بري لڳي ٿي ته ٻئي طرف وڻن جي وچ ۾ هر ڏيڻ مشڪل ٿيو پوي. تنهن ڪري شروعات ۾ هر سال ننڍن وڻن جون سنهيون ٽاريون ڪجن. وڻن وڻن ۾ جيڪڏهن سڪل ٽاريون نظر اچن ته اهي اپريل ۽ جولاءِ مهيني ۾ ڪڍي ڇڏجن.

چڪين وڌائڻ جا طريقا (Propagation Methods):

زيتون جون چڪيون هيٺين ريت وڌائي سگهجن ٿيون:
زميني اوڌ/ داب (Ground Layering) ذريعي، هوائي اوڌ/ داب (Air Layering) ذريعي، قلم لڳائڻ (Cuttings) ذريعي ۽ بچ (Seed) ذريعي.

1. زميني اوڌ/ داب (Ground Layering):

هن اوڌ ذريعي چڪين وڌائڻ جو طريقو ڪامياب آهي. اوڌ لڳائڻ لاءِ صحتمند ميوو ڏيندڙ وڻ جو انتخاب ڪجي. جنهن جون ٿاريون زمين جي بلڪل ويجهو هجن. انهن ٿارين مان مضبوط ۽ سگهاريون اگر جهڙيون ٿلهيون ٿاريون اوڌ لاءِ چونڊجن جيڪي ٿوري ٿوري مفاصلي تي هجن. ٿاريءَ جي وچ واري حصي کان تيز چاقو سان چلي نماڪٽ ڏيئي ڪل لاهجي. پوءِ اڌ فوٽ زمين ۾ کڻو کڻي ان ڪٽ ڏيئي واري جاءِ کي ڪڍي ۾ اهڙي طرح پورجي جو چڪي سڌي بيهي. بغير ڪٽ ڏنل ٿاري به ڪڍي ۾ پوري سگهجي ٿي. پر ڪٽ ڏنل ٿاري جلد پاڙون هڻڻ شروع ڪري ٿي. انهن اوڻن کي تڪڙا تڪڙا پائي ڏجن ته جيئن پوريل ٿاريون جلد پاڙون هڻڻ شروع ڪن. انهيءَ ڪم لاءِ پلاسٽڪ جي ٽوڪرين ۾ مٽي ۽ پاڻ وجهي انهن کي مٽي تختن تي 3 کان 4 فوٽ مٿي رکي ٿارين کي پوري ۽ پائي ٿجي. تقريباً ڇهن هفتن کانپوءِ پوريل ڇهڪ واري حصي کان پاڙون هڻڻ شروع ڪنديون. جنهن کان پوءِ هر اوڌ کي مٽيءَ واري پوريل حصي کان مٿي ڪنهن تيز چاقوءَ سان هڪو ڪٽ ٿجي. 15 ڏينهن کانپوءِ ٽسجي ته اها ٿاري ڪٽ برداشت ڪري ويئي آهي ته پوءِ وري ساڳي جاءِ تي وري ڪٽ ٿجي. اهڙي طريقي سان ان چڪيءَ کي وڻ کان جدا ڪري ڇڏجي. ان چڪيءَ کي وڻ کان جدا ڪرڻ کانپوءِ 15 ڏينهن ڇڏي ٿجي ته جيئن خبر پوي ته اوڌ مڪمل طور زمين ۾ پاڙون هڻي ويئي آهي يا نه. جڏهن اها پوري پڪ ٿي وڃي ته چڪي مڪمل تيار ٿي ويئي آهي ته پوءِ ان چڪيءَ کي ڪري تيار ٿيل زمين ۾ پوکجي.

2. هوائي اوڌ/ داب (Air Layering):

اوتون وڌائڻ لاءِ هي طريقو به ڪامياب آهي. هن ۾ پهريائين زمين ۾ کڻو کڻي ان ۾ هڪ حصو وٺائڻ جو پاڻ ۽ ٻه حصا لٽياسي مٽي وجهي ان ڪڍي کي پائي سان ڀري ڇڏجي. تقريباً هڪ هفتي تائين ان پاڻ ۾ مٽي ملايل کي پائي ڏيندو رهجي ته جيئن اهو پاڻ ۽ مٽي پاڻ ۾ چڱيءَ طرح سان ملي وڃن ۽ پاڻ ڳري پنهنجي گرمائش ختم ڪري.



پوءِ وڻ جي وچين حصي جتي شاخون پکڙيل هجن اتي پينسل جهڙيون ٿلهيون شاخون چونڊجن. پوءِ هر هڪ ٿاريءَ کي جنهن مان اوڌ تيار ڪرڻي هجي ان ٿاريءَ جي وچ واري حصي وٽ تيز چاقوءَ سان هڪ کان ٻن انچن تائين گول ڪل لاهجي. ۽ ڪل لٽل حصي وٽ ان ڏانڊيءَ کي هڪو ڇهڪ ڏجي. پوءِ ان ڇهڪ ڏنل جاءِ تي پهريان تيار ڪيل مٽي ۽ پاڻ ملايل گپ جو هڪ پنوڙو اهڙي طرح رکجي جيئن ڏانڊيءَ کي چونڊاريءَ ڦري اچي. ان بعد ڏهه انچ سٺي جي پوري جو تڪڙ ٿوريءَ سان يا سٺ سان ان کي چڱي طرح ويڙهجي ۽ ٻڌي ڇڏجي.

ٻٽل جاءِ جي مٿان ٻي ٿاريءَ ۾ هڪ نڪر جو لوٽو يا پلاسٽڪ جون بوتلون جنهن کي تري ۾ هڪ سنهو سوراخ ڪجي ۽ پوءِ انهن کي بڻجي ته جيئن ان مان ڦڙو ڦڙو پاڻي ٻٽل اوڌ جي مٿان ڪرندو رهي ۽ اها ٻٽل مٽي آلي رهي ته جيئن ان ڏنل ڇهڪ وٽان ٿاري پاڙون ڪڍڻ شروع ڪري. اوڌ لڳائڻ کان ڇهن هفتن جي عرصي کان پوءِ وڻ واري حصي کان لڳل اوڌ کي تيز چاقو سان هڪو ڇهڪ ڏجي. وري 15 ڏينهن کان پوءِ اوڌ جو رهيل حصو ڪٽي وڻ کان ڌار ڪجي ۽ اها تيار ڪيل اوڌ جلد زمين ۾ پوکي ڇڏڻ گهرجي.

نوٽ: هن طريقي سان لڳل اوڌ ۾ مٽي گهٽ هوندي آهي. ان ڪري ان تيار ڪيل چڪيءَ کي جلد پوکڻ گهرجي نه ته چڪي سڪي وڃڻ جو انديشو آهي.

هوائي اوڏ/ داب (Air Layering) ۾ لوڻي ٻڌڻ کانسواءِ هي طريقو به اڄڪلهه وڌيڪ استعمال ٿئي ٿو ته اوڏ کي لڳايل مٽيءَ جي پنوڙي کي پولیٿين ٽيپ سان مضبوطيءَ سان ويڙهي ڇڏجي ته جيئن اندر هوا داخل نه ٿي سگهي. ۽ ان پنوڙي ۾ گهم موجود رهي.



3. قلم ذريعي (Cuttings):

چڪين وڌائڻ لاءِ هي طريقو سولو آهي. هن طريقي ۾ پهريائين 8 فوٽ ڊگهيون ۽ 4 فوٽ ويڪريون ٻاريون ٺاهجن. انهن ٻارن مان گندگاهه ڪڍي صاف ڪري وٽائڻ جو پاڻ وجهي پوءِ زيتون جي وٽن مان اگر جي ٽولهي جيتريون ٽاريون ڪپي انهن جا 8 انچ ڊگها ڏندڻ ٺاهجن. جن ۾ ٽن کان چار اکيون هجن (قلم تيز چاقوءَ سان ڪٽڻ ته جيئن چيرجي ۽ زخمي نه ٿي پون. چيريل يا زخمي ٿيل ڏندڻ ڪم جا نه هوندا.

اهي قلم تيار ڪيل ٻارين ۾ 6 انچن جي مفاصلي تي اڳ ۾ ٻارين کي پاڻي ڏيئي پوءِ 3 انچ اونها ڪوڙجن، انهن کي گرمين ۾ پنجن ڏينهن کان پوءِ ۽ سردين ۾ ڏهن ڏينهن کان پوءِ پاڻي ڏجي. پندرهن ويهن ڏينهن کانپوءِ اهي ڏندڻ مٿئين حصي کان گوڻچ ڪڍڻ شروع ڪندا. جڏهن اهي گوڻچ وڌا ٿي ٻوٽي جي صورت اختيار ڪن ٿا ته سمجهڻ گهرجي ته چڪي تيار آهي. پوءِ ان چڪيءَ کي ڪڍي زمين ۾ لڳائجي.

4. بچ ذريعي (Seed):

زيتون جون چڪيون بچ ذريعي به تيار ڪري سگهجن ٿيون. پر بچ ذريعي تيار ڪيل چڪين ۾ اصلي خاصيت واري جنس نٿي ملي. انهيءَ ڪري اوڏ ذريعي چڪيون وڌائڻ ئي مناسب طريقو سمجهيو وڃي ٿو.

ميوو جهڻ (Fruiting):

زيتون جا وڻ ٽن سالن کان پوءِ ميوو جهڻ شروع ڪن ٿا ۽ ٽيهن کان چاليهن سالن تائين ميوو ڏيندا رهن ٿا. جنهن کانپوءِ سندن عمر ختم ٿي ويندي آهي. هي سال ۾ ٻه مکيه فصل ٿين ٿا. هڪ فصل سياري جي شروعات يعني نومبر مهيني کان ٺهڻ شروع ٿئي ٿو جيڪو بهار جي موسم پوري هلي ٿو. ۽ بهار ۾ وري وڻ گل جهلن ٿا. ۽ ٻيو فصل اونھاري جي موسم ۾ برسات جي وقت ملي ٿو. ميوو واري مک عموماً اونھاري واري فصل کي وڌيڪ نقصان رسائي ٿي. ان ڪري ان دوران خصوصي تيل ڏيڻ گهرجي.



زيتون جا جيت ۽ بيماريون:

1. ميوو جي مک:

هيءَ مک جڏهن ميوو تيار ٿي وڃي ٿو ته ان جي اندران هن جا ٻچا ميوو کي خراب ڪن ٿا. جنهن جي بچاءُ ۽ علاج هيٺين ريت ڪرڻ گهرجي.

بچاءُ:

جڏهن زيتون اُٺي جيترا ٿين ته جولاءِ جي مهيني ۾ باغ اندر هڪ دٻو جنسي ڦندي جو في ايڪڙ جي حساب سان لڳائي روزانو دٻي ۾ ڦاسڻ وارين مکين جو تعداد ڏسجي. جيڪڏهن دٻي ۾ ٻن ٽن کان وڌيڪ مڪيون هجن ته پوءِ ڦوهارو ڪرڻ گهرجي. پر جيڪڏهن ان کان گهٽ هجي ته ڦوهارو نه ڪرڻ گهرجي.

ڦوهارو يا علاج:

ميوو جي مک لاءِ ٻيٽريڪس 120 گرام کان 150 گرام في 100 لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي ڦوهارو ڪرڻ

گهرجي. پر جيڪڏهن زيتون ڇڻ وارو هجي ۽ ميوو جي مک جو حملو هجي ته پوءِ ڊيٽريڪس جي بچاء ليزر 250 ملي لٽر في 100 لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي ڦوهارو ڪجي. ليزر لڳائڻ سان ٿرڙي ۽ ڪينئن جو ضابطو پڻ ملي ويندو. ان کان سواءِ ٿرائيڪلورفان 200 ملي لٽر 100 لٽر پاڻي ۾ ملائي ڏجي.

2. ٿرڙو:

گهڻو ڪري ٿڌي مند ۾ حملو ڪري ٿو، هن جي حملي ۾ گر وارو مرض پڻ ٿي وڃي ٿو.

علاج:

ليزر 250 ملي لٽر يا ڪونفيڊور 80 کان 100 ملي لٽر في 100 لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي ڦوهارو ڪريو.

3. ڪيننان:

ڪينئن جون جوان مادبون ڳڻن کلڻ وقت گلن تي آنا لاهن ٿيون. جيڪي ڏهن ٻارنهن ڏينهن ۾ ڦٽي ٻڄا ڏين ٿا. اهي ٻڄا گلن کي ڪاٺي نقصان ڏين ٿا ۽ ميوو اندر داخل ٿي وڃن ٿا. گهڻو نقصان نومبر، ڊسمبر ۾ ڪري ٿو.



4. ڦٽي:

جڏهن ميوو تيار ٿي ويندو آهي ۽ لهڻ جي ويجهو هوندو آهي. ان وقت هن بيماري جو حملو شروع ٿيندو آهي.

علاج:

ڪاپر آڪسي ڪلورائيڊ 250 گرام يا اسڪور 50 ملي لٽر في ڊرم پاڻي ۾ ملائي چڱيءَ ريت ڦوهارو ڪريو.

5. سو ڪهڙو:

هي بيماري عام طور تي هر باغ ۾ نظر ايندي آهي. شروع شروع ۾ نون ڳوٺن کي متاثر ڪري ٿي. پوءِ سڄي وڻ تي حملو ڪري ٿي. هن بيماري جي حملي سبب ڪجهه سالن ۾ وڻ سڪي ويندو آهي.



علاج:

هن بيماري کان بچاء لاءِ ڊاءِ ٿين ايم 250 گرام 100 لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي ڦوهارو ڪجي هي ڦوهارا گهٽ ۾ گهٽ ٽي ڀيرا ڪرڻ گهرجن.

ڦوهارو:

باغ ۾ ڦوھاري ڪرڻ لاءِ پاور مشين استعمال ڪجي جيڪا دوا چوٽيءَ تائين پهچائي سگهي. جيڪڏهن دوا صحيح نه پهچندي ته اتي مکيون ۽ جيت رهجي ويندا ۽ اتان وري سڄي باغ ۾ پکڙجي ويندا ۽ نقصان جو باعث بڻجندا، جنهن لاءِ پاور اسپريئر استعمال ڪرڻ تمام ضروري آهي. ان سان جيتن ۽ مکين جو مڪمل خاتمو يقيني آهي. انهيءَ سان وڌيڪ پئسو زيان ٿيڻ کان بچي ويندو ۽ ٿوري وقت ۾ جيتن تي ضابطو آڻي سگهيو.

سار سنڀال (Aftercare):

هن موسمن ۾ ميوو وٺڻ لاءِ ڄاڻايل سمورين سفارشن تي مڪمل طور عمل ڪيو وڃي ته جيئن پيداوار وڌيڪ لهي ۽ وڌ کان وڌ نفعو حاصل ٿئي. پر جيڪڏهن ٻنهي مندن ۾ محنت ۽ انتظام ڪنهن کان نٿو پڄي ته پوءِ فقط سياري جو فصل وٺڻ گهرجي. اونهاري جي فصل جي روڪڻ لاءِ سياري جي آخر ۾ يعني بهار گلن جهڻ مهل وڻن جو پاڻي بند

ڪجي ته جيئن گل ۽ ننڍو ميوو سوڪ سبب سڪي چئي وڃي ۽ اونھاري وارو ڦر نه ڪٽي.

پيداوار (Yield):

زيتون جو هر هڪ وڻ اٽڪل 500 کان 700 ميوا جهلي ٿو. جن جو وزن اندازاً ٻه کان ٽي مڻ ٿئي ٿو. اهڙي طرح سان هڪ ايڪڙ مان 140 کان 210 مڻ ميوو لهي ٿو.



ليمون - Lemon

زمين:

ليما ۽ توڙي ٻيا ڪڏا ميوا مختلف قسمن جي زمين تي پوکيا وڃن ٿا. پر اهڙي لڻيائي زمين جنهن ۾ ڪارپڊ (pH) 6.5 تائين هجي. اها زمين وڌيڪ پيداوار حاصل ڪرڻ لاءِ سڀ کان بهتر ۽ موزون سمجهي وڃي ٿي. پٿريلي ۽ ڪرائي زمين هن ميوي لاءِ مناسب ناهي. هن لاءِ اها زمين جنهن ۾ هوا جي سٺي اچ وڃ هجي ۽ منجهس پاڻي جذب ڪرڻ جي صلاحيت وڌيڪ هجي سا سٺي رهي ٿي. باغ لڳائڻ کان پهرين گهٽ ۾ گهٽ ڇهه کان اٺ فوٽ جي اونھائي تائين زمين جي هيٺئين تهه ۾ ڪڪريون، ريتي يا چيڪي مٽي نه هجي ته وڌيڪ موزون هوندي. زمين جو دارومدار روٽ اسٽاڪ تي پڻ آهي. جنهن تي ٻوٽا پيوند ڪجن ٿا. مثلاً جتي ڪٿي جو روٽ اسٽاڪ ڪڪريل، وارياسي ۽ چيڪي زمين کي پسند ڪري ٿو. ڪٽو ميوو ڳرين ۽ پوسل وارين زمينن ۾ به ڪامياب آهي.

پيوندڪاري لاءِ ضروري صلاحون:

(1) اک يا چشمو يا پيوندي ڪاٺي کي روٽ اسٽاڪ جي صحيح نموني سان پچائي ٻڌجي. (2) روٽ اسٽاڪ ۽ پيوندي ڪاٺي هڪ ئي ٽولهه جي برابر چونڊجن. (3) روٽ اسٽاڪ ۽ سائڻ بيماري کان پاڪ چونڊجن. (4) پيوندي ٿاري هلندڙ سال جي انهي پڪي ٿاري مان حاصل ڪجي جيڪا چار پنج مهينا پراڻي ته هجي، پر ان ۾ اڃا ڦوٽهڙو شروع نه ٿيو هجي. (5) پيوندي ڪاٺي جي چونڊ لاءِ ضروري آهي ته هڪ نسلي باغ هجي، جنس جي هر ٻوٽي جو نسل ۽ پيداوار وڻ جي قسم مطابق اعليٰ قسم جا هجن ۽ وڌيڪ پيداوار ملي انهن مان به جيڪي صحتمند ۽ توانا هجن تن تي خاص نسل لڳايو وڃي ۽ وقت اچڻ تي ان مان پيوندي ڪاٺي حاصل ڪجي.

اک يا چشمو لڳائڻ:

ڪٽن ميون ۾ اک يا چشمي وسيلي پيوندي ڪاري ڪجي ٿي. ان لاءِ روٽ اسٽاڪ واري ٻوٽي جي ٿڙ تي زمين کان ڇهه انچ مٿي، ٿيڊ کان ٻه انچ اڳو ڇير، پيوندي چاقو جي مدد سان ٽُجي. ان کان پوءِ ان ڇير جي مٿئين ڇيڙي تي ٻيو ڇير ان کان منو انچ جو ٽُجي. جيڪو زمين جي متوازي هجي. ڪل کي چاقو جي مدد سان اندرئين پاسي کان اک جي ڊيگهه برابر کولجي. ان کان پوءِ پيوندي ڪاٺي مان هڪ کان ٿيڊ انچ بگهي ڪل (چوٽو) لاٿو وڃي جنهن جي وچ ۾ اک موجود هجي. اها ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته جيڪڏهن اک سان گڏ ڪنڊو لڳل هجي ته پوءِ اک جي هيٺان ڪاٺي نه لائي وڃي ڇو ته انين ڪرڻ سان اک زخمي ٿي پوندي. ٻي صورت ۾ ڪاٺي لائي وڃي. ڪل جي ٻنهي ڇيڙن کي سنهو ڪيو وڃي ته جيئن اها ڇير ۾ اندر سولائي سان وڃي سگهي. هاڻ اک کي ٽي (T) نما ڇير ۾ مٿئين کان هيٺئين پاسي داخل ڪري ڊٻائجي پر خيال رهي ته جيئن اک جي ڪل ٻوٽي جي ڪل سان گڏ کڻي وڃي ۽ پوءِ اک کي پلاسٽڪ جي پٽي سان قابو ڪري ٻڌجي. پر اهو خيال رکجي ته جيئن اک جو مٿيون ساڙي آهي ته پوءِ اها ڪامياب آهي نه ته پوءِ ٻي اک لڳائجي. جڏهن اک جي واڌ ڇهه انچ ٿي وڃي ته ٻوٽي جي روٽ اسٽاڪ جو مٿيون حصو چشمي کان ٽي انچ مٿي ڪٽي ڇڏجي ۽ روٽ اسٽاڪ تان ٻئي ڦوٽهڙي کي وٺڻ ويجهڻ نه ٿجي. جيڪڏهن پاڻيءَ ۽ گڏ وغيره جو خيال رکيو وڃي ته ٻوٽو هڪ سال اندر باغ ۾ لڳائڻ جي قابل ٿي ويندو.

قلم وسيلي ٻوٽا تيار ڪرڻ:

ڪٽن ميون ۾ قلم وسيلي تمام گهٽ تسلي واڌ ويجهه ٿئي ٿي. صرف مٺي نارنگي ۽ ليمي جي نسلي واڌ ويجهه هن طريقي سان ڪئي وڃي ٿي. اهي قلم بهار جي مند ۾ لڳايا وڃن ٿا. قلم هڪ ساله عمر واري ٿاري مان ڪٽيا وڃن. جيڪي بيمارين کان پاڪ هجن. قلم ٽو انهن کان ٻارنهن انچ بگها هجن. قلم تيار ڪرڻ ۾ اهو احتياط ڪرڻ گهرجي ته هيٺيون وڍ گول ۽ اک جي بلڪل ويجهو هجي. مٿيون

وڊ اک کان هڪ يا ٽي انچ مٿي ۽ اک جي ابتڙ رخ ۾ ڏيڍو ڪپيل هجي. هڪ قلم تي گهٽ ۾ گهٽ ٽي اکيون ضرور هئڻ گهرجن. اهي قلم زمين ۾ لوهه جي سوئي سان سوراخ ڪري يا رني جي مدد سان هنيا وڃن. انهن قلمن کي زور سان نه ٽنڀيو وڃي پر اهڙي طرح سان لڳايا وڃن ته جيئن هن جا ٻه حصا زمين ۾ هڪ حصو هوا ۾ ۽ مٿئين وڊ جو رخ اتر ۽ اوڀر ۾ هئڻ گهرجي. ته جيئن هن تي سڄي جي روشني سنئين سڌي نه پئجي سگهجي نه ته قلم خشڪ ٿي ويندا. قلمن کي زمين ۾ اهڙي نموني سان لڳائجي ته جيئن قطار جو قطار کان فاصلو ٽي فوٽ ۽ قلم جو قلم کان فاصلو ٽو انچ بيهي. قلم لڳائڻ کان پوءِ هن جي پاسن واري مٽي کي چڱي طرح ويهاريو وڃي ته جيئن سڀ هوا اندران خارج ٿي وڃي. تنهن کان پوءِ هڪدم قلمن کي پاڻي ڏيڻ گهرجي. هڪ مهيني کان پوءِ قلم ڦٽڻ شروع ڪندا. جيسيتائين قلم ڦٽي نه وڃن تيسيتائين زمين ۾ گڏ ۽ صفائي وغيره نه ڪرڻ گهرجي. ڇو ته ائين ڪرڻ سان قلم لڏيو وڃي ۽ پاڙون نٿيون لڳن. پاڻي گهرج اهر ڏيو رهجي. جيڪي قلم ڦٽيو وڃن. ان مان تيار ٿيل ٻوٽا هڪ سال کان پوءِ باغ ۾ لڳائڻ جي قابل ٿيو وڃن. انهي طريقي سان ستر سيڪڙو ڪاميابي ٿئي ٿي.

داب يا اوڌ وسيلي ٻوٽا تيار ڪرڻ:

هن طريقي سان ڪاغذي ليمون تيار ڪيو وڃي ٿو. هڪ سال عمر واري ٽاري اگر جي ٽولهه برابر چونڊجي جنهن جي مٿان اڌ انچ ويڪري چلي نما ڪل لائي وڃي يا ٽاري جي اڌ ٽولهه جي برابر وڊ ڏجي ۽ پوءِ ٽاري جي ان زخميل دمي کي آلي زمين ۾ نورائي پورجي. ٽاري جي ٻنهي پاسن کان پسانگيون لڳايون وڃن ته جيئن اها ٽاري مٿي نه ڪجي. زمين ۾ پوسل لاڳيتي رکي وڃي. ٻن اڍائي مهينن کان پوءِ ان ٽاري مان پاڙون نڪرڻ شروع ڪن ٿيون. پنجن ڇهن مهينن کان پوءِ ان ٽاري کي وڻ واري پاسي کان وڊ ڏجن. پهريون وڊ $1/3$ حصي جيترو، ٻيو $1/2$ ۽ ٽئين وڊ سان ٻوٽو جدا ڪجي. اهي وڊ انن کان ڏهن ڏينهن جي وقفي سان ڏجن ۽ پوءِ ان کي چڪيءَ جي صورت ۾ گهرج اهر ڪم ۾ آڻجي. اهو عمل ٻنهي موسمن ۾ يعني بهار ۽ سائون ۾ ڪجي. جيڪي ٽاريون زمين تائين نٿيون پهچن انهن کي ڪونڊين ۾ پر ساڳئي نموني لڳائجي.

جنسون:

يورپڪا، ڪرنا، فلوريڊا ريف، ولا فرانسڪا، بلادي، سور، نينا، جيلور، پنجاب ڪٽي، جالندري ڪٽي، رائونڊ سيليس ۽ مالٽا وغيره جنهن مان يورپڪا سفارش ڪيل آهي.

باغ لڳائڻ جو وقت:

باغ سال ۾ ٻه دفعا لڳائبو آهي. هڪ بهار جي موسم يعني فيبروري-مارچ ۽ ٻيو سائون واري موسم يعني آگسٽ کان سيپٽمبر وارن مهينن ۾ اهي ٻئي موسمون ٻوٽن جي پوک لاءِ بهتر آهن.

ٻوٽن جو فاصلو:

ٻوٽا ٻن طريقن سان لڳايا وڃن ٿا. هڪ چورس ۽ ٻيو ڇهه ڪنڊو طريقو. عام طرح سان ٻوٽا چورس طريقي سان لڳايا وڃن ٿا. ڇو ته هي طريقو ٻين طريقن کان سولو آهي. جنهن ۾ ٻوٽي جو ٻوٽي کان ۽ قطار جو قطار کان فاصلو هڪجهڙو ٿئي ٿو. هن طريقي سان 25×25 فوٽن جي فاصلي تي ٻوٽا لڳائجن ٿا. جنهن ڪري هڪ ايڪڙ ۾ 69 ٻوٽا لڳيو وڃن. جڏهن ته ڇهه ڪنڊو طريقو ڪنهن قدر ڏکيو آهي. جنهن ڪري باغ جي سارسنپال، گڏ ۽ هر هلائڻ ۾ به ڏکيائي ٿئي ٿي. هن طريقي ۾ اهو فائدو آهي جو چوڪنڊي طريقي جي ڀيٽ ۾ 25 سيڪڙو وڌيڪ ٻوٽا لڳائي سگهجن ٿا.

زمين جي تياري ۽ چڪيون لڳائڻ:

جيڪڏهن زمين ۾ گندگهه وغيره موجود هجي ته سڀ کان پهرين ان کي صاف ڪجي ۽ زمين کي پنج ڇهه اونچا هر ڏئي سنوت ۾ آڻجي. گهرج اهر ناليون ۽ ٻيا ٺاهجن. کڏا کوٽڻ لاءِ پهرين زمين تي ڪلن وسيلي نشان ڏجن. پوءِ ان جاءِ تي اڍائي x اڍائي x اڍائي فوٽن جا کڏا کوٽجن. ٻن کان ٽن هفتن تائين کڏا کليا رکيا وڃن. ته جيئن سڄي جي روشني ۾ نقصان وارا جيت ۽ جراثيم وغيره ختم ٿي وڃن. ان کان پوءِ هر هڪ کڏي کي 30 ڪلوگرام وٽل جي گريل سڙيل پاڻ سان کڏي واري مٽي ملائي

پڙڻ گهرجي. جنهن ۾ هڪ حصو وٽان جو پاڻ ۽ ٻه حصا مٽي اچي ويندي. جيڪڏهن ڪڏي واري مٽي سٺي نه هجي ته شاخن يا واهن جي لت واري مٽي ۾ پاڻ ملائي ڪڍا ڇڏجن. تنهن کان پوءِ ڪڏن کي هڪ يا ٻه پاڻي ڏجن ته جيئن پاڻ واري گرمي ختم ٿي وڃي ۽ پاڻي کان پوءِ ڪڏن واري مٽي زمين جي سطح کان هيٺ ويهي ته چڪيون هٿن کان پهرين انهن کي پرڀاسي واري مٽي وسيلي زمين جي برابر هموار ڪيو وڃي. ان کان پوءِ گهريل جنس جا صحتمند ٻوٽا لڳايا وڃن. جيڪي ٻوٽا ڪوئائي وڃن يا مري وڃن انهن کي هرگز نه لڳائجي. ٻوٽن جي چڪي مٿان ڳوٺ يا ڪڪ پڻ وغيره لڳل ٿين ٿا اهي ٻوٽا لڳائڻ کان پهرين لاٽا وڃن. ڪڏو ٻوٽي جي چڪي جيترو اونهو ۽ ويڪرو ڪوٽڻ گهرجي. ٻوٽي جي چڪي کي چڱي طرح زمين ۾ ويهارڻ لاءِ، هٿن ۽ رني جي مدد سان مٽي کي چڪي جي پاسن کان دٻاڙجي پر اهو خيال ضرور ڪجي ته جيئن چڪي ٽٽي نه پوي. ٻوٽي جي ٽڙن تي به مٽي چاڙهجي. ٻوٽي لڳائڻ کان پوءِ هڪدم پاڻي ڏجي.

پاڻي:

شروعاتي وقت ۾ گهرج اهر پاڻي ڏبو رهجي. اونهاري ۾ هفتيوار ۽ سياري ۾ ٻن کان ٽن هفتن جي وقفي سان پاڻي ڏجي. گهڻو پاڻي نقصان ڏئي ٿو. گلن جهلڻ مهل پاڻي بند ڪجي. پر جيئن ئي ميوو لڳي وڃي ته پاڻي ڏيڻ شروع ڪجي. ۽ پاڻ ڏيڻ کان پوءِ ضرور پاڻي ڏيڻ گهرجي. پاڻي ڏيڻ مهل خيال رکجي ته جيئن ٻوٽي جي ٽڙ کي سنئون سٺو پاڻي نه پهچي. ان لاءِ ٻوٽي جي ٽڙ تي ڪوٽر وسيلي مٽي چاڙهجي. پاري پوڻ وارين راتين ۾ پاڻي ڏيڻ سان ٻوٽا گهڻي نقصان کان بچيو وڃن.

پاڻ:

ٻوٽن جي سٺي واڌ ويجهه لاءِ پاڻ جو استعمال تمام ضروري آهي. پر وٽان جو تازو پاڻ هرگز نه ڏيڻ گهرجي. ڇو ته تازي پاڻ ڏيڻ سان ٻوٽن جي خوراڪي رسد بند ٿي وڃي ٿي. جنهن ڪري ٻوٽن کي نقصان پهچڻ جو انديشو آهي. ان کان سواءِ اڏوهي لڳڻ جو پڻ خطرو رهي ٿو. جنهن ڪري وٽان جو پاڻ هميشه سڙيل ڳريل ڏجي. جيڪو گهٽ ۾ گهٽ هڪ سال پراڻو هجي. ان سان گڏ ڪيميائي پاڻ جو پڻ استعمال ڪجي. جهڙوڪ؛ نائٽروجن، فاسفورس ۽ پوٽاش وارا پاڻ وغيره. وٽان جو پاڻ نومبر - ڊسمبر جي مهيني ۾ ڏجي. جڏهن ته ڪيميائي پاڻ اپريل جي مهيني ۾ ڏيڻ گهرجي. ان مان به يوريا جو اڌ وزن اپريل ۾ ۽ باقي رهيل اڌ وزن آگسٽ ۾ (ميون پٽجڻ کان پوءِ) ڏجي.

ذڪر ڪيل پاڻ ٻوٽي جي ٽڙ کان هڪ يا ٻه فوٽ پري چوڦير گهيري ۾ پکيڙي زمين ۾ ملائجي. پاڻ ڏيڻ کان پوءِ هڪدم پاڻي ڏجي.

ليمي ۾ پاڻ ڏيڻ جي ترتيب				
وٽان جو پاڻ نومبر-ڊسمبر ۽ ڪيميائي پاڻ اپريل ۾ ڏيڻ وٽ کي عمر مطابق ڏجي.				
ٻوٽي جي عمر (سالن ۾)	وٽان جو پاڻ (ڪلوگرام)	يوريا (گرام)	سنگل سپر فاسفيٽ (گرام)	سلفيٽ آف پوٽاش (گرام)
هڪ	10	100	100	100
ٻه	20	200	200	200
ٽي	30	300	300	300
چار	40	400	400	400
پنج	50	500	500	500
ڇهه	60	600	600	600
ست	70	700	700	700
اٺ	80	800	800	800
ٽو	90	900	900	900
ڏهه يا ان کان وڌيڪ	100	1000	1000	1000

گندگاهه جو خاتمو: باغ کي گندگاهه کان صاف رکڻ لاءِ شروع ۾ ڪوٽر، چنڊور يا ڪهڙي وسيلي گڏ

ڪجي. جڏهن وڻ وڏا ٿي وڃن ته وڻن هيٺان دڙ وسيلي گندگاهه کي ختم ڪجي ۽ باقي رهيل زمين ۾ هر ٽنن ۽ زمين کي سنوت ۾ رڪجي ائين ڪرڻ سان جيئن ۽ بيمارين کان بچاءُ ٿيندو ۽ گڏوگڏ زمين به نرم ٿي ويندي.

گڏيل فصلن جي پوک:

باغ ۾ پنجن- ڇهن سالن تائين ربيع ۽ خريف جون پاجيون پوکي سگهجن ٿيون. جنهن سان اضافي آمدني ٿيندي ۽ گندگاهه ۾ به گهٽڪائي ايندي. برسيم ۽ ڦري واريون جنسون پوکڻ سان آمدني به وڌندي ۽ زمين جي زرخيزي به بحال ٿيندي.

ڇانگ:

ٻوٽن لڳائڻ کان پوءِ ان جي وڻندڙ شڪل شباهه ٺاهجي. ٻوٽي ۾ ٿڙ جي چوڌاري ٿاريون به پڪڙيل هجن. گرم علائقن ۾ ٿاريون زمين کان ٻه ٽي فوٽ مٿي هڻڻ گهرجن. ٿڙ ٿارڻ ۾ لڪل هجي ته گرمي سببان ٿڙ جي ڪل ڦاٽڻ يا لهڻ جو خدشو آهي. ان ڪري پهرين ٻن ٽن سالن تائين ترتيب واري ڇانگ سان وڻ جو ڍانچو ٺاهڻ تي ڌيان ڏجي ۽ ان تناسب سان ڇانگ ڪبي رهجي. ڇانگ جو ٻيو مرحلو ڦر ڏيڻ کان پوءِ شروع ٿئي ٿو. ان وقت ڪنن ميون جي ڇانگ فقط ايتري ٿيڻ گهرجي جو جنوري مهيني ۾ پراڻيون سڪل ٿاريون ۽ اهي ٿاريون جيڪي پاڻ ۾ ٽڪرائيون هجن اهي ڪبي ڇڏجن.

باغ جي سار سنڀال:

باغ ۾ جيڪي ٻوٽا مري وڃن انهن جي جاءِ تي خال ۾ وري ٻيا ٻوٽا لڳائجن. ٻوٽن تي گرمي ۽ سردِي جو اثر تمام جلد ٿئي ٿو. گرمي کان بچاءُ لاءِ ٻوٽن جي پرڀاسي ۾ جتن پوکجي. ننڍن ٻوٽن کي سڀ کان بچاءُ لاءِ اتر واري پاسي کان ڪڪ ڪاٺا ڏجن. ٻاري کان بچاءُ لاءِ باغ کي پاڻي ڏجي يا دونهون ڪجي. تيز هوا کان بچڻ لاءِ، باغ جي ٻاهران هوا جي روڪ وارا وڻ لڳائجن. چوپائي مال جي نقصان کان بچڻ لاءِ پڻ جوڳو بندوبست ڪجي. پڪي به باغ ۾ ميوي کي نقصان ڏين ٿا. ان جو به خيال رکڻ کپي. وقت تي پاڻي ۽ پاڻ ڏجي. جيڪڏهن جيئن ۽ بيمارين جو حملو نظر اچي ته ترٽ ئي انهن جو تدارڪ ڪجي. ميوي ملڻ کان پهرين ٻوٽن جي شڪل شباهه ٺيڪ ڪجي ۽ ميوي پڙجڻ کان پوءِ فقط سڪل ٿيل يا بيماري ۾ ورٽل ٿارڻ جي ڇانگ وارو عمل به ڪجي. ٻوٽن جي ٿڙ تي ڇن جي پونجي ڪجي ته جيئن جيئن کان بچاءُ ٿئي ۽ ٿڙ تي به سج جي گرمي جو خراب اثر نه پوي. ٻوٽي جي ٿڙ جي ڀر ۾ مٽي چاڙهجي ته جيئن پاڻي سٺو سنئون ٿڙ کي نه رسي.

گل ۽ ميوا:

وڻ جڏهن چئن - پنجن سالن جو ٿيندو آهي ته گل اچڻ شروع ٿين ٿا. ڪٿي ميوي جي خاندان وارن وڻن ۾ گل فيبروري جي پڇاڙي کان مارچ جي شروع ۾ اچڻ شروع ٿين ٿا. هن خاندان جي وڻن ۾ ڦر لڳڻ ۾ ڪابه ڏکيائي پيش ڪانه ٿي اچي. گل مڪمل طرح ٿئي ٿو يعني هڪ ئي گل ۾ نر ۽ مادي جزا گڏ ٿين ٿا. لڳ وارو عمل جيئن وسيلي ٿئي ٿو. اڀريل تائين ڦر ٿيڻ وارو عمل مڪمل ٿيو وڃي ۽ ميو جولاءِ کان مارڪيٽ ۾ اچڻ شروع ٿيو وڃي.

ميون پٽڻ لاءِ صلاحون:

ميو نه ڪڍو پئجي ۽ نه ئي وري پڪل ميوي کي وڻ ۾ گهڻي وقت تائين رهڻ ڏنو وڃي. ميو جڏهن پنهنجي قسم مطابق جسامت ۽ پختگي تي پهچي رنگ بدلائي ته اها هن جي پڇڻ جي نشاني آهي. جيڪڏهن انهن ميون کي احتياط سان نه پٽيو ته اڳتي هلي اهي ميوا خراب ٿيڻ شروع ٿيندا. ان لاءِ ضروري آهي ته ميون کي ڏاکڻ وسيلي پئجي. وڻن مان ميو پٽڻ لاءِ ڪنڇي جو استعمال ڪجي. ڏانڊي کي ميوي جي برابر ڪڇي ته جيئن اها ٻين ميون کي زخمي نه ڪري. ميون کي پٽ تي ڪرڻ کان بچائجي ان لاءِ پٽڻ کان پوءِ ڪپڙي جي ٿيلهن ۾ ميون کي وجهي هيٺ لاهجي ته جيئن اهي زخمي نه ٿين، ڇو ته ميوي جي زخمي ٿيڻ ڪري ان تي مختلف جراثيم حملو ڪن ٿا ۽ ميو جلد ڳرڻ شروع ٿي وڃي ٿو. جيڪڏهن ميوي کي پٽڻ کان وٺي مارڪيٽ تائين هر قسم جي نقصان کان بچايو ويو ته ڪيترن ئي هفتن تائين سٺي حالت ۾ رهندو. ميوي جي درجا بندي سان گڏوگڏ ان جي صفائي جو به خيال رکڻ گهرجي. ميوي جا مختلف قسم پاڻ ۾ نه ملائجن. ميون کي

ڪٽڻ، ٽوڪرين ۽ ٻورين ۾ بند ڪري مارڪيٽ نه اماڻجي ائين ڪرڻ سان قيمت گهٽ ملندي ۽ ميوو به خراب ٿيندو. ميون کي هميشه ڪاٺ جي کوکن ۾ بند ڪجي. ميون وجهڻ کان پهرين کوکن جي پاسن ۽ تري ۾ ڪاغذ وجهي بند ڪري مارڪيٽ ۾ اماڻجي.

جيتن ۽ بيمارين جي آءِ پي ايم: جيت ۽ بيماريون ٻين فصلن جيان ليمن جي باغ تي به لڳن ٿيون. جيڪي ڏيان نه ڪرڻ يا صحيح ڄاڻ نه هئڻ ڪري تمام گهڻو نقصان پهچائڻ ٿيون.

عام طور تي ليمن جا آبادگار جيتن ۽ بيمارين جو تدارڪ صرف ۽ صرف زرعي زهرن کي سمجهن ٿا. جڏهن ته زرعي ماهرن تجربن مان اهو ثابت ڪيو آهي ته صرف زرعي زهرن جو استعمال فائديمند ناهي پر زرعي زهرن کي آخري حربي طور يعني مجبوريءَ ۾ استعمال ڪرڻ گهرجي. جڏهن ته جيتن ۽ بيمارين تي ضابطي جو بهترين طريقو آءِ پي ايم آهي. آءِ پي ايم جون ڪجهه خاص ڳالهون هيٺ ڏجن ٿيون:

1. چڪين تيار ڪرڻ لاءِ ٻج صحتمند ليمن ۽ بيمارين کان پاڪ صحتمند وڻن جو استعمال ڪرڻ گهرجي.
2. بيمار وڻن واري باغ ۾ ٻيجارو هرگز نه تيار ڪرڻ گهرجي.
3. باغ اندر گندگهه کي ڦٽڻ شرط هرن ڳڻڻ ذريعي هڪدم ختم ڪجي ڇاڪاڻ ته گندگهه جي ڪري باغ ۾ جيت جتان وڌيڪ نقصان ڏين ٿا.
4. وڻن کي صحتمند رکڻ لاءِ پاڻ، پاڻي ۽ ڳئون زرعي ماهرن جي سفارش مطابق ڏجن.
5. پنهنجي باغ کي ٺيڪيدارن جي رحم ڪرم تي هرگز نه ڇڻجي. پر باغن جي مالڪن کي پاڻ سار سنڀال لهڻ گهرجي. باغ جي وڻ وڻ کي هفتي پندرهن ڏينهن گهمي ڏسجي. جتي پاڻيءَ جي ضرورت هجي اتي پاڻي ڏجي جتي پاڻ جي ضرورت هجي اتي پاڻ ڏجي. جتي گڏ گاڙي يا چاڻگ جي ضرورت هجي اتي اهو عمل بنان دير ڪرڻ گهرجي.
6. زرعي ماهرن سان رابطي ۾ رهجي ڪڏهن ڪڏهن ماهرن کي پنهنجو باغ گهمرائجي ۽ اُهي جيڪو مشورو ڏين ان تي هڪدم عمل ڪجي.
7. پر اهو به آءِ پي ايم جو مقصد هرگز ناهي ته ڪنهن به سبب جي ڪري جيڪڏهن باغ ۾ جيت ۽ بيماريون وڌي وڃن ته پوءِ به زرعي زهر استعمال نه ڪيا وڃن پر اهڙي حالت ۾ زرعي ماهرن جي مشوري سان زرعي زهرن جو استعمال ڪجي. هتي جيتن ۽ بيمارين جي ضابطي جو ڪيميائي تدارڪ ٻڌائجي ٿو.

ليمن جا جيت، بچاءُ ۽ علاج



1. پٺن ۾ سرنگهه ٺاهڻ وارو جيت: هي جيت هلڪي ڦڪي رنگ جو ۽ منڍي پوري رنگ جي ٿيندي اٿس. جڏهن ته جوان ٻوٽ جسامت ۾ ننڍو، اڇو ۽ چمڪندڙ ٿيندو آهي. هي جيت نرم ۽ نازڪ پٺن جي اندر سرنگهه ٺاهي پٺن جو سائو مادو کائي ٿو. ٻن ڇاٽيءَ جي شڪل جهڙا ٿي وڃن ٿا ۽ رنگ چانديءَ جهڙو ٿي وڃي ٿو. آخر ۾ ٻن مروڙ جي سڪي ڪري پون ٿا.

علاج: ٽريسر 20 ملي لٽر 100 لٽر پاڻيءَ ۾ يا ڪلوروفيناپٽر يا (پائريٽ) 30 کان 35 ملي لٽر 100 لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي ڦوهارو ڪجي.



2. ڪٽڻ ميون جو مهلو: هي پوري رنگ جو پرن وارو ڦڙت مهلو ٿئي ٿو. جنهن جي پيٽ جي وچ تي نارنگي رنگ جو نشان هوندو آهي. ۽ ويهڻ مهل ٻولهي ڪٽي ويهندو آهي. هي جيت بهار جي مند ۾ ٿيل نرم ۽ نازڪ ڦوٽهڙي جو رس چوسي نقصان ڏئي ٿو. هي جيت ان سان اهڙي مٺي رس به خارج ڪري ٿو. جنهن سان پٺن تي ڪاري رنگ جو تهه ڄمي پوي ٿو.

علاج: اميدا ڪلوپرڊ 100 گرام يا ڪونفيڊور 100 ملي لٽر يا


جوزر 120 سي سي في 100 لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي ڦوهارو ڪجي.
3. ليمي جو پوپٽ: هي پوپٽ رنگدار خوبصورت ٿئي ٿو.
جنهن جا پر ڪارا ۽ انهن تي ڦڪي رنگ چٽڪا ٿين ٿا. ليمي
جي پوپٽ جا ننڍا ڪيٽا هلڪا ڪارا ٿين ٿا. ڪيٽا گونچن
پنن کي کاڌن ٿا ۽ شديد حملي جي صورت ۾ وڻ ٽوڙها ڪري
ڇڏين ٿا.

علاج: مڇ يا ٽائيمر 100 کان 150 ملي لٽر في ڊرم ڦوهارو
ڪجي.



ڦڪي رنگ جا هوندا آهن. ٿرڙو
چوسي نقصان پهچائي ٿو. ٿرڙي
جي کل ڪر ڌري ٿي پوي ٿي ۽

100 کان 150 ملي لٽر يا
کان 35 في ڊرم ڦوهارو ڪجي.



ٿرڙو: هي جيت
ڳاڙهسرو پوري رنگ
جو ٿئي ٿو. هن جا ٻچا
پنن ۽ ميو جي رس
جي حملي سان ليمي
معيار خراب ٿئي ٿو.
علاج: مڇ يا امبيڊا
ڪلوروفيناپاٽر 30

اڇي مک جهڙو جيت (CITRUS WHITE FLY):

هي جيت ڀرن وارو ننڍڙو هلڪي ڦڪي رنگ جو ٿئي ٿو. هن جيت جا ٻچا ۽ جوان ٻئي پٺن جو رس چوسن ٿا. ان سان گڏ هي جيت ميو جي به رس چوسي ٿو، جنهن جي ڪري ميو جي تازگي ختم ٿيو وڃي ٿي ۽ ان جي کل خراب ٿي وڃي ٿي. اڇي مک حملي دوران خاص قسم جي مٺي رس خارج ڪري ٿي جنهن سان پٺن تي ان جو تهه ڄمي وڃي ٿو.



علاج: ڪنفيڊور 100 ملي لٽر 100 لٽر پاڻيءَ ۾ موسيبلان 100 گرام 100 لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي ڦوهارو ڪجي.

لنيم جون بيماريون ۽ بچاءُ:

ڪوڙهه: ڪوڙهه جي ڪري ميو ۽ پٺن تي پوري رنگ جا ڳوڙهين پٿرين جهڙا ٿين ٿا جيڪي اڀريل هوندا آهن. ۽ هٿ لائڻ سان محسوس ٿينديون آهن. باغ جي چوڌاري ڪٿي جي قطار لڳائجي ۽ جن ٿارن تي حملو ٿئي ان جي متاثر حصن جي ڇانگهه ڪجي.



علاج: ڪاپر آڪسي ڪلورائيڊ 250 گرام، اسڪور 50 ملي لٽر 100 لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي وٺڻ تي چڱي ريت ڦوهارو ڪجي.



سوڪهڙو: وڻ چوٽيءَ کان سڪڻ ميوو ڇڻي ويندو آهي ۽ ڪڏهن ڪانيندو ۽ اتي ئي ننڍو ٿي سڪي ٿارن کي ڪپي ساڙي ڇڏجي. بيمار هجن ان کان به ٿي انچ پهرين سائي نه جيئن بيماري جڙ وٽان ئي ختم ٿي

لنيم جو شروع ڪندا آهن. ڪڏهن واڌ ناهي ويندو آهي. بيمار ٿاريون جتي سڪل جڳهه وٽان ويڃي سگهي.

500 ملي لٽر يا انٿرا ڪال يا ڊائٽين

علاج: اسڪور

ايم يا مينڪوزيب مان ڪوبه هڪڙو زهر 250 گرام في 100 لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي به ڪان ٿي پيرا ڦوهارو ڪجي.

ڪئونر واري بيماري: وٺڻ جي ٿڙن جي ڪل مختلف جاين تان ڦاٽي پوندي آهي ۽ انهن ڦوٽن مان ڪئونر نڪرڻ شروع ڪندو آهي. ڪل ڦاٽڻ جي ڪري وٺڻ کي خوراڪ صحيح ناهي ملندي. جنهن جي ڪري وٺڻ سڪي ويندا آهن.

سڪل ٿاريون وڏي ڇڏجن ۽ ٿڙ کي پاڻي لڳڻ نه ٿجي. جنهن لاءِ وٺڻ جي ٿڙن جي چوڌاري مٽي چاڙهجي.

علاج: انٿراڪال، ريڊومل گولڊ يا ايليت مان ڪنهن به هڪڙي زهر جو هڪ حصو ۽ سيڙهي (ڇن) 10 حصا ملائي جتان ڪئونر نڪتو هجي اتان ڪل لاهي لپيو ڪجي. يا 250 گرام في 100 لٽر پاڻيءَ ۾ ملائي ڦوهارو ڪريو.

زهرن جي استعمال جو طريقو:

1. جنهن به زهر جو ڦوهارو ڪرڻو هجي ان جي مٿان ڏنل هدايتن کي پڙهي عمل ڪجي.
2. ڦوهارو ڪندڙ کي زهر جي اثر کان بچڻ لاءِ هٿن تي پلاسٽڪ يا ربڙ جا جوراب، اکين تي عينڪ، نڪ تي ماسڪ يا ڪپڙي جي ٻٽ، پيرن ۾ بوٽ ضرور پائڻ گهرجي.
3. ڦوهارو دوران ڪاٺ، پيئڻ ۽ سگريٽ ڇڪڻ جي بلڪل اجازت ناهي. اهڙو ڪوبه عمل ڪرڻ سان ڦوهارو ڪندڙ جي صحت خراب ٿيندي.

4. ڦوهاري ٺاھڻ يا ڦوهاري ڪرڻ واري جاءِ تي ٻارن ٻچن، ٻين ماڻهن، جانورن ۽ ڪڪڙن وغيره کي هرگز اچڻ نه ڏجي.
5. ڦوهاري ڪرڻ کان پوءِ هڪدم ڦوهاري واريون خالي ٿيلهيون ۽ بوتلون ڪنهن به استعمال ۾ نه آڻجن.
6. ڦوهاري واري مشين کي وهندڙ پاڻيءَ ۾ هرگز نه ڏوٺجي نه ته اهو پاڻي هيٺ جڏهن جانور يا ماڻهو يا پکي پڪڻ پيئندا ته انهن جي صحت خراب ٿيندي.
7. ڦوهاري ڪيل باغ مان گهٽ ۾ گهٽ هفتو ڏهه ڏينهن ليمان نه پئجن ۽ باغ ۾ پوکيل گاهه وغيره نه لڻجي ۽ جيڪڏهن پاڇي پوکي هجي ته اها به هرگز نه پڻڻ گهرجي.
8. تيز هوا هلڻ مهل ڦوهارو هرگز نه ڪجي.
9. ڦوهاري واري اهڙي مشين استعمال ڪجي جيڪا صحيح هجي.
10. ڦوهاري ڪرڻ جو مناسب وقت صبح يا شام آهي. منجهند جو گهڻي تيز اس ۾ ڦوهارو نه ڪجي.



پيٽو - Papaya

زمين جي چونڊ:

اهڙي وڌيڪ زرخيز چيڪي زمين جنهن ۾ پاڻي جو سٺو نيڪال هجي. اها پيٽي جي پوک لاءِ ڪارائتي ثابت ٿئي ٿي. جڏهن ته پاڻي جي گهٽ نيڪال واري زمين ۾ گهڻي پاڻي ڏيڻ سان ٻوٽي جي صحت سٺي نه ٿي رهي. جنهن ڪري هن جا پن ڪوئاڻيو پيلا ٿيو وڃن ۽ هيٺيان پن وڌڻ بجاءِ لڙڪيو هيٺ ڪريو پون. چوٽي وارو حصو واڌ ڪونه ٿو ڪري نتيجي ۾ آخرڪار ٻوٽو ختم ٿيو وڃي.

نسل جي واڌ ويجهه:

پيٽي جا ٻوٽا گهڻو ڪري ٻج وسيلي تيار ڪيا وڃن ٿا. ان لاءِ وڏي جسامت جي يا گهريل جنس جي پڪل ميوو مان ٻج حاصل ڪجي. هڪ سٺي ميوو مان هزار کان ٻارنهن سو ٻج جا داڻا وٺي سگهجن ٿا. ۽ اهڙن ٿورن ميون مان هڪ ايڪڙ جو ٻج وٺي سگهجي ٿو. هن جو ٻج ڪاري رنگ جو ٿئي ٿو. جنهن جي مٿان شفاف اڇي رنگ جي ڳر ٿئي ٿي. جنهن کي چار سان ملائي سٺي طرح صاف ڪيو وڃي ۽ ڇانو ۾ سڪائي مناسب وقت تي پوکڻ لاءِ محفوظ ڪيو وڃي.

نرسري ۾ ٻوٽا تيار ڪرڻ:

جنهن زمين ۾ نرسري تيار ڪرڻي هجي اها مٿاهين جاءِ تي هئڻ گهرجي. زمين جو زرخيز هئڻ لازمي آهي. سڀ کان پهرين زمين کي هر ڏيئي چڱي طرح تيار ڪجي. ان کان پوءِ بنا ۽ ٻارا تيار ڪجن. زمين ۾ وڻڻ جو گريل سڙيل پاڻ 600 مٺ في ايڪڙ جي حساب سان ملاجي. پاڻ کي زمين ۾ چڱي طرح ملائڻ کان پوءِ پاڻي ڏجي ته جيئن پاڻ واري گرمي ختم ٿي وڃي. زمين وٽ ۾ اچي ته 6x4 جون ٻاريون تيار ڪجن. جنهن جي اوچائي هڪ فوٽ کان وٺي ڏيڍ فوٽ هئڻ گهرجي. ٻارين جي مناسبت سان وچ ۾ ناليون به تيار ڪجن. تيار ٻارين ۾ 6 انچ جي مفاصلي تي اڌ انچ اونهيون قطارون ٺاهي انهن ۾ هڪ هڪ انچ جي مفاصلي تي ٻج پوکجي. ان کان پوءِ ٻج مٿان واري جو هڪو تهه ڏنو وڃي ۽ پوءِ ڪڪ ڪڪن سان ٻارين کي ڍڪي صبح شام هٿ واري ڦوهاري سان روزانو پاڻي ڏيو رهي. ٻج ڦٽڻ ۾ ٽي هفتا لڳيو وڃن. ٻج ڦٽي وڃڻ کانپوءِ ٻارين مٿان ڪڪ ڪڪا لاهي ڇڏجن ۽ صبح شام پاڻي ڏيڻ وارو عمل جاري رکجي.

ٻارين ۾ جيڪو به گندگاهه نظر اچي اهو هٿ سان پاڙان پئي ٻاهر ڦٽو ڪجي. ٻوٽا ڪجهه وڏا ٿين ته چڙيو پاڻي ڏجي پر ايترو پاڻي نه ڏجي جو ٻاريون ٻڏي وڃن. پاڻيءَ اهڙي طرح سان ڏجي جو فقط پاڻي جو سيڪ ٻهجي سگهي. فيبروري مهيني ۾ لڳايل ٻوٽا اپريل جي وچ ڌاري 6 کان 8 انچن جا ٿيو وڃن، جن تي 3 کان 4 پن ٿين ٿا.

جنسون:

واشنگٽن، مڊونڊو، هوائين، ڪيبي ڪيورا ۽ سولو واريون جنسون سيلون، گجرات، انڊيا، هوائي، آئرلينڊ ۽ فلپائين مان گهرايون ويون، جن تي تجربا ڪيا ويا جيڪي ڪراچي، حيدرآباد ۽ ميرپورخاص ڊويزن ۾ ڪاميابي سان پوکي سگهجن ٿيون. جنهن کان پوءِ اڳتي هلي واشنگٽن، مڊونڊو واريون جنسون ”هني ٻيو“ جي نالي سان مشهور ٿيون ۽ اهي ئي پوکيءَ لاءِ سفارش ڪيل آهن.

باغ لڳائڻ وقت:

باغ لڳائڻ لاءِ ٻوٽن لڳائڻ جو صحيح وقت به فيبروري ۽ مارچ آهي. ڇو ته سياري جي سڀني اڇڻ

کان پهرين ٻوٽا پختا ٿيو وڃن ۽ ٿڌا اثر انداز نٿي ٿئي. بيجارو جون جولاءِ وارن مهينن ۾ به تيار ڪري سگهجي ٿو. جيڪو آگسٽ سيپٽمبر وارن مهينن ۾ باغ لڳائڻ جي قابل ٿيو وڃي.

ٻوٽن جو مفاصلو:

باغ ۾ ٻوٽا چؤڪنڊي طريقي سان لڳايا وڃن ٿا. جنهن ۾ ٻوٽي جو ٻوٽي کان ۽ قطار جو قطار کان مفاصلو هڪ جيترو يعني 6x6 فوٽن جو رکيو آهي. اهڙي نموني سان هڪ ايڪڙ ۾ 1210 ٻوٽا لڳي ويندا.

زمين جي تياري ۽ چڪين لڳائڻ جو طريقو:

باغ لڳائڻ کان پهرين زمين جو تجزيو ڪرائي ان جي خاصيت معلوم ڪجي. اهڙي چونڊيل زمين مان گندگهه وغيره صاف ڪجي. زمين کي چار پنج اونها هر ڏئي سنوت ۾ اڻجي ۽ گهرج مطابق ٻٽا ۽ اڻئون تيار ڪجن. گهريل مفاصلي تي ڪان ذريعي نشان ڏئي 2x2x2 فوٽن جا ڪڏا تيار ڪجن. کوٽيل ڪڏن کي ٻن کان ٽن هفتن تائين ڪليو رکيو وڃي ته جيئن هوا ۽ سج جي روشني ۾ نقصانڪار جيت ۽ جراثيم مري ناس ٿي وڃن. ان کان پوءِ في ڪڏي کي 20 ڪلوگرام وٽلڻ جو ڳريل سڙيل پاڻ ۽ ڪڏي واري مٽي ملائي پرڇي، جنهن ۾ اٽڪل هڪ حصو پاڻ ۽ ٻه حصا مٽي هئڻ گهرجي.

جيڪڏهن ڪڏي واري مٽي سٺي نه هجي ته شاخن يا واهن جي لٽ واري مٽي پاڻ سان ملائي ڪڏن کي لٽجي. ان کان پوءِ ڪڏن کي هڪ يا ٻه ڀيرا پاڻي ٽڄي ته جيئن پاڻ واري گرمي ختم ٿي وڃي. جيئن ته پاڻي اڇڻ کان پوءِ ڪڏن ۽ پيل مٽي زمين جي سطح کان هيٺ ويهي وڃي ٿي ان ڪري جڏهن ڪڏا وٽ ۾ اچن ته انهن جي سطح کان پرياسي واري مٽي وسيلي زمين کي برابر يا هموار ڪيو وڃي. ان کان پوءِ تيار ڪيل بيجاري جون چڪيون لڳايون وڃن. چڪين لڳائڻ کان پهرين چڪي جي برابر ڪڏا کوٽي پوءِ چڪيون لڳائڻ گهرجن. ٻوٽن لڳائڻ کان پوءِ هڪدم پاڻي ڏيڻ گهرجي.

نرسري مان ٻوٽن کڻڻ جو طريقو:

ٻوٽن کي نرسري وارين ٻارين مان چڪي جي صورت ۾ ڪڍيو وڃي. هر هڪ چڪي ۾ ٻه کان ٽي ٻوٽا ضرور هئڻ گهرجن. ڇو ته ننڍن ٻوٽن ۾ نر ۽ مادي ٻوٽي جي خبر ڪونه پوي. ٻوٽن لڳائڻ کان پوءِ جڏهن ٻوٽا وڏا ٿي گل جهلين ٿا ته پوءِ نر ۽ مادي جي خبر پوي ٿي. انهيءَ وقت واڌاري نر ٻوٽا ڪري ڇڏجن. فقط 10 کان 15 سيڪڙو نر ٻوٽا باغ ۾ رکڻ گهرجن.

ٻوٽن ۾ جلد گلن اٿڻ لاءِ تجويزون:

عام طرح سان اهو ڏٺو ويو آهي ته ٻوٽا جلد گل ڪونه ٿا جهلين ۽ قد ۾ به وڏا ٿيو وڃن. جنهن سان نر يا مادي ٻوٽن کي سڃاڻڻ ۾ ڏکيائي پيش اچي ٿي. گڏوگڏ وڏي قد هئڻ ڪري ميوو پئڻ ۾ پڻ سهنجائي نٿي رهي. تجربن کان پوءِ انهي مسئلي جو حل ڳولي لڌو ويو آهي جنهن سان ٻوٽا گهٽ عمر ۾ ننڍي قد هوندي ئي گل جهلڻ شروع ڪن ٿا. جنهن جو تفصيل هيٺ ڏجي ٿو.

ٻوٽن لڳائڻ کان پوءِ ٽي يا چار پاڻي ڏئي ڏسجي ته ٻوٽا پنهنجو پاڻي سنڀالي ويا هجن ته ٻوٽن کي پاڻي ڏيڻ بند ڪجي. ڪجهه وقت کان پوءِ ٻوٽن جا ٻن ٻيلا ٿيڻ شروع ڪندا پر ٻوٽن جا تڙ اڃا ساوا هوندا. هاڻي ڏسبو ته جيڪڏهن ٻوٽي کي پاڻي نه ڏبو ته ٻوٽا مري ويندا. ان حالت ۾ ٻوٽي کي پاڻي ڏجي. سٺو فصل حاصل ڪرڻ لاءِ پاڻي کان اڳ هر هڪ ٻوٽي جي چلهي ۾ 10 ڪلوگرام وٽلڻ جو ڳريل سڙيل پاڻ پکيڙجي. پاڻي کان پوءِ جڏهن زمين وٽ ۾ اچي ته ٻوٽي جي چوڌاري گڏ ڪجي ۽ پوءِ گهرج مطابق پاڻي ڏبو رهجي. هاڻ ٻوٽن جو ڦوٽهڙو شروع ٿيندو ته ان سان گڏ گل به نڪرڻ شروع ڪندا. گلن نڪرڻ کان پوءِ 10 کان 15 سيڪڙو نر ٻوٽا ڇڏي باقي واڌاري نر ٻوٽا ڪري ڇڏجن تنهن کان پوءِ گهرج مطابق ڪيميائي پاڻ جو استعمال شروع ڪجي. ميوو وٽ مان ارڙهن مهينن يا ٻن سالن اندر ورتو وڃي ٿو. ان کان وڌيڪ باغ رکڻ سان هڪ ته ميوو جسامت ۾ ننڍو لهندو ۽ ٻيو وٽن جو قد به وڏو ٿيو وڃي. جنهن مان ڦر لاهڻ ۾ ڏکيائي ٿئي ٿي. ان کان سواءِ وڌيڪ عرصي گذرڻ ڪري باغ ۾ جيتن ۽ بيمارين لڳڻ جو خدشو پڻ رهي ٿو.

ٻوٽن لڳائڻ کان پوءِ هڪو پاڻي ڏنو وڃي. هڪ مهيني تائين ٽئين چوٿين ڏينهن پاڻي ڏنو وڃي. تنهن کان پوءِ اونهاري ۾ 6 کان 8 ڏينهن ۽ سياري ۾ 10 کان 13 ڏينهن جي وقفي سان پاڻي ڏنو وڃي.

ڀاڻ جو استعمال:

وڻاڻ وارو ڀاڻ ته پوکي دوران في ڪڏي ۾ اڌ مڻ ٿجي ٿو ۽ پوکي کان پوءِ ايندڙ سال ڊسمبر کان جنوري جي مهيني دوران اڌ مڻ في ڇلهي ۾ ڏجي. جڏهن ته ٻوٽن کي ڪيميائي ڀاڻ جي پڻ ضرورت پوي ٿي. ان لاءِ ٻوٽو جڏهن ڦر ڏيڻ شروع ڪري ته هڪ پوري نائٽروفاس ۽ هڪ پوري سلفيٽ آف پوٽاش في ايڪڙ جي حساب سان ڊسمبر کان جنوري ۾ ڏجي. جنهن سان ٻوٽن جي واڌ ويجهه سٺي ٿئي ٿي ۽ ميوو پڻ صحتمند رهندو.

گندگاهه جو خاتمو:

گندگاهه ختم ڪرڻ لاءِ گڏ ۽ ڍڙ وارو عمل هر مهيني دهرابو وڃي. جنهن سان گندگاهه به ختم ٿي ويندو ۽ زمين به نرم ٿي ويندي ۽ زمين ۾ پاڻي جهلي بيهڻ جي صلاحيت وڌندي. گڏوگڏ جيئن ۽ بيمارين کان بچاءُ ٿيندو.

باغ جي سار سنڀال:

باغ ۾ گڏ ڪرڻ دوران اهو خيال رکڻ گهرجي ته جيڪڏهن ٿڙ جي پاڙ وٽ مٽي لهي وئي آهي ته ٻوٽن جي ٿڙن تي مٽي چاڙهي ته جيئن ٻوٽن جي ٿڙ کي سنئون سٽو پاڻي نه رسي پر ٻوٽن کي صرف پوسل پهچي. ان سان هڪ ته ٻوٽا ڪرڻ کان بچي ويندا ۽ ٻيو ته ٿڙ کي ڪوبه نقصان نه ٿيندو. جيڪڏهن اهو عمل نه ڪيو ويو ته پاڻي ٿڙ کي لڳڻ سان ٿڙ ڳري سڙي ويندو ۽ نيٺ آخر ٻوٽو مري ويندو.

گل ۽ ميوا:

هونئن ته چئن کان ڇهن مهينن جي عرصي ۾ گل اچڻ شروع ٿين ٿا. ۽ ڏهن کان ٻارهن مهينن ۾ ميوا اچڻ شروع ٿيو وڃي. پر ذڪر ڪيل تدبيرن تي عمل ڪيو ته اڃا به جلد ٻوٽن ۾ گل ۽ ميوا لڳندا. مادي گل اڪيلا يا ٻن ٽن ڇڳن جي صورت ۾ ظاهر ٿين ٿا. هي ٿڙ جي بلڪل ويجهو ۽ ٻن جي ڏانڊي جي هيٺين منڍي سان گڏ لڳل ٿين ٿا. جڏهن ته نر گل ننڍي قد جا ٻن جي ڏانڊي جي منڍي تي ڇڳن ۾ ٿين ٿا. ٻوٽن جو لڳ وارو عمل هوا ۽ جيتن وسيلي ٿئي ٿو.

ميون پٽڻ لاءِ صلاحون:

جڏهن ميوي تي هلڪو پيلاڻ مائل رنگ ظاهر ٿئي ته اها انهي جي پڇڻ جي نشاني آهي. پر پڪ ڪرڻ لاءِ ميوي کي ٿورو زخمي ڪيو ته هن مان نڪرڻ وارو کير پاڻي وانگر ڇڏو هوندو. ميوي پڇڻ جي سڃاڻپ لاءِ اهوئي بهتر طريقو آهي. پر نڪرندڙ کير، گهاٽي کير وانگر اڇو هجي ته معنيٰ اڃا ميوو ڪڇو آهي. ميوي کي پٽڻ وارو ڪم ٿڌ ۾ ڪجي. ميون جي درجي بندي ضرور ڪئي وڃي. پٽيل ميوو هڪ ٻن تهن وسيلي ڪاٺ جي کوکن ۾ بند ڪري مارڪيٽ ۾ موڪلجي.

پيداوار:

جيڪڏهن ذڪر ڪيل تدبيرون ۽ باغ جي سٺي سار سنڀال تي عمل ڪجي ته ڏيڍ کان ٻن سالن جي عرصي تائين في ٻوٽي مان 40 کان 50 ڪلوگرام پيداوار ملندي. سراسري طرح سان هڪ ٻوٽو اندازاً 40 کان 50 ميوا جهلي ٿو. هي ميوي جو وزن تقريباً هڪ ڪلوگرام کان ڏيڍ ڪلوگرام تائين ٿئي ٿو.



مڱ Green Gram -

زمين:

مڱ جي پوک لاءِ لٽياسي ، وارياسي ۽ وچولي زمين تمام بهترين آهي. اهوئي سبب آهي ته فصل ڪڇي، ڪاڇي ۽ ٿر ۾ پوکيو وڃي ٿو. جڏهن ته سنڌ جي وچولي آبپاشي واري علائقي جون زمينون هن علائقي جي لاءِ موزون آهن.

زمين جي تيارِي

هن فصل جي پوکي لاءِ زمين کي 2 کان 3 سڪي جا هر ڏئي سنوت ۾ اٿي ريڇ ڪجي. جڏهن زمين وٽ ۾ اڇي يا هر ڏيڻ جي لائق ٿئي ته ان ۾ به يا ٽي سائي جا هر ڏئي سانهر گهمائي ۽ زمين کي پوکي لاءِ هموار ڪجي. پوکيءَ وقت زمين ۾ مناسب ريڇ يا الاڻ هئڻ گهرجي ته جيئن بچ جو ڦوٽڙو صحيح ٿئي.

پوکي جو وقت ۽ طريقو

مڱ جي پوکڻ جون ٻه موسمون آهن. هڪ بهار جي موسم ۽ ٻي اونھاري يا گرمي جي موسم. بهار جي موسم 15 فيبروري کان 15 مارچ تائين ۽ گرمي جي موسم جون ۽ جولاءِ آهي. جنهن کي مڱ جو خريف وارو فصل چئجي ٿو. جيڪو بهار واري فصل کان وڌيڪ پيداوار ڏئي ٿو. گڏيل پوک لاءِ مڱن کي ٻين فصلن سان گڏ به پوکي سگهجي ٿو. جنهن ۾ وونٽن سان گڏ اورڙ جي وچ ۾ ناڙي زريعي پوکي سگهجي ٿو. هن فصل جي پوکي ناڙي يا ڇٽ زريعي ڪرڻ گهرجي پر ناڙي رستي پوک بهتر آهي. ناڙي واري پوک مان گند گاه آساني سان ڪڍي سگهجن ٿا. جنهن ڪري فصل پيداوار به وڌيڪ ٿئي ٿو. مڱن جي ناڙي قطارن ۾ هڪ فٽ جي مفاصلي تي هئڻ گهرجي. پوکي وقت اهو خيال رکڻ گهرجي ته زمين ۾ وٽ يا الاڻ مناسب مقدار ۾ هجي.

بچ جو مقدار

هن فصل جي پوکي لاءِ 6 کان 8 ڪلوگرام في ايڪڙ بچ استعمال ڪجي. ڇٽ جي صورت ۾ 8 کان 10 ڪلوگرام في ايڪڙ استعمال ڪجي. بچ صاف ۽ تندرست هئڻ گهرجي يعني جنس ملاوٽ کان پاڪ هجي جڏهن ته ڪيڙي ۽ بيماري لڳل بچ کان پاسو ڪجي.

جنسون

مڱن جون ڪيتريون ئي جنسون پوکيون وڃن ٿيون جيڪي پيداوار ۾ بهتر آهن. جهڙوڪ سي 23_، ديسي جنس 66_1، اين ايم 20_6، اين ايم 21_20، ايس 8 وغيره شامل آهن. جڏهن ته سنڌ لاءِ هڪ نئين سفارش ڪيل جنسن ۾ اي ايم 96 جنس وڌيڪ پيداوار ڏئي ٿي ۽ ٻين جنسن جي پيٽ ۾ 10 کان 15 ڏينهن اڳانو پڇي ٿي، جيڪا 60 ڏينهن ۾ پڇي تيار ٿئي ٿي.

پاڻ ڏيڻ

منڱن جي فصل ۾ هڪ ٻوري ڊي-اي-جي پوکي وقت ڏيڻ گهرجي. ۽ هڪ ٻوري يوريا پهرين پاڻي کي ڏيڻ گهرجي.

پاڻي ڏيڻ

منڱن جي فصل لاءِ 3 کان 4 پاڻي ڪافي آهن. پهريون پاڻي پوکيءَ جي ٽن هفتن بعد ٻيو پاڻي گل ٻاڻي وقت ۽ ٽيون پاڻي ٿرين ٺهڻ وقت ڏيڻ گهرجي. پر هي فصل باراني فصل طور به پوکيو وڃي ٿو.

گڏ ڪرڻ

هن فصل ۾ گڏ پهرين پاڻي کان اڳ ڪڍجي ته جيئن گند گاه جو خاتمو اچي. گڏ ڪڍڻ جي سبب زمين نرم ٿيندي ۽ ٻوٽا روزدار واڌ ڪندا.

لابارو

مڱن جا سال ۾ ٽي فصل لڳايا وڃن ٿا. تنهن ڪري انهن جو لاپارو مختلف وقتن تي ڪيو وڃي ٿو. جڏهن فصل جون ٿريون 80 کان 90 سيڪڙو پڇي وڃن ته لاپارو شروع ڪجي

پيداوار

هن فصل مان 8 کان 15 مڻ پيداوار في ايڪڙ وٺي سگهجي ٿي.



ماش يا مانهن

Black gram

زمين جي تياري

ماش جو فصل نهري ۽ باراني علائقن ۾ ڪاميابي سان پوکي سگهجي ٿو. زمين ۾ ٻه يا ٽي سڪي جا هر ڏيئي پٽر پڇي ريڇ ڪجي. جڏهن زمين هر ڏيڻ لائق يا وٽ ۾ اچي ته هڪ ٻه هر ڏيئي سانهر گهمائي زمين کي پوکي لاءِ هموار ڪجي.

ماش جي پوک لاءِ زمين جو هموار هجڻ تمام ضروري آهي. جيئن پاڻي زمين ۾ هڪ جهڙو بيهي سگهي. نهري علائقن ۾ به زمين کي اونها هر ڏيئي تيار ڪجي. جڏهن ته اهو خيال رکڻ گهرجي ته زمين ۾ مناسب ريڇ هجي پر زمين خشڪ نه ٿئي. باراني علائقن ۾ برسات کان اڳ هڪ ڀيرو مٽي اٿلائڻ وارو هر ۽ برسات کانپوءِ زمين وٽ ۾ اچڻ تي ٻه دفعا ڏيئي ان کي چڱي طرح تيار ڪجي بعد ۾ سانهر ڏجي ته جيئن زمين مڪمل هموار ۽ نرم ٿي وڃي. ان سان گڏ زمين ۾ مناسب سيڪ يا ريڇ هجي بي صورت ۾ ٻج جو ڦوٽڙو گهٽ ٿيندو ۽ پيداوار گهٽ ملندي.

پوکي جو طريقو

ماش جي پوک پهرين جون کان جولاءِ جي آخر تائين موزون آهي. ماش جو پوک نازي يا قطارن ۾ ڪجي. ۽ قطارن جي وچ ۾ مفاصلو 30 سينٽي ميٽر هئڻ گهرجي. ۽ ٻوٽن جي وچ ۾ مفاصلو 10 سينٽي ميٽر هئڻ گهرجي.

جنسون

ماش جي پوک لاءِ سفارش ڪيل جنسن ۾ ڪاري مانهن ۽ سائي مانهن واريون جنسون پوکيون وڃن ٿيون. جڏهن ته ٻين جنسن ۾ ماش 80_، ماش 30_31 وغيره پوکيون وڃن ٿيون. جڏهن ته ماش جي نئين جنسن ۾ اين اي آر سي 1 ۽ اين اي آر سي 2 جنسون پوکي هيٺ آهن.

ٻج جو مقدار

ماش يا مانهن لاءِ ٻج عام طور 6 کان 8 ڪلوگرام في ايڪڙ استعمال ڪجي. هن فصل جي وڌيڪ پيداوار لاءِ گهٽ ۾ گهٽ هڪ لک پنجويهه هزار ٻوٽا في ايڪڙ هئڻ گهرجن. ان مقصد لاءِ سفارش ڪيل جنسن جو صاف، خالص ۽ تندرست ٻج استعمال ڪجي. جڏهن ته ٻوٽن جي گهريل تعداد لاءِ 8 کان 10 ڪلوگرام ٻج في ايڪڙ استعمال ڪجي.

پاڻي ڏيڻ

ماش جي فصل لاءِ ٽي کان چار پاڻي ڪافي آهن. پهريون پاڻي پوکي کان ٽن هفتن بعد ۽ ٻيو پاڻي گل ٻاڻي وقت ۽ ٽيون پاڻي ڦرين ٺهڻ وقت ڏيڻ گهرجي. هي فصل بنيادي طور باراني علائقن ۾ پوکيو وڃي ٿو. پر جيڪڏهن آبپاشيءَ جو پاڻي موجود آهي ته ٽي پاڻي ڏيڻ گهرجن.

پان ڏيڻ

ماش جي فصل کي نائٽروجن پاڻ جي ضرورت گهٽ پوي ٿي. جڏهن ته فاسفورس واري پاڻ جي استعمال سان پيداوار ۾ اضافو اچي ٿو ۽ فصل جلد پڇي وڃي ٿو. ان ڪري ماش جي فصل لاءِ 10 ڪلو گرام نائٽروجن ۽ 25 ڪلو گرام فاسفورس في ايڪڙ استعمال ڪجي يا ماش لاءِ هڪ ٻوري ڊي-آي-پي پوکيءَ وقت ۽ آخري هر سان ملائي پوکي ڪجي.



گند گاه ڪڍڻ

ماش جي فصل ۾ گند گاه تمام گهڻو نقصان رسائين ٿا جنهن ڪري انهن کي ختم ڪرڻ لازمي آهي. فصل مان گند گاه پاڙئون ڪڍڻ گهرجن. جيڪڏهن گند گاه وقت سر نه ڪيو ويو ته فصل جي خوراڪ کٽندو ۽ فصل پيدوار گهٽ ٿيندو.

لابارو ۽ گاهه

جڏهن فصل ۾ 80 کان 90 سيڪڙو ڦريون پڪل نظر اچن ۽ ڦرين جو رنگ سائي مان ڪارو يا پورو ٽسڻ ۾ اچي ته هڪدم لبارو ڪرڻ گهرجي. ڇو ته پڪل فصل جو لبارو جلد نه ڪبو ته فصل چڻڻ شروع ڪندو ۽ پيداوار گهٽ لهندي. لباري بعد فصل کي اس ۾ سڪائي گاهه ڳاهڻ گهرجي. ۽ ان يا بچ جي صفائي بعد وڪرو ڪجي يا نخيرو ڪيو وڃي.

ڪنوا جي پيداواري حڪمت عملي Quinoa Cultivation Technology

ترتي تي قدرت پاران خلائق خوراڪي فصلن مان ڪجهه کي اعليٰ خوراڪي فصل وارا فصل چيو وڃي ٿو جن ۾ تمام گهڻي مقدار ۾ وٽامنس ۽ منرلس هجن ٿا. ان کان علاوه انهن ۾ جسم جي اندروني زهريلن مادن کي خارج ڪرڻ جي به تمام گهڻي صلاحيت آهي. جن جي استعمال سان جسم اندر بيمارين کان بچڻ جي صلاحيت وڌي وڃي ٿي. اهڙن فصلن مان هڪڙو فصل ڪنوا آهي. هي فصل سنڌ ۾ ربيع جي مند ۾ پوکي لاءِ مناسب آهي. ڪنوا جو سنهون داڻو ٿئي ٿو جنهن کي عام طور تي چانورن وانگر پچائي کائڻ وڃي ٿو جنهن دنيا ۾ گهرج آهي ۽ اسان جي ملڪ ۾ به سڀر اسٽورن تي وڪرو ٿي رهيو آهي. ڪنوا جي پوکي ناڙي رستي ۽ ڪرين خاص طور تي ويڪرن ڪرين تي ڪامياب آهي. هن فصل تي سنڌ ۾ تحقيقي ڪم شروع ڪيو ويو آهي. ابتدائي طور تي پوکي جا تفصيل هيٺ ڏجن ٿا:

فصل جي پوکي کان لباري تائين جي عمر	120 کان 140 ڏينهن
--	-------------------

پوکيءَ جي مند	ڪينوا کي ربيع جي مند ۾ 15 نومبر کان 15 ڊسمبر تائين پوکي سگهجي ٿو.
گهريل زمين	ڪينوا لاءِ چيڪي زمين موزون آهي.
زمين جي تياري	2 کان 3 اونها هر هٿي زمين کي پوکي لاءِ تيار ڪجي.
بچ جو مقدار	بچ جو مقدار 2 کان 3 ڪلو گرام في ايڪڙ
پوکي جو طريقو	ڪنوا جي پوکي ناڙي رستي ۽ ڪرين خاص طور تي ويڪرن ڪرين تي پوکڻ گهرجي پر جتي زمين هلڪي ڪارائي پڪي هجي ته اتي ڪري يا گهڙبي ڪجي
ٻوٽن کان ٻوٽن جو مفاصلو	قطار کان قطار جو مفاصلو 2 فوٽ ۽ ٻوٽي کان ٻوٽي جو مفاصلو 15 سينٽي ميٽر رکڻ گهرجي
پاڻ جو مقدار	ڪينوا لاءِ پاڻ جو مقدار 30 ڪلوگرام نائٽروجن ، 20 ڪلو گرام فاسفورس ۽ 20 ڪلو گرام پوٽاش في ايڪڙ ڏجي. جنهن جو وڌيڪ دارومدار زمين جي قسم ۽ حالت تي آهي. سفارش ڪيل فاسفورس ۽ پوٽاش جو سڄو مقدار پوکي وقت ڏيڻ گهرجي ۽ يوريا کي ٻن حصن ۾ ڏيڻ گهرجي هڪ حصو پوکي وقت ۽ ٻيو پوکي جي 70 ڏينهن بعد ڏيڻ گهرجي.
پاڻي	پاڻي 3 کان 4 ڏيڻ گهرجن. اهي به موسم کي نظر ۾ رکي ڏجن. ڪنوا کي پهريون پاڻي پوکي جي 40 ڏينهن بعد ۽ ٻيو پاڻي پوکي جي 75 ڏينهن بعد ٽيون پاڻي پوکي جي 100 ڏينهن بعد ۽ جيڪڏهن موسم گرم هجي ته چوٿون پاڻي پوکي جي 120 ڏينهن بعد ڏيڻ گهرجي.
گندگهه جو خاتمو	گندگهه شروع ڪرڻ وقت ۾ فصل کي نقصان پهچائڻ ٿا. گندگهه جو خاتمو هٿ سان ڪجي. ڪيميڪل ڪنٽرول اڃا تجربين هيٺ آهي.
جيت ۽ بيماريون	هن وقت تائين ڪوبه جيت يا بيماري هن فصل تي نظر نه آئي آهي.
لابارو ۽ ڳاه	اپريل مهيني ۾ ڪينوا جو فصل تيار ٿي وڃي ٿو جڏهن فصل جو رنگ سائي مان ناسي، نارنگي مان ڳاڙهو ٿي وڃي ته پوءِ لآبارو ڪجي ۽ لآبارو هٿ سان ڪجي يا ڪمبانن هارويسٽر سان ڪجي لآباري جي 7 ڏينهن بعد ڪٽڪ وارو ٿريشر هلائجي ته جيئن سولائي سان ٿريشر مان داڻا الڳ ٿي وڃن
ذخيرو	ڪنوا جي بچ کي ڪنهن بيگ ۾ وجهجي جيڪا هوا بند هجي ۽ گهم کي روڪي سگهي. پوءِ اهڙي جاءِ تي رکجي جتي گهٽ گرمي هجي ۽ گهم گهڻي نه هجي.

موسمياتي تبديليون ۽ اسان جي زراعت

Climate Change & Agriculture

ترتيءَ تي موسمياتي تبديليون هاڻ هڪ حقيقت آهن. جن جو ذميوار خود انسان به آهي، جنهن ترقيءَ جي نالي ۾ فطري ماحول کي سخت نقصان رسايو آهي. موسمياتي تبديليون ٻين شعبن سان گڏ زراعت لاءِ شديد خطرو آهن، جيڪو خطرو جيتوڻيڪ سڄي دنيا لاءِ آهي پر ترقي پذير ملڪن ۾ وسيلن ۽ صلاحيتن جي کوٽ جي ڪري زراعت جي وڌيڪ متاثر ٿيڻ جا امڪان آهن. سنڌ سميت ساري ملڪ جي اڪثر آباديءَ جي روزگار جو وسيلو زراعت آهي ۽ زراعت لاءِ هتي ڪافي عرصي کان موسمياتي تبديلين جي نتيجي ۾ ڪيترائي مسئلا ڪڙا ٿيا آهن، جن مان مکيه جو ذڪر هيٺين ريت آهي:

پاڻيءَ جي کوٽ:

دريائي پاڻيءَ جي شديد کوٽ جي نتيجي ۾ فصلن کي گهربل پاڻي نه ملڻ جي ڪري هڪ طرف فصلن جي پوکي ۽ پيداوار متاثر ٿي رهي آهي ته ٻئي طرف وڌيڪ ٺوپ ويل لڳائي جڙ جو پاڻي ڪڍڻ سان جڙ جو پاڻي گهٽجي به رهيو آهي ۽ ٻاڙو يا ڪارو به ٿي رهيو آهي.

سم ۽ ڪلر:

زميني پاڻيءَ جي نيڪال جي بهتر نه ٿيڻ جي نتيجي ۾ سم ۽ ڪلر جو مسئلو ڏينهن ڏينهن وڌي رهيو آهي، جنهن کي خاص طور تي ڏکڻ سنڌ جي سامونڊي پٽيءَ وارن علائقن ۾ سمند جي پاڻيءَ جي چڙهي اچڻ ڪري به سم ۽ ڪلر وڌيو آهي.

ٻوڏون ۽ خشڪسالي:

موسمياتي تبديلين جي نتيجي ۾ گهڻو ڪري چوماسي جي مينهن وسڻ ۾ فرق آيو آهي. هڪ ته آهي مقرر وقت تي ناهن پئجي رهيا ۽ ٻئي طرف ڪڏهن گهٽ ته ڪڏهن تمام گهڻا پئجي رهيا آهن، جنهن جي ڪري ڪڏهن ٻوڏ واري صورتحال ٿي وڃي ٿي جنهن جي ڪري فصلن جو شديد نقصان ٿئي ۽ ڪڏهن وري سوڪهڙو يا خشڪسالي ٿي وڃي ٿي، جيڪا عام طور تي سڄي سنڌ ۽ خاص طور تي ٿر ۽ ڪاڇي وغيره وارن علائقن کي شديد متاثر ڪري ٿي.

خشڪسالي جي ڪري نه صرف فصلن کي نقصان رسي ٿو پر ساڳئي وقت چوپائي مال لاءِ چاري جو به سخت بحران ٿي وڃي ٿو.

خشڪسالي يا سوڪهڙي جي ڪري جڙ به نٿو پرڃي جنهن جي ڪري ماڻهن ۽ جانورن جي پيئڻ جي پاڻيءَ جي کوٽ پڻ شدي اختيار ڪري وڃي ٿي.

سياري جي مُند جو سُسڻ: سياري جي مُند سُسڻ لڳي آهي جنهن جي ڪري سياري جي مُند وارن فصلن گهربل سِيءَ وارا ڏينهن ملڻ ڪري سندن پيداوار ٿئي ٿي. ان سان گڏ سياري جي مُند ۾ ڪن ڏينهن ۾ ٿڌ گهٽ ته ڪن ڏينهن ۾ تمام گهڻي وڏي وڃي ٿي ۽ گهڻي ٿڌ وڻڻ جي نتيجي ۾ فصلن ۾ ڪن ٿئي ٿي ۽ پيداوار متاثر ٿئي ٿي.



موسمياتي تبديلي جي ڪري جيئن ۽ بيمارين جو مسئلو: ڪجهه سالن کان موسمياتي تبديلين جي نتيجي ۾ اهڙا جيت ۽ بيماريون فصلن ۾ شدت اختيار ڪري ويا آهن، جيڪي پهرين ائين نه هئا؛ جن ۾ وونٽن ۾ ميلي بگ ۽ انين ۾ سوکڙي واري بيماري مُکھ آهن، جڏهن ته هن سال زيتون ۾ ميلي بگ جو حملو نظر آيو آهي.

موسمياتي تبديلين جو تدارڪ يا بچاءُ:

1. سڀ کان اهم ڪم هي آهي ته موسمياتي تبديلين جي سلسلي ۾ تحقيقي ڪم ۽ صلاحيت کي وڌايو وڃي.
2. موسمياتي تبديلين سان مطابقت رکندڙ جنسون ۽ حڪمت عمليون تيار ڪيون وڃن.
3. آبادگارن جي سطح تي آبادگارن کي گهرجي ته پنهنجي زمينن ۾ نامياتي مادي وڌائڻ واسطي زمينن ۾ هر سال نه ته به گهٽ ۾ گهٽ هر ٽئين سال وڻاڻ جو پاڻ يا ساٿو پاڻ ضرور ڏين ته جيئن زمينن جي زرخيزي بحال رهي، پاڻي کي جذب ڪرڻ ۽ پاڻي جي سوکڙي کي برداشت ڪرڻ جي صلاحيت وڌي ۽ پيداوار متاثر نه ٿئي.
4. جَر جي پاڻيءَ تي ڪوشش ڪري گهٽ پاڻيءَ وارا فصل پوکجن ۽ جديد طريقن سان پاڻيءَ جو استعمال ڪجي ته جيئن جَر جي پاڻيءَ جي کوٽ نه ٿئي ۽ جَر جو پاڻي گهڻي استعمال ڪري ڪارو يا ٻاڙو نه ٿئي.
5. ڍڪ پوک يعني ٺُل اندر پاجين ۽ ميوون کي ڦڙي ڦڙي يا ڦواري واري آبپاشيءَ تي پوکي طرف اچڻ گهرجي ته جيئن پاجين ۽ ميوون کي گهڻي سردي ۽ گرميءَ کان بچائي سگهجي ۽ گهٽ پاڻي تي فصل اُپائي سگهجي.
6. مينهن / باراني زراعت کي هٿي وٺائي وڃي.
7. فصلن کي زمين جي قسم ۽ فصل جي گهرج مطابق پاڻ ڏيڻ لاءِ زمين جي مٽي ليبارٽرين مان چڪاس ڪرائي ليبارٽرين جي سفارش مطابق پاڻ ڏيڻ گهرجي. ٻي صورت ۾ زمين جي قسم مطابق ڪيميائي پاڻ نه ڏيڻ جي ڪري زمين خراب ٿي سگهي ٿي ۽ پيداوار ۾ به خاطر خواهه اضافو نٿو ٿئي ان سان گڏ پنهنجي ٽيوب ويلن جو پاڻي پڻ وقفي وقفي سان ليبارٽرين مان ضرور چڪاس ڪرائجي ڇاڪاڻ ته ٻاڙي يا ڪاري ٿي ويل پاڻيءَ جو فصلن ۾ استعمال زمين کي خراب ڪري رهيو آهي.
8. جيئن ۽ بيمارين جي ضابطي لاءِ زرعي ماهرن جي مشوري بنان زرعي زهرن جو استعمال نه ڪرڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته جيئن يا بيمارين جي صحيح سڃاڻپ ۽ شدت معلوم ٿيڻ بنان زرعي زهرن جي استعمال جو هڪڙو نقصان اهو آهي ته ماحولياتي گدلاڻ وڌي رهي آهي ۽ ٻيو جيئن ۽ بيمارين ۾ زرعي زهرن خلاف قوت مدافعت وڌي رهي آهي جنهن ڪري اهي هلڪي زهر تي ضابطي ۾ نٿا اچن.
9. هڪڙي قسم جي فصل پوکڻ بجاءِ مختلف فصل پوکڻ گهرجن ته جيئن هڪ فصل جي ناکام ٿيڻ جي حالت ۾ ٻين فصلن مان اپت ملي سگهي.

پاڻي جو بهتر استعمال

Efficient use of water

وڌندڙ فصلن جي ايراضي، انساني آبادي، صنعتي ترقي وغيره جي نتيجي ۾ ڏينهن ڏينهن پاڻيءَ جي گهرج وڌي رهي آهي. ان ڪري پاڻيءَ جي بچت ۽ بهتر استعمال هن وقت اشد ضروري آهي. پاڻيءَ جي صحيح زرعي استعمال لاءِ سفارشون هيٺ ڏجن ٿيون:

1. **ليزر ليولنگ:** فصلن جي پوکيءَ لاءِ زمين کي ليزر ليولنگ واري مشين سان سنوت ۾ اٿي پوکي ڪرڻ گهرجي. ليزر ذريعي هموار ڪيل زمين ۾؛

- 25 سيڪڙو کان وڌيڪ پاڻيءَ جي بچت ٿئي ٿي.
- 10 سيڪڙي کان فصلن جي پيداوار وڌيڪ لهي ٿي.
- بچ جو ڦوٽهڙو پلو ٿئي ٿو.
- ڪيميائي پاڻ سڄي فصل کي هڪجهڙو ملي ٿو، ان ڪري پاڻ جو زيان نٿو ٿئي.
- زمينن ۾ گهٽ پاڻي ڏيڻ جي ڪري سم ۽ ڪلر جو خرابو گهٽجي وڃي ٿو.



2. **وائر ڪورس پڪا ۽ صفائي:** وائر ڪورسن کي پڪي ڪرڻ سان پاڻيءَ جي بچت ٿئي ٿي ۽ پاڻيءَ جي وهڪري ۾ بهتري اچڻ ڪري فصل گهٽ وقت ۾ پرڃي وڃي ٿو. فصل کي وقت تي



گهرج موجب پاڻي ملڻ ڪري پيداوار 30 سيڪڙو کان وڌيڪ لهي ٿي. بچيل پاڻيءَ تي وڌيڪ ايراضي پوکيءَ هيٺ اچي ٿي. پڪڻ وائر ڪورسن جي نتيجي ۾ سم جو مسئلو به گهٽجي وڃي ٿو. ليڪن پڪڻ وائر ڪورسن، ڪڇين نالين ۽ ڪسبن جي صفائي ۽ کاڌي ڪرڻ تمام ضروري آهي، جنهن سان پاڻيءَ ۾ بهتري اچي ٿي.

3. **زمين جي وٽ جي بحالي:** مختلف جائزن مطابق سنڌ جي زمينن ۾ نامياتي مادي جي سخت کوٽ آهي، جنهن جي ڪري زمينون سخت ٿيڻ سان گڏ پيداواري صلاحيت وڃائي رهيون آهن ۽ خاص طور تي نامياتي مادي جي کوٽ جي ڪري زمينون وٽ گهٽ رڪن ٿيون جنهن جي ڪري فصلن کي تڪڙا پاڻي ڏيڻ جي ضرورت پوي ٿي، ان مسئلي جي حل لاءِ؛

- گهٽ ۾ گهٽ هر ٽئين سال 3 ٽرڪون وٽاڻ جو پاڻ في ايڪڙ زمين ۾ وجهي هرڻ سان هڪدم ملائي ريج ڪجي ۽ بعد ۾ فصل پوکجن. جنهن سان زمين جي پيداواري صلاحيت وڌي ويندي پاڻيءَ جي فصلن کي تڪڙي گهرج نه پوڻ ڪري پاڻيءَ جي بچت ٿيندي. ان سان گڏ زمين ۾ سم ۽ ڪلر جو مسئلو به نه ٿيندو.
- وٽاڻ جو پاڻ جتي نه هجي اتي ساون گاهن وارا فصل جهڙوڪ؛ جنتر، اڪڙ، لوسڻ وغيره پوکي گلن تي ورڻ وقت هرڻ سان گاهه کي زمين ۾ ملائي ريج ڪري زمين تيار ڪري پوکي ڪجي ته ساڳيا فائدا ملندا.

4. **گڏيل ڪريا پوک:** هن طريقي ۾ 2 کان 3 فصل ساڳي زمين ۾ هڪڙي فصل واري پاڻيءَ تي پوکيا وڃن ٿا. جيئن مثال طور ڪرين تي ڪڻڪ پوکي ناليءَ ۾ ڪمند جي پوک، ڪرين تي بصر پوکي ڪرين جي چوٽيءَ تي پينڊيون ۽ نالين ۾ ڪمند جي پوک وغيره نهايت ئي ڪامياب پوکيءَ جا طريقا آهن. اهڙي طرح سان ويڪرن ڪرين يا بنن تي ولين وارا فصل پوکڻ دوران ولين جي وچ ۾ آبيون وڌڻ واريون پاڇيون پوکڻ ۽ هيٺان ناليءَ ۾ ڪريبي جي سيڪ تي ساوا بصر، ٿوم وغيره پوکي هڪ فصل جي پاڻيءَ تي 3 فصل ڪاميابيءَ سان پوکيا وڃن ٿا.

5. **اونهه هر ڏيڻ:** اونهه هر نه ڏيڻ جي نتيجي ۾ زمينن جي اندر هڪڙو سخت تهه جڙي وڃي ٿو. جنهن جي ڪري زمينون وٽ گهٽ رڪنديون آهن ۽ فصلن کي بار بار پاڻي ڏيڻو پوندو آهي. ان ڪري هر ٽئين سال زمين کي اونهه هر هڻي اندريون سخت تهه ضرور ٽوڙڻ گهرجي. جنهن سان فصل پلا ٿيندا ۽ پاڻيءَ جي بچت ٿيندي.

زرعي مارڪيٽنگ

Agriculture Marketing

زرعي شعبو ملڪي معيشت لاءِ ڪرنegi واري هڏي جي اهميت رکي ٿو. زرعي شعبي جو قومي آمدني ۾ 18.9 سيڪڙو حصو آهي ۽ 42.3 سيڪڙو آبادي کي سڌي يا اڻ سڌي ريت ملازمت جا موقعا فراهم ڪري ٿو. زرعي شعبو مختلف صنعتن جهڙوڪ؛ ٽيڪسٽائيل وغيره کي خام مال فراهم ڪري ٿو. بهراڙين جي 67.5 سيڪڙو آباديءَ جو روزگار هن شعبي سان جڙيل آهي ليڪن ايتري اهميت هئڻ باوجود اسان جي زرعي مارڪيٽنگ ٻه ئي رواتي آهي ۽ اها جديد بنيادن تي ناهي هلي رهي جنهن جي ڪري زراعت سان لاڳاپيل سموريون ڌريون آبادگارن سميت منافعو گهٽ ڪڍي رهيو آهي.

زراعت جيتوڻيڪ ملڪي ۽ صوبائي معيشت جو بنيادي ٿڌو آهي. ليڪن ان ۾ موجود منافعي واري صلاحيت يا گنجائش مان تمام ٿورو حصو حاصل ٿي رهيو آهي. جنهن جو هڪڙو بنيادي ڪارڻ اهو آهي ته اڪثر آبادگار زراعت کي پنهنجي گذاري جو وسيلو سمجهن ٿا پر زراعت کي ڪاروبار نٿا سمجهن.

آبادگار پاڻ کي واپاري يا ڪاروباري ماڻهو نٿا سمجهن ۽ زراعت کي هڪ غير رسمي پيشو سمجهندي ڪمائڻ کان وڌيڪ پوکيءَ تي ڌيان ڏين ٿا ۽ خود ڪجهه ڪرڻ بجاءِ قدرت ۽ بيروني مدد تي وڌيڪ ڀاڙين ٿا. جنهن جو نتيجو جديد حڪمت عملي ۽ پنهنجي ڪاروباري سوچ نه هئڻ جي ڪري گهٽ پيداوار ۽ گهٽ آمدنيءَ جي شڪل ۾ سامهون اچي ٿو. ان صورتحال ۾ تمام ضروري آهي ته زراعت بطور ڪاروبار جي تصور کي متعارف ڪرايو وڃي ته جيئن آبادگار:

1. ڪاروبار جي بنيادي علم ۽ مهارتن کي استعمال ڪن.
2. پنهنجي زرعي ڪاروبار ۾ منفعي بخش تبديليون آڻي سگهن.
3. ڪاروبار جي بهتر انتظام ڪاري ڪري سگهن.
4. مارڪيٽنگ جي عنصرن ۽ اصولن مطابق ڪم ڪري سگهن.
5. زرعي ڪاروبار جي منصوبا سازي ڪري سگهن.
6. زرعي ڪاروبار جي حوالي سان ڪاٽيڊاريءَ کي بهتر بڻائي سگهن.
7. خرچ ۽ قيمتن جو صحيح ڪاٺو لڳائي سگهن.
8. پنهنجي اندر ڪاروباري صلاحيتون پيدا ڪري سگهن ته جيئن ڪاروبار ترقي ڪري.

آبادگار جي اصل ڪاميابي ۽ سگهه دراصل زرعي ڪاروبار ۾ ترقي ۾ ئي لڪل آهي. آبادگار ۾ اها صلاحيت موجود هجڻ گهرجي ته هو زراعت کي هڪ سنجيده ڪاروبار سمجهي ته جيئن صوبائي ۽ ملڪي معيشت ۾ به هن جو ڪردار هجي ۽ سُڪي زندگي به گذاري سگهي.

گذاري ۽ ڪاروباري زراعت ۾ فرق

زراعت گذاري لاءِ	زراعت ڪاروبار لاءِ
هن قسم جي زراعت جو بنيادي مقصد گهريل ضرورتون پوريون ڪرڻ لاءِ پوکي راهي ڪرڻ هوندو آهي. يعني آبادگار گهر جي لاءِ فصل پوکيندو آهي.	زراعت بطور ڪاروبار ۾ آبادگار زمين تي فصل وڪري لاءِ پوکيندو آهي ته جيئن آمدنيءَ مان نفعو ڪمائي سگهي يعني فصل وڪري لاءِ پوکيا ويندا آهن.
زمين جو صحيح استعمال ناهي ٿيندو.	ٿوري زمين مان وڌيڪ ڪمائي سگهيو آهي.
ٿوري لاڳت ۽ وسيلن جي ضرورت پوندي آهي.	وڌيڪ لاڳت ۽ وسيلن جي ضرورت هوندي آهي.
خاص مهارت يا ٽيڪنالاجي سڪڻ جي ضرورت ناهي.	جديد حرفتن، مهارتن ۽ ٽيڪنالاجي جي ضرورت هوندي آهي.
حدف يا منزل مقرر ناهي هوندي.	حدف ۽ نتيجا واضع هوندا آهن.
مارڪيٽ سان خاص رابطو ناهي هوندو.	مارڪيٽ جي هر وقت ضرورت پوندي آهي. ان ڪري مارڪيٽن سان رابطو تيز هوندو آهي.
منصوبابندي نه هئڻ برابر هوندي آهي.	نتيجن ۽ حدف جي حاصل ڪرڻ لاءِ مڪمل منصوبابندي ڪرڻي هوندي آهي.
ڪاروباري صلاحيتون گهٽ يا بلڪل ناهن هونديون.	ڪاروباري صلاحيتون وڌيڪ هونديون آهن.

مٿين فرق کي ائين به سمجهي سگهجي ٿو ته اڄڪلهه ڪن شهرن جي آس پاس زرعي منڊين جي ننڍڙن واپارين ۽ عام ڪم ڪندڙن زمينون مقاطعي تي وٺي انهن تي سبزيون ۽ موسمي ميوو پوکڻ شروع ڪيا آهن. ۽ اهڙن مقاطعيدارن جي پاڇين وغيره کي سنڀالڻ ۽ ڪم ڪرڻ وارا وري اهي ئي اتان جا هاري ناري آهن. پر نتيجي ۾ اهي مقاطعيدار وڌيڪ ڪمائي رهيا آهن. جڏهن ته اهي روايتي يا خانداني آبادگار به ناهن پر ڪين زراعت بطور ڪاروبار جي حرفت اچي ٿي ان ڪري ئي هو ڪامياب آهن. ان ڪري عام آبادگار به پنهنجي پوکي راهي کي ڪاروبار طور اپنائي سگهي ٿو. هاڻ اچو ته ٿورو ان ڳالهه تي غور ڪريون ته ڪاروبار ڇا آهي؟ ۽ ڪيترن قسمن جو ٿئي ٿو.

ڪاروبار جي وصف ۽ قسم:

شين/جنس يا خدمتن جي پيداوار ۽ وڪري ۽ خريداري متعلق اهڙو ڪم جيڪو منافع ڪمائڻ جي مقصد سان ڪيو وڃي. ان کي ڪاروبار چئجي ٿو. ڪاروبار جا هيٺيان ٽي مکيه قسم ٿين ٿا:

- 1. شين يا جنسن جي پيداوار:** اهڙو ڪاروبار جنهن ۾ مختلف شيون يا جنسون تيار ڪيون وڃن. مثال طور: فصل اُٻائڻ، نرسريون پوکڻ، پاڇيون ۽ ميوو پيدا ڪرڻ ۽ پاڇين ۽ ميوون مان مختلف شيون تيار ڪرڻ جهڙوڪ؛ آچار وغيره، مال مٽاهه پالڻ وغيره.
- 2. تجارت يا ڪاروبار:** اهڙو ڪاروبار جنهن ۾ شين کي خريديو ۽ وڪرو ڪيو وڃي، مثال طور؛ بچ پاڻ جا دڪان، زرعي زهرن جا اسٽور، پاڇين وغيره جا آر ٽي ۽ واپاري اچي وڃن ٿا.
- 3. خدمتون:** اهڙو ڪاروبار جنهن ۾ مختلف شين جي مهارتن يعني حرفتن کي گراهڪن تائين پهچايو وڃي. مثال طور؛ ٽيچنگ، تربيت، قوهارو ڪرڻ، ٽريڪٽر جي سهولت فراهم ڪرڻ، لوهار وغيره.

ڪاروبار جي وصف ۽ قسمن جي سمجهڻ کان پوءِ ان ڳالهه تي غور ڪرڻ جي ضرورت آهي ته خدمت فراهم ڪرڻ پڻ هڪ ڪاروبار آهي. جيڪو ٻين سمورن شعبن ۾ گهڻو ڪري ڪاروبار آهي، ليڪن زراعت ۾ گهڻو گهٽ اهي مثال طور؛ جڏهن ڪنهن ماڻهوءَ جو ڍڳو بيمار ٿيندو آهي ته هو نقصان جي خطري کان هڪدم بيا سمورا ڪم ڇڏي جانورن جي ڊاڪٽر ڏانهن ڊوڙندو آهي. جنهن کي في به ڏيندو آهي ته جيئن نقصان کان بچي سگهي، ليڪن اهو ساڳيو ماڻهو پنهنجي فصل جي جيئن ۽ بيمارين وغيره جي باري ۾ ايترو اٿالو ناهي هوندو. ڇاڪاڻ ته هو پوکي راهيءَ کي

ڪاروبار نٿو سمجهي ۽ لاڳت ۽ آمدني جو جائزو يا ڪاٿو نٿو لڳائي.

هاڻ سڀ کان اهم ڳالهه اها سمجهڻ جي آهي ته ڪنهن به ڪاروبار جي نظام کي ڇا ٿو چئجي؟ سادي زبان ۾ ان کي قدر جي زنجير (Value Chain) چيو وڃي ٿو. جنهن تحت ئي ڪنهن ڪاروبار کي منفعي بخش بڻائي سگهجي ٿو.


قدر جي زنجير (Value Chain):

قدر جي زنجير ۾ اهي سموريون سرگرميون ۽ خدمتون اچي وڃن ٿيون، جيڪي ڪنهن شيء يا جنس يا خدمت کي پنهنجي تصور کان ويندي آخر ۾ مارڪيٽ ۽ صارف يا گيراهڪ تائين پهچائڻ لاءِ گهربل هونديون آهن.

يا

ڪنهن به ڪاروبار (شيء، جنس يا خدمت) سان لاڳاپيل سمورن ڪاروبارن جو اهڙو نظام جنهن ۾ هڪ ٻئي کان شيون يا جنسون يا خدمتون خريديون يا وڪرو ڪيون وينديون هجن. ته جيئن مارڪيٽ ۾ مؤثر ۽ عمل جوڳي طريقڪار تحت گيراهڪ جي ضرورت ۽ پسند کي پورو ڪيو وڃي.

ان جي بنيادي خصوصيت اها آهي ته هن جي خاص نظر هر وقت مارڪيٽ تي هوندي آهي ته جيئن گڏيل مفادن يا مقصدن کي سهڻي نموني حاصل ڪيو وڃي.



جڏهن هر ٿر جي صلاحيتن ۽ ماحول ۽ سوچ ۾ بهتري آڻجي ۽ هر ٿر اهو سمجهي ته سمورين ٿرين جي منفعي ۾ ئي منهنجو منافعو لڪل آهي. ان ڪري سمورين ٿرين جو خيال رکندي پنهنجو پنهنجو ڪردار ادا ڪري. ان لاءِ قدر جي زنجير جي سمورين ٿرين کي هڪ پليٽ فارم تي گڏ ڪرڻ ۽ هڪ ٻئي جي گهرجن ۽ ضرورتن کي سمجهي پنهنجو پنهنجو ڪردار ادا ڪرائڻ جي هر جاءِ هر وقت ضرورت رهي ٿي. ٻي صورت ۾ هر ٿر پنهنجي پنهنجي طور تي ڪم ڪري ٿي ۽ سوچي ٿي ۽ ٻي ٿر کي ٽيان ۾ رکڻ بدران هڪ حد تائين توڪو ڏئي وڌيڪ منافعو ڪمائڻ جي ڪوشش ڪري ٿي. جڏهن ته ائين ممڪن ناهي. جنهن جو مثال ائين آهي ته جيڪڏهن زنجير جي هڪ ڪٽي ٽٽي پوي يا ڪمزور ٿي پوي ته باقي ڪٽيون به پڪ سان ڪمزور ٿينديون بلڪ ڪارگر نه رهنديون.

چند اهم قدر جي زنجير سان لاڳاپيل نڪتا هيٺ ذڪر ۾ آڻجن ٿا:

غير معياري زرعي شين جو قدر جي زنجير تي اثر:

پاڻ، بچ يا زرعي زهر وڪرو يا تيار ڪندڙن مان جيڪڏهن ڪو ڪا شيءِ وغيره معياري يا ٻئي نمبر جي وڌيڪ نفعو ڪمائڻ جي چڪر ۾ آبادگارن کي فراهم ڪري ٿو ته نتيجي ۾ آبادگارن جي پيداوار گهٽ لهي ٿي ۽ پيداوار جو معيار ڪري پوي ٿو. جنهن جي نتيجي ۾ ٽي مکيه نقصان ٿين ٿا؛

1. پيداوار گهٽ لھڻ جي ڪري آبادگارن کي نقصان رسي ٿو ۽ سندن مالي حالت ڪمزور ٿئي ٿي.
2. آبادگارن جي مالي حالت خراب ٿيڻ جي ڪري هو پنهنجي فصلن کي ضرورت مطابق بچ، پاڻ، زرعي زهر وغيره نٿا ڏين. جنهن سان نه صرف آبادگارن جي آمدني گهٽجي ٿي بلڪ بچ، پاڻ، زرعي زهر ٺاهيندڙن ۽ وڪرو ڪندڙن جو وڪرو گهٽجي ٿو ۽ انهن کي به نقصان رسي ٿو.
3. ٽيون وڏو نقصان اهو به ٿئي ٿو ته زرعي جنسن جي پيداوار معياري نه هئڻ جي ڪري ڏيساڻو جو واپار متاثر ٿئي ٿو. ۽ ايڪسپورٽ واپار ۽ واپارين کي خاطر خواهه منافعو نٿو رسي.

ان هڪڙي مثال مان ئي صاف ظاهر آهي ته قدر جي زنجير ۾ جڙيل سموريون ٿريون هڪ ٻئي لاءِ نهايت ئي اهم آهن ۽ هڪ ٻئي جي وڌيڪ منفعي جون ضامن آهن. قدر جي زنجير ان صورت ۾ ئي وڌيڪ مضبوط ٿي سگهي ٿي جڏهن سموريون ٿريون ان ڳالهه کي سمجهندي هڪ ٻئي جو خيال ڪن ۽ ويجهو اچن.

قدر جي زنجير جي بهتريءَ لاءِ به ٻيا مثال ڏيڻ پڻ ضروري آهن. هڪ ته عام طرح سان زرعي شعبي اندر آبادگار طبقي ۾ مڊل مين جي ڪردار تي سخت تنقيد هلندڙ آهي ۽ ٻئي طرف زرعي جنسن جو ڏيساڻو ۽ واپار ڪندڙن يعني ايڪسپورٽرن جو رويو به منفي آهي.

مڊل مين ۽ قدر جي زنجير:

عام طور تي آبادگارن جو اهو موقف آهي ته مڊل مين اصل تباهيءَ جو ذميوار آهي. تنهن ڪري ان جي ڪردار کي مڪمل طور تي ختم ٿيڻ گهرجي پر حقيقت ان جي بلڪل برعڪس آهي. ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته مڊل مين گهڻو منافعو ڪمائي ٿو ۽ آبادگارن سان ڪٿي ڪٿي چيڻنگ به ڪري ٿو. ليڪن ان مثبت پهلوءَ کي به ڏسڻ جي ضرورت آهي. اسان وٽ جيئن ته آبادگارن جي اڪثر آبادي ننڍن آبادگارن جي آهي. جن وٽ به ٽي ايڪڙ زمين آهي، جنهن ۾ هو مختلف فصل پوکن ٿا. ڪجهه فصل پنهنجي کاڌ خوراڪ لاءِ ٻيو مال مٽاهه جي چاري لاءِ باقي بچيل پيداوار وڪرو ڪن ٿا. اهڙن آبادگارن کي نه ته بهتر مارڪيٽ تائين رسائي آهي نه وسيلو آهن ۽ نه ئي ايترو وقت آهي. اهڙي صورت ۾ مڊل مين ئي هن جو واحد سهارو آهي جيڪو بچ پاڻ ۽ گهر جي خرچ پڪي لاءِ سڄي مند کيس سپورٽ به ڪري ٿو. هاڻ جيڪڏهن اهو سهارو نه هجي ته ننڍو آبادگار بلڪل ويهي رهي. ڇاڪاڻ ته ٿوري پيداوار کي بهتر مارڪيٽ تائين پهچائڻ ۽ سنڀالڻ اهڙن آبادگارن لاءِ مشڪل آهي. ها ان ڳالهه ۾ ڪو شڪ ناهي ته مڊل مين جو ڪردار آبادگار دوست بڻائڻ لاءِ ڪوششون وٺڻ گهرجن.


ڏيساڻو ۾ واپار (Export) ۽ قدر جي زنجير:

ڏيساڻو واپار ڪندڙ ترين جي منفي رويي سان پڻ زراعت کي نقصان رسي رهيو آهي ۽ قدر جي زنجير ڪمزور ٿي رهي آهي. هن وقت ايڪسپورٽر ٻن طرحن جو زرعي مال ٻاهر موڪلن ٿا. هڪ ته منڊين ۾ ايندڙ مال مان اعليٰ معيار وارو مال ڇانڻي ڪري ٻاهر موڪليو وڃي ٿو ۽ ٻيو زميندارن وٽان زمين تان چونڊي مال کڻي اچي ٻاهر ايڪسپورٽ ڪيو وڃي ٿو. ان طرح سان ٻن قسمن جا نقصان ٿين ٿا:

1. اعليٰ معيار وارو مال ڏيساڻو هليو وڃي ٿو ۽ باقي گهٽ معيار وارو مال ملڪي صارفن کي ملي ٿو.

2. اهڙي طرح سان ايڪسپورٽ ڪرڻ جو گهڻو فائدو ايڪسپورٽرن کي ئي ملي ٿو پر آبادگار کي ايڪسپورٽ ڪوٺائي جو اگهه نٿو ملي، ان ڪري آبادگار جو گهڻو زور پيداوار وڌائڻ طرف آهي پر معيار جي بهتريءَ طرف گهٽ آهي. جنهن جي ڪري مجموعي طور تي اعليٰ معيار واري پيداوار ۾ اضافو ناهي ٿي رهيو.

قدر جي زنجير هڪ ڪاروباري ايجنڊا آهي جنهن جو مقصد هر فصل مان هارين نارين، زميندارن، واپارين، پروسيسرن، دڪاندارن وغيره کي منافعو ملي ۽ صارفن کي سندن گهرج ۽ خريداري واري سگهه مطابق هر وقت ۽ هر جاءِ فراهمي جاري رهي.



زرعي توسيع ، زراعت کاتو حڪومت سنڌ

زرعي توسيع سنڌ جو بنيادي مقصد سنڌ جي آبادگارن جي رهنمائي ڪري سندن پيداوار وڌائڻ ۽ منفعي ۾ اضافو ڪرڻ آهي. ان سلسلي ۾ آبادگارن کي سندن زمين تي وڃي زرعي توسيعي عملو زرعي مشورا ڏئي رهيو آهي. ان ڪم کي وڌيڪ بهتر ڪرڻ لاءِ ڪجهه نوان قدم کنيا ويا آهن، جيڪي هيٺ ڏجن ٿا:



- 1 هر فيلڊ اسسٽنٽ پنهنجي علائقي ۾ گهٽ ۾ گهٽ 3 ڏينهن هفتي ۾ زميندارن سان ملي کين مشورا ڏيندو.
 - 2 هڪ ڏينهن تي 3 زميندارن سان لازمي طور ملندو.
 - 3 زميندارن کي مشورا ڏيڻ وقت جي پي ايس ڪوآرڊينيٽ واري تصوير کڻندو ته جيئن زميندار ۽ فيلڊ اسسٽنٽ جي اصل لوڪيشن جي خبر پئجي سگهي.
 - 4 فيلڊ اسسٽنٽ زميندارن سان ملاقاتن جا تفصيل خصوصي طور تيار ڪيل فيلڊ ڊائري ۾ درج ڪندو ۽ آن لائين رپورٽ ڪندو.
 - 5 زرعي مشورن ڏيڻ سان گڏ هر فيلڊ اسسٽنٽ پنهنجي علائقي ۾ گهٽ ۾ گهٽ 100 وڻ پوکرائيندو.
 - 6 آبادگارن جي وڌيڪ سهولت لاءِ هر زرعي توسيعي ضلعي آفيس ۾ انفارميشن سينٽر قائم ڪيا ويا آهن جتان پڻ ٽيليفون ذريعي يا روبرو وڃي مشورا وٺي سگهجن ٿا.
 - 7 ڊائريڪٽر جنرل زرعي توسيع سنڌ حيدرآباد جي آفيس ۾ هڪ خصوصي آبادگار ڪال سينٽر قائم ڪيو ويو آهي جتي زرعي ماهر آفيس جي ڪم ڪار واري وقت ۾ موجود هجن ٿا جتان پڻ مشورا حاصل ڪري سگهجن ٿا.
- هن نئين ڪم جو آغاز 8 سيپٽمبر 2020 تي جناب عبدالرحيم سومرو سيڪريٽري زراعت سنڌ پاران افتتاح ڪرڻ سان ڪيو ويو آهي. ڪم جي اڳواڻي جناب هدايت الله ڇڙو ڊائريڪٽر جنرل زرعي توسيع سنڌ ڪري رهيا آهن.

- 8 زرعي توسيع سنڌ پاران قائم آءِ سي ٽي زرعي توسيعي مرڪز پاران ٻيون به ڪئين سهولتون فراهم ڪيون پيون وڃن جيڪي هيٺ ڏجن ٿيون:



- آبادگار ڪال سينٽر 03111646111
- سائي ستابي سنڌ روزانو زرعي مشورن جو فيسبڪ تي لائيو پروگرام.
- روزانو ريڊيو پاڪستان تان زرعي پروگرام.
- موبائل سينيما ٽي وي ذريعي آبادگارن کي ڳوٺن ۾ وڃي زرعي فلمون ڏيکارڻ.
- مختلف مارڪيٽنگ جا اگهه پار
- موسم جو حال احوال
- نوجوانن کي انٽرنيٽ ڪرائڻ
- موبائل فون ايس ايس ڪرڻ وغيره شامل آهن