



بصرن جي جديد طريقي سان پوک



بصرن جو تحقيقاتي ادارو هوسڙي
حيدرآباد سنڌ



2024

ڪتاب جا حق ۽ واسطا محفوظ

بصرن جي جديد طريقي سان پوک

ڪتاب:

رفيق احمد پرڙو

سرپرست:

سيڪريٽري زراعت سنڌ

ڊاڪٽر مظهر الدين ڪيريو

نگران اعليٰ:

ڊائريڪٽر جنرل ايگريڪلچر ريسرچ سنڌ

ولي محمد بلوچ

نگران:

ايگزيڪيٽو ڊائريڪٽر سنڌ هارٽڪلچر سينٽر

ميرپورخاص

پروين اختر

ترتيب:

ڊائريڪٽر / پرنسپل سائنٽسٽ

روبين شاهه

تحقيق ۽ تحرير:

پرنسپل سائنٽسٽ

نواب جان بلوچ

سائنٽيفڪ آفيسر

2024

سال:



تعارف

بصرن جو تحقيقاتي ادارو هوسٽي حيدرآباد کان 15 ڪلوميٽر جي مفاصلي تي تندو محمد خان روڊ تي واقع آهي هتي پاڇين جي تحقيق جي اسٽيشن جو بنياد 1985 ۾ رکيو ويو. هن اسٽيشن کي 2019 ۾ ترقي ڏئي انسٽيٽيوٽ جو درجو ڏنو ويو. اداري کي ڪل 10 ايڪڙ زرعي زمين مليل آهي جنهن ۾ ربيع ۽ خريف جي موسمن ۾ مختلف قسم جا تجربا ڪيا ويندا آهن زمين کي ڦليلي ڪئنال مان ملندڙ پاڻي جي ذريعي آباد ڪيو وڃي ٿو.

بصرن جي تحقيقاتي اداري جا مقصد

- 1- بصرن جي پيچاري کي جديد طريقي سان تيار ڪرڻ.
- 2- جيتن ۽ بيمارين جو جديد طريقي سان مطالعو ڪرڻ ۽ انهن کان بچاءُ جا طريقا ڳولڻ
- 3- نيون ۽ اعليٰ قسم جون پيداواري جنسون تيار ڪرڻ.
- 4- بصرن جي بچ جي نئين پيداواري فني مهارت واري ڄاڻ هارين تائين پهچائڻ.
5. بصرن جون ملڪي ۽ غير ملڪي جنسون گڏ ڪري تجربن ۽ مشاهدن کان پوءِ تجارتي سطح تي هارين تائين پهچائڻ.

حاصلات: اداري جي طرفان ٻه اعليٰ پيداواري جنسون متعارف ڪرايون ويون آهن جيڪي نه صرف سڄي سنڌ ۾ بلڪ پوري ملڪ ۾ ڪاميابي سان پوکيون وڃن ٿيون. انهن مان خريف ۾ پوکجندڙ جنس نصرپوري آهي. جيڪا تمام سٺي پيداواري صلاحيت رکي ٿي ۽ ربيع ۾ پوکجندڙ جنس هوسٽي ون آهي.

بصرن جو تعارف

بصر جي ڳڻپ دنيا جي قديم ترين پاڇين ۾ ٿئي ٿي بصر اها واحد پاڇي آهي جيڪا روز مره جي پاڇين ۾ استعمال ٿئي ٿي انساني جسم جون خوراڪي ضرورتون جهڙوڪ حياتين، نمڪيات ۽ طاقت پيدا ڪري ٿي هي واحد پاڇي آهي جيڪا سڀني پاڇين کان وڌيڪ پوکي وڃي ٿي. پاڪستان ۾ بصر تقريبن چار لک ايڪڙن کان مٿي پوکيو وڃي ٿو. سالياني پيداوار تقريبن 3.15 ملين ٽن آهي.



بصرن جي بهترين پيداوار حاصل ڪرڻ جا طريقا

صحت مند بچ جي چونڊ: بصرن جي سٺي پيداوار لاءِ سڀ کان پهرين صحت مند ۽ نچ بچ جي چونڊ ڪرڻي پوندي آهي، صحت مند بچ ئي صحت مند فصل ڏئي سگهي ٿو ۽ ان ڳالهه جو خيال هڻڻ گهرجي ته بچ ڪمزور ۽ بيمارين کان آڇو هڻڻ گهرجي. جيڪڏهن بچ ۾ عيب هوندا ته بصرن جي پيداوار تي تمام گهڻو اثر پوندو ۽ پيداوار به گهٽ لهندي.



بصرن جو بيجارو تيار ڪرڻ:

بيجاري لاءِ مٿانهين زمين جي چونڊ ڪرڻ گهرجي. جهڙوڪ ڪنهن شاخ يا واٽر جي ڪپ سان بيجاري لاءِ ٻاريون ٺاهجن ته جيئن پاڻي ڏيڻ ۽ نيڪال ڪرڻ لاءِ آساني ٿئي. بصرن لاءِ لتباسي زمين کي بهتر سمجهيو وڃي ٿو. زمين کي سٺي نموني تيار ڪجي ٻاريون 6X4 فٽن جون ٺاهجن بچ پوکڻ کان اڳ ٻاريون ٺاهجن انهن ۾ سڪل گاهه ۽ ڪڪ پن وجهي ساڙجن ته جيئن زمين ۾ رهندڙ نقصانڪار جيوڙا سڙي ختم ٿين ۽ بيجارو ساڙ واري بيماري کان بچي سگهي. ڪنهن تانو ۾ بچ کي پاڻي ۾ ڀڙسائي پوءِ 125 گرام في ٻاري جي حساب سان چٽ ڪجي ان سان گڏ في ٻاري ۾ 20 کان 30 گرام نائٽروفاس پاڻ ملائجي ۽ پوءِ انهن ۾ بچ چٽي هٿ سان زمين جي مٿاڇري تي مٽي جو هلڪو ته ملائجي. پاڻي ڏئي مٿان واريءَ جي چنڊ ڏجي ته جيئن بچ ڍڪجي وڃي. بچ لڳائڻ کانپوءِ ٻارين مٿان ڪڪ کانن/ پرائين اخبارن سان چانو ڪجي ته جيئن سج جي تپش کان بيجارو بچي وڃي. پهريان هر ڏينهن پوءِ هر ٻئي ڏينهن پاڻي ڏجي. 15 ڏينهن کان پوءِ في ٻاري کي هڪ مٺ يا 10 گرام يوريا ڏجي، ته جيئن بصر جو بيجارو سراسري ۽ تڪڙي واڌ ڪري، گندگاهه کي روزانو هٿ سان صاف ڪندو رهجي بيجارو عموماً هڪ مهيني کان پوءِ رونبي لاءِ تيار ٿي وڃي ٿو.





زمين جي چونڊ: بصرن لاءِ هلڪي لتياسي زمين مناسب آهي. ان ۾ ريڄ جهلڻ جي طاقت پڻ هجي. بصر ڪلراڻي زمين ۾ به ٿئي ٿو. زمين جي pH گهٽ ۾ گهٽ pH 6.5 کان pH 7.8 تائين بهتر آهي.



زمين جي تياري: بصر کي پوکڻ کان اڳ چيزل هر لڳرائجي ته جيئن زمين کلي وڃي. ۽ ڪجهه ڏينهن ڇڏڻ کان پوءِ ٻه هر گوبل ۽ ٻه هر ڪلٽيوٽر جا ڏئي ليزر ليولر ڪجي ته جيئن زمين هموار ٿي وڃي. ان کان پوءِ زمين ۾ 4 ٽرڪون وٽاڻ جو گريل سٽيل پاڻ في ايڪڙ جي حساب سان ڏجي. سٺي نموني ملائجي ۽ جڏهن زمين پوکيءَ لاءِ تيار ٿي وڃي ته پوءِ ڪريا ڪڍي وهر ڪجي.



رونڊيا وهر ڪرڻ: جڏهن بيجارو هڪ مهيني جو ٿئي ان وقت تيار ٿيل ڪرين جي پنهي پاسن کان 3 کان 5 انچ جي مفاصلي تي رونڊو ڪجي ۽ ان ڳالهه جو خاص خيال ڪجي ته رونڊو ڪرين تي پاڻي جي مٿانهين سطح تي ڪرڻ گهرجي.



پاڻ: هميشه پاڻ ڏيڻ کان پهريان زمين جي چڪاس ڪرائڻ گهرجي ته جيئن خبر پوي ته زمين کي ڪهڙي پاڻ جي ضرورت آهي.

پاڻ جي ترتيب

- 250 مٺ وٽاڻ جو گريل سٽيل پاڻ زمين جي تياريءَ وقت ڏجي.
- 1 1/2 بوري ڊي اي پي (DAP) ۽ هڪ بوري پوٽاش زمين جي تياريءَ وقت ڏجي.
- هڪ بوري يوريا چُنڪي جي 15 ڏينهن کان پوءِ ڏجي.
- هڪ بوري يوريا چُنڪي جي 45 ڏينهن کان پوءِ ڏجي.
- هڪ بوري يوريا چُنڪي جي 90 ڏينهن کان پوءِ ڏيڻ گهرجي.



فصل کي پاڻي ڏيڻ جي ترتيب: بصرن کي رونبي ڪرڻ مهل پاڻي

ڏجي ۽ پهرين 12 ڏينهن ۾ 3 دفعا پاڻي ڏيڻ گهرجي ۽ پوءِ خريف ۾ هر هفتي ۽ ربيع ۾ هر 12 ڏينهن تي پاڻي ڏيڻ گهرجي.

گڏ ڪيڻ: بصرن ۾ مختلف قسمن جا گند گاه ٿين ٿا. گاه نظر اچڻ کانپوءِ

گڏ ڪرڻ شروع ڪجي. گڏ ڪرڻ کان پوءِ پاڻ ۽ پاڻي ڏجي گاه نظر اچڻ شرط



وري گڏ ڪجي. ٽئين ۽ چوٿين گڏ فصل

جي ضرورت مطابق ڪجي. گندگاه بصرن

جي فصل جي کاڌ خوراڪ پاڻي ۽ سج جي

روشني حاصل ڪرڻ ۾ پاڻي پائيوار ٿين ٿا

گندگاه ختم ٿيڻ سان فصل کي کاڌ خوراڪ

پريور نموني ملندي ۽ فصل جي پيداوار

سني ٿيندي ۽ گڏ جي ڪري پاڙ مضبوط ۽

بصر جي ڳنڍ ۾ واڌ ٿيندي.

بصرن جي پچڻ جون نشانيون ۽ ڪيڻ جو طريقو: بصرن کي پچڻ لاءِ

110 کان 130 ڏينهن لڳي ويندا آهن. جڏهن بصر پچڻ شروع ٿيندو آهي ته

ان جا مٿيان پن سڪڻ شروع ٿي ويندا ۽ هيٺ لڙڪندا ويندا آهن جڏهن

بصر جا پن پيلا يا ڦڪا نظر اچن ته ان وقت ان جو پاڻي بند ڪرڻ

گهرجي. بصرن جي ساون پنن کي پيرن يا پلاسٽڪ جي ڊرم جي مدد

سان موڙڻ گهرجي. ائين ڪرڻ سان بصرن جي پنن مان خوراڪ ملڻ بند

ٿي ويندي ۽ ڳنڍ جي ٽولهه به وڌي ٿيندي ويندي ان کان پوءِ بصر جي

ڳنڍين کي ڪوڏر يا رنبيءَ جي مدد سان زمين مان ڪڍيو وڃي. 10 کان

15 ڏينهن تائين بصرن کي ڪرين مٿان سڪائڻ گهرجي ته جيئن بصرن

مان غير ضروري گهر گهٽجي وڃي ان سان بصرن جي گهٽي وقت

تائين رکڻ يا استور ڪرڻ واري صلاحيت ۾ واڌارو ٿيندو. بصرن کي

ڪنهن خاص چانو واري جڳهه تي گڏ ڪرڻ گهرجي ته جيئن ان مان بهتر

منافعو ڪمائي سگهجي. بصرن جي پنن کي هڪ انچ ڳنڍ کان مٿي

ڪنهن تيز ڌار اوزار يا ڏاتي جي مدد سان وڍڻ گهرجي.



بصرن جون جنسون:

هوسڙي 1- نصرپوري
 ڪاسبو ۽ اچو بصر
 ٿاڻو بولا خان
 گهوٽڪي



- **هوسڙي 1:** هوسڙي 1 سنڌ جي حيدرآباد ۽ ميرپور خاص ڊويزن ۾ نوي سيڪڙو ڪاميابي سان پوکي وڃي ٿي. تقريباً 25 کان 40 ميٽرڪ ٽن في هيڪٽر پيداوار لهي ٿي. هن جنس جي ڳنڍ وڏي ۽ گول شڪل جي ٿيندي آهي ۽ تقريبن ٽي کان چار مهينا آساني سان محفوظ ڪري سگهجي ٿي.
- **نصرپوري:** نصرپوري سنڌ بلڪ سڄي پاڪستان جي گرم آبهوا وارن علائقن ۾ وڏي ڪاميابي سان پوکي وڃي ٿي. تقريباً 35 کان 50 ميٽرڪ ٽن في هيڪٽر پيداوار لهي ٿي. هن جي ڳنڍ وڏي گول شڪل ۽ هلڪي ڳاڙهي رنگ جي ٿيندي آهي ۽ تقريباً ٻه کان ٽي مهينا آساني سان محفوظ رکي سگهجي ٿي.
- **ٿاڻو بولا خان:** ٿاڻو بولا خان بصرن جي جنس ڪراچي، نٿو ۽ ڄامشوري ضلعن وارن علائقن ۾ وڏي پئماني تي پوکي وڃي ٿي.
- **گهوٽڪي:** گهوٽڪي جنس جو بصر سکر ۽ لاڙڪاڻو ڊويزن جي علائقن ۾ وڏي ڪاميابي سان پوکيو وڃي ٿو. ڳنڍيون وچولي جسامت جون ٿينديون آهن. گهوٽڪي جنس جو بصر ڊسمبر ۽ جنوري ۾ پوکبو آهي مئي ۽ جون ۾ تيار ٿي مارڪيٽ ۾ اچي وڃي ٿو.
- **ڪاسبو:** وڏي ڳنڍ واري مقامي جنس پاڇاڻي هئڻ ڪري ڊسمبر ۽ جنوري ۾ ٿرپارڪر ضلعي جي ننگرپارڪر علائقي ۾ پوکي وڃي ٿي ۽ سٺي وقت تائين رکي سگهجي ٿو.



اچوبصر: اچي بصر جي جنس ڄامشوري، نگر پارڪر، عمرڪوٽ ۽ نٽي ۾ محدود پئماني تي پوکي وڃي ٿي. گنڊيون وچولي سائيز جون ٿينديون آهن.



درجہ بندي: بصر جي درجا بندي ان جي گنڊ جي جسامت ۽ وزن جي حساب سان ڪئي ويندي آهي. بصرن کي جسامت جي لحاظ کان ٽن درجن ۾ رکيو وڃي ٿو.

پهريون درجو وڏي جسامت (A Class)

ٻيو درجو وچولي جسامت (B Class)

ٽئين درجي ۾ ننڍي جسامت (C Class)



پهريون درجي واري جنس کي ايڪسپورت ڪوٺائي چيو ويندو آهي.

ٻئي درجي واري جنس يا وچولي جسامت کي پاڪستان جي وڏين مارڪيٽن ۾ موڪليو ويندو آهي.

ٽئين درجي يا ننڍي جسامت وارين جنس کي لوڪل مارڪيٽ ۾ موڪليو ويندو آهي.

بصرن کي پورين ۾ بند ڪرڻ يا پيڪ ڪرڻ:

بصرن کي 110 کان 125 ڪلو گرام وارين پورين ۾ 45 کان 60 ڪلو چاري وارن پاچڪن ۾ پريو وڃي ٿو.

بصرن کي ذخيرو ڪرڻ جا طريقا: ذخيرو ڪرڻ کان پهريائين خراب ۽ سڙيل بصرن جون گنڊيون الڳ ڪرڻ گهرجن ائين ڪرڻ سان سنو بصر خراب ٿيڻ کان بچي ويندو. بصرن کي زمين مان ڪڍڻ کانپوءِ ان جا پن پاڙون ڪٽي ان کي اس ۾ سڪائڻ ضروري آهي ته جيئن ان ۾ موجود پاڻياٺ گهٽجي وڃي.



بصرن کي جهوپڙيءَ ۾ ذخيرو ڪرڻ:

جهوپڙيءَ ۾ رکڻ کان پهريون ڪاٺ يا ن سرن جي ڪانن جا خانا ٺاهڻ گهرجن. انهن خانن ۾ هوا جو ڪراس رکجي. ائين ڪرڻ سان بصرن جي گنڊي ڳرڻ ۽ سڙڻ کان بچائي سگهجي ٿي.



بصرن جي گل / بچ پوک ڪرڻ جي حڪمت عملي:

بصرن جي بچ پوکڻ لاءِ وچوليون ۽ ذرخيز زمينون نهايت ئي موزون آهن. بصرن جي بچ / گل پوک لاءِ زمين هڪ مهينو اڳ تيار ڪرڻ گهرجي زمين ۾ سڀ کان پهريائين ٻه راجا هر ڏئي پوءِ ٻه هر گوبل جا ڏجن ته جيئن پتر پڇي پور ٿين ان کان پوءِ ڪلٽيوپٽر ڏئي ليزر ليولر جي مدد سان زمين هموار ڪجي ان کان پوءِ ٻه ترڪون وڌائڻ جو گريل سٽيل پاڻ ۾ ايڪٽر جي حساب سان استعمال ڪرڻ گهرجي. پوءِ زمين ۾ پاڻ کي پڪيڙي ڪريا ڪيڏ گهرجن ته جيئن پاڻ زمين اندر ملي وڃي پوءِ بصرن جي گندي جو مٿانهون حصو ڪٽي پوءِ پوکجن. بصرن جي گندي جون 25 کان 30 پوريون يا 63 کان 75 مڻ ۾ ايڪٽر جي حساب سان پوکڻ لاءِ استعمال ڪجن. 15 ڊسمبر کان گنديون لڳائڻ بهتر ٿئي ٿو.

بصرن جي گل پوک جا پاڻ (في ايڪٽر)

وڌائڻ جو پاڻ	ڪيميائي پاڻ	سلفيٽ آف پوٽاش	يوريا	ڪيلشيم اونيٽر نائٽريٽ
4 ترڪون	نائٽروفاس 2 پوريون	1 پوري	2 کان 3 پوريون	1 کان 2 پوريون
---	مونو اونيٽر فاسفيٽ 1 پوري	1 پوري	3 کان 4 پوريون	---

بصرن جون بيماريون

بيماري جو نالو	سفارش ڪيل فنجيسائيڊ مان ڪا به هڪ استعمال ڪجي	مقدار في ايڪٽر
ڊائونِي ملڊيو	ميلوڊي ڊيو / ميڪسل	300 گرام 100 ليٽر پاڻي ۾
پرپل بلاچ	مينڪوزيب ۽ مٽاليڪسل	250 گرام 100 ليٽر پاڻي ۾
	سڪسيس	250 گرام 100 ليٽر پاڻي ۾
انٽرڪنوز	اينٽراڪال	250 گرام 100 ليٽر پاڻي ۾
	ايمسٽراٽاپ	200 ملي ليٽر 100 ليٽر پاڻي ۾
نيڪ رات	ٽايسن اير	100 گرام 100 ليٽر پاڻي ۾
	ڪاربيبيٽز	100 گرام 100 ليٽر پاڻي ۾
بيڪٽيريئل بلائيٽ	مينڪوزيب مٽاليڪسل	100 گرام 100 ليٽر پاڻي ۾
	ڪوسائيڊ	300 گرام 100 ليٽر پاڻي ۾
بيسل رات	ڪاپر آڪسيڪلورائيڊ	250 گرام 100 ليٽر پاڻي ۾
	ڪاربيبيٽز	100 گرام 100 ليٽر پاڻي ۾
ڊيميٽنگ آف	مينڪوزيب مٽاليڪسل	250 گرام 100 ليٽر پاڻي ۾
	ريڊومل گولڊ	250 گرام 100 ليٽر پاڻي ۾



بصرن جا نقصان کار جیت

مقدار فی ایکڑ	سفارش کیل زهرن مان کو به هک زهر استعمال کچی	جیت ۽ کیڑا
300 ml / acre	ڊائناپیر (ڊائمیٿو هیت)	ٿرڙو یا ٿرپ
250 ml / acre	ٿریسر (اسپائینوسڊ)	
100 ml / acre	پرائیٽ (کلور فیناپائیر)	
500 ml / acre	پریفینوفاس 50 EC	
300 g / acre	ایسیفیت	
200 ml / acre	میچ 50 EC (لیفیرون)	لیف ڏگما
50 ml / acre	بیلت 48 SC (فلوبیدامائڊ)	
80 ml / acre	ولیر فلیکسی 50 SC (کیلورینا نیلیپرون + ٿائیمینازون)	
250 ml / acre	بیفیٿرن 10 EC	
250 ml / acre	لیمڊا کیٿلوٿرن 5 EC	
250 ml / acre	ایمامیکٿن بیزوت	
200 ml / acre	میچ 50 EC (لیفیرون)	هیلوٿس
50 ml / acre	بیلت 48 SC (فلوبیدامائڊ)	
250 ml / acre	بیفیٿرن 10 EC	
250 ml / acre	لیمڊا کیٿلوٿرن 5 EC	

مائکرو نیوٿرینٽ ۽ مائکرو آرگینزم

مائکرو نیوٿرینٽ	وزن فی ایکڑ	ڏیڻ جو وقت	ڏیڻ جو طریقو
هیومک ایسڊ 40	8 kg / 4 ltr	نرسری، چنکی لڳائڻ وقت	چٽ / آوانڊی ۾
زنڪ سلفیٽ	4 ltr / kg	پوکي، جي 50 ڏينهن اندر	چٽ / آوانڊی ۾
سلفر 80% / سلفر بیٿنائیڊ 90%	10 kg / 4kg	پوکي، جي 30 ڏينهن اندر	آوانڊی ۾، چٽ
ڪاپر	250 gm	پوکي، مهل	آوانڊی ۾
بائیوسلفیورڪ بیڪٽیرا	8 / 6 ltr	پوکي، جي 30 ڏينهن اندر	آوانڊی ۾
ایفیڪٽو مائکرو آرگینزم	8 / 6 ltr	پوکي، جي 30 ڏينهن اندر	آوانڊی ۾
پوناش	1ltr / kg	پوکي، جي 30 ڏينهن اندر	اسپری
امائو ایسڊ	500 gm / ml	پوکي، جي 60 ڏينهن اندر	اسپری
این پی ڪي	500 gm / ml	پیسٽسائید سان گڏ	اسپری





لي آوت ۽ چيپيندڙ: پارس پرتنگ ايجنسي حيدر چوڪ حيدرآباد 0300-3014195